Plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

Plastik cərrahiyyədə ilk anlayışlar

1) Aşağıdakılardan hansının tək ,yanında heç bir toxuma olmadan ”free flep”(sərbəst dilim) olaraq köçürülməsi (transferi) mümkün deyil?

A) epidermis
B) fassiya
C) piylik
D) dəri
E) eninəzolaqlı əzələ

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

2) Donor sahələrindən tam qalınlıqda dəri qrefti almaq istədikdə ən axırıncı hansı seçilməlidir?

A) üst göz qapağı
B) alt göz qapağı
C) qasığın ön səthi
D) qulaq seyvanının ön hissəsi
E) budun yan səthi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

3) Bilateral karpal tunel sindromlu xəstə son zamanlar çəkisinin artdığını, baş ağrılarının və əldə yanğı hissinin olmasını bildirir. Bu halda aşağıdakılardan hansı ən böyük ehtimalla yanaşı gedən xəstəlik ola bilər?

A) Düpüytren kontrakturkası
B) Amiloidoz
C) Akromeqaliya
D) Şəkərli diabet
E) Sfinqomieliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

4) Düpüytren kontrakturası ilə bağlı hansı səhvdir?

A) Əldə bükücü kontraktura yaradır
B) Fiziki işin təsirindən yaranır
C) Müalicəsində palmar fassiyanın rezeksiya edilməsi məsləhətdir

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Vətərlərin patoloji dəyişiklikləri ilə əlaqədardır
E) Xərçəngə çevrilmir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

5) Damaq yarığı olan xəstədə anatomik olaraq hansı əzələ daha çox dəyişikliyə uğrayır?

A) M.tensor veli palatini
B) M.levator palatini
C) M.orbicularis oris
D) M.palatoglossus
E) M.uvula

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

6) Sağlam şəxsdə cərrahi yarada epitelizasiyanı aşağıdakılardan hansı sürətləndirir?

A) yaranın cərrahi işlənməsi
B) epitelizasiya sürətləndirilə bilməz
C) "epidermal growth factor "(epidermal böyümə faktoru)
D) "epidermal growth factor"(epidermal böyümə faktoru) + gümüş sulfadiazin
E) hiperbarik oksigenasiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

7) Dərinin ən qalın nahiyəsinin qalınlığı nə qədərdir?

A) 2 sm
B) 1mm
C) 4 mm
D) 6 mm
E) 3 sm

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

8) Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

A) II dərəcəli yanıqlarda suluq olmur
B) Suluq olan yanıq sahələri mütləq II dərəcəlidir
C) III dərəcəli yanıqlarda xəstədə ağrı hissi olmur
D) Yanıq yarasında demarkasiya xətti inkişaf etmir
E) Yanıq yarası dinamiki xüsusiyyətlərə malik deyil

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

9) Damar sünnəti (vascular circumcision) nədir?

A) tromblaşmış damarın rezeksiyası
B) anevrizma əmələ gəlmiş damarın proksimal hissəsinin rezeksiyası
C) anevrizma əmələ gəlmiş damarın distal hissəsinin rezeksiyası
D) adventisiyaektomiya
E) endotelektomiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

10) Elektrik yanıqlarında ən təhlükəli gecikmiş ağırlaşma hansıdır ?

A) hemoqlobinuriya
B) eritremiya
C) proteinuriya
D) mioqlobinuriya
E) qlükozuriya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

11) Yaş sement yanığı hansı tip yanıqlara aiddir ?

A) şüa yanığı
B) qələvi yanığı
C) elektrik yanığı
D) fosfor yanığı
E) turşu yanığı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

12) Yanıq zamanı ölümə səbəb olan əsas iki faktor hansılardır?

A) xəstənin yaşı və xəstənin çəkisi
B) yanığın sahəsi və xəstənin çəkisi
C) yanığın sahəsi və xəstənin yaşı
D) yanığın dərinliyi və xəstənin çəkisi
E) xəstənin yaşı və yanığın dərinliyi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

13) Yanığı olan xəstədə aşağıdakılardan hansının təcili olaraq yerinə yetirilməsi vacib deyil?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Yaraya kortikosteroidlərin tətbiqi
B) Ağrıkəsici vurmaq
C) Eskaratomiya etmək
D) Steril sarğı qoymaq
E) Fizioloji məhlul köçürtmək

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

14) Daun sindromlu uşaqlarda daha çox hansı plastik əməliyyatlar icra edilir?

A) sindaktiliyanın bərpası
B) mental progeniyanın düzəldilməsi
C) damaq yarığının bərpası
D) qulaq rekostruksiyası
E) dilin kiçildilməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

15) Endokrinopatiyası olmayan, hipospadiyalı xəstə ilə bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) Fetal dövrdə müvəqqəti androgen çatışmazlığı(keçici endokrinopatiya) olmuşdur
B) Autosom resessiv yolla keçir
C) Autosom dominant yolla keçir
D) Sonsuzluğa səbəb olmadığı üçün əməliyyata ehtiyac yoxdur
E) Səbəbi hormonlara cavab verən reseptorların çox olmasıdır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

16) Xroniki radiasiya yarasının müalicəsi üçün aşağıdakılardan hansı seçilməlidir?

A) dəri əzələ flebi
B) eksizya və bərpa
C) dəri qrefti
D) fassiya dəri flebi
E) sərbəst ayaqlı dəri flebi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

17) Əldə orta barmaqda neçə pulley sistemi var?

A) 3
B) 18
C) 8

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 10
E) 5

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

18) Hansı halda birincili vətər bərpası əks göstəriş deyil ?

A) vətər kəsiyinin yanıq yarası ilə birlikdə olması
B) yaranın infeksiyalaşması
C) böyük və dərin vətər kəsiyinin eyni zamanda rast gəlinməsi
D) vətər kəsiyinin yumşaq toxuma defekti ilə birlikdə olması
E) yaranın I cərrahi işlənməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

19) Dəri qrefti götürüldükdən sonra, normada yara sahəsi hansı rəng ardıcıllığı ilə (dərhal sonra, 3gün sonra və 10 gün sonra) sağalır?

A) çəhrayı-qara-ağ
B) ağ-çəhrayı-bənövşəyi
C) qara-qırmızı-çəhrayı
D) ağ-bənövşəyi-çəhrayı
E) çəhrayı-bənövşəyi-ağ

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

20) Valideynləri 12 aylıq uşaqda alın nahiyyəsində anadangəlmə kiçik bir nöqtə şəklində qırmızı ləkənin olduğunu, uşaq böyüdükcə ləkənin böyüdüyünü qeyd edirlər. Son zamanlar ləkənin eyni ölçüdə qaldığını bildirirlər. Təxmin olunan diaqnoz hansıdır?

A) piogen granuloma
B) anadangəlmə böyük xal (Giqant nevus)
C) hemangioma
D) vaskulyar malformasiya
E) Lipoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

21) V barmağı (çeçələ barmaq) amputasiya olmuş xəstədə replantasiya aparılmazsa ,əlin hansı funksiyası pozula bilər ?

A) Yumruq sıxa bilməz
B) Əldə tempratur hissiyyatı pozular
C) Çanta tuta bilməz

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Açar tutma funksiyası pozular
E) Əldə taktil hissiyatı pozular

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

22) Hansı vəziyyətdə metabolik proseslər sürətlənir?

A) politravma
B) koma
C) sepsis
D) ciddi yanıq
E) aclıq

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

23) Aşağıdakılardan hansı inkşaf etməkdə olan kompartman sindromunun ən düzgün xəbər edicisidir"?

A) aktiv hərəkətdə çox şiddətli ağrının olmasına baxmayaraq passiv hərəkətdə ağrının azalması
B) distal nəbzin olmaması
C) aktiv və passiv hərəkətlərdə ağrının olmaması
D) aktiv hərəkətdə güclü ağrının olması və passiv hərəkətdə ağrının şiddətlənməsi
E) aktiv hərəkətdə ağrının olmaması, passiv hərəkətdə ağrının olması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

24) Aşağıdakı zədələnmələrdən hansı Volkmanın işemik kontrakturası ilə nəticələnə bilər ?

A) Arxa sümükarası arteriyanın kəsilməsi
B) Bazu kələfinin kəsilməsi
C) Bazu arteriyanın kəsilməsi
D) Dirsək arteriyanın kəsilməsi
E) Mil arteriyanın kəsilməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

25) Skelet əzələlərində neçə vaskulyarizasiya tipi mövcuddur?

A) 2
B) 7
C) 6
D) 3
E) 5

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

26) Gluteus maksimus(Böyük sağrı əzələsi) Mathes-Nahai təsnifatına görə hansı tip əzələ qrupuna aiddir ?

A) tip-5
B) tip-3
C) tip-7
D) tip-2
E) tip-1

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

27) Yaşlı kişilərdə "free" flebə göstəriş olduqda, aşağıdakılardan hansını seçmək daha düzgün olar?

A) a.dorsalis pedis ayaqcıqlı "free" flebi
B) sternokleidomastoid əzələ dəri "free" flebi
C) latissimus dorsi əzələ " free " flebi
D) peroneal arteriya ayaqcığı "free" flebi
E) radial ön qol "free" flebi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

28) Hansı flebin "free" fleb olaraq köçürülməsinə qərar verildikdə mütləq donor nahiyyənin arterioqrafiyası çəkilməlidir?

A) M.Serratus anterior flebi
B) TRAM fleb
C) M.Latissimus dorsi flebi
D) "deep" inferior epiqastral arteriya ayaqcıqlı fleb
E) Groin flep

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

29) Dorrance flebi əməliyyatının iki flebli "push-back" əməliyyatından fərqi nədir ?

A) Dorrance flebi iki flepli "push-back"-ın digər adıdır
B) flebin at nalı şəklində bitişik olması
C) fleblərin əzələ-dəri flebi olması
D) Flebin iki arteriya ilə qidalanması
E) flebləri tərkibində sensorial kompanent olması

www.susk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

30) Beş yaşdan əvvəl meydana çıxan çənə oynağı ankilozları ilə yanaşı hansı deformasiyanın rast gəlinmə ehtimalı yüksəkdir?

A) mikrogeniya
B) Progeniya
C) mikrostomiya
D) makrognatiya
E) mikrognatiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

31) Kraniostenoz və sindaktiliyanın bir yerdə rast gəlinməsi hansı sindrom üçün səciyyəvidir?

A) Apert
B) Pierre Robin
C) Poland
D) Gorlin –Goltz
E) Daun

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

32) Lateral kalkaneal fleb, lateral arteriya və vena safena parvadan (kiçik dərialtı vena) başqa hansı anatomik strukturu əhatə edir ?

A) v. safena magna
B) tendo flexor hallucis longus
C) a.dorsalis pedis
D) n.suralis
E) n.plantaris medialis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

33) RİVA nədir?

A) lazerin bir növü
B) regional anesteziyanın bir üsulu
C) dermobraziya
D) rigid intravenoz anastamoz üsulu
E) ümumi anesteziyanın bir üsulu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

34) Üz-çənə zədələnmələrinin hansı formasında açıq reduksiya və daxili fiksasiya lazım deyil?

A) Əng sınıqqları
B) Alveolyar sınıqlar
C) Çənə sınıqları
D) Burun sümüyü sınıqları
E) Burun-xəlbir sınıqları

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

35) "Anterior open bite"(açıq dişləm) deformasiyası hansı sınıqları ağırlaşması olaraq meydana çıxa bilər?

A) Mandibulanın bilateral subkondilus sınıqları
B) Burun sümükləri sınıqları
C) Çənənin bilateral tac çıxıntısının sınıqları
D) Çənənin parasimfiz sırıqları
E) Almacıq sınıqları

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

36) Aşağıdakılardan hansı mandibulanın izolyasiya edilmiş subkondilus sınıqları üçün xarakterikdir?

A) qulaqdan qanaxma
B) çənədə ağrı
C) burun qanaxması
D) okluziya qüsuru
E) qulaqdan likvoreya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

37) Baş-boyun nahiyyəsində yerləşən hansı dəri xərçənginin müalicəsi zamanı radikal boyun disseksiyasının aparılmasına ehtiyac yoxdur?

A) dermatofibrosarkoma protuberans
B) melanoma
C) bazal hüceyrəli karsinoma
D) skvamoz hüceyrəli karsinoma
E) merkel hüceyrəli karsinoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

38) Skvamoz hüceyrəli karsinoma (S.H.K) növlərinin hansında metastazların meydana çıxma ehtimalı ən azdır?

A) yanıq çapığı nəticəsində yaranan s.h.k
B) günəş şüasının və travmanın təsiri ilə inkişaf edən s.h.k.
C) şüa dermatiti nəticəsində yaranan s.h.k
D) immun çatışmazlıq nəticəsində yaranan s.h.k
E) residiv nəticəsində yaranan s.h.k

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

39) Nüfuz etmə ehtimalı yüksək olan və makroskopik olaraq kelloid ilə səhv salınan dəri şişi hansıdır?

A) bazal hüceyrəli karsinoma
B) dermatofibrosarkoma protuberans
C) merkel hüceyrəli karsinoma
D) melanoma
E) skvamoz hüceyrəli karsinoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

40) Hansı periferik sinirin zədələnməsi nəticəsində əlin IV və V barmaqlarinda hissiyyat itər və açar tutma funksiyası pozular?

A) orta sinir
B) dirsək siniri
C) mil siniri
D) dirsək ,mil
E) dirsək ,orta

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

41) Yuxarı ətrafın dərisi hansı şaxələrlə qidalanır?

A) xüsusi dəri arteriyaları ilə
B) əzələ-dəri şaxələr ilə
C) xüsusi dəri sistemi və əzələ dəri sistem ilə
D) fassiya -dəri şaxələri ilə
E) fassiya ,əzələ-dəri şaxələri ilə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

42) Burun ucu nahiyyəsinin qalın və enli olması kimi bir estetik problemdə , əsas olaraq hansı struktura cərrahi müdaxilə lazımdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) kolumella
B) burun sümükləri
C) burun çəpəri
D) yuxari yan qığırdaq
E) aşağı yan qığırdaq

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

43) "L-damı" nədir ?

A) rinoplastikada lateral osteotomiyalarda əmələ gələn dam-tavan deformasiyası
B) lipoektomiyalarda dərinin altında saxlanılan piy təbəqəsi
C) süd vəzisi rekonstruksiyasında istifadə olunan əzələ flebi
D) lazer müalicəsində ən yuxarı doza həddi
E) septoplastikada burun çəpərinin qorunma forması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

44) Palmaris longus və plantaris əzələ vətərlərinin anadangəlmə olmadığı yerlərdə ən böyük ehtimalla hansı vətər donorundan istifadə etmək mümkündür ?

A) m.digitorum superfacialis
B) tensor fascia lata
C) m.gracilis
D) m.sartorius
E) m.digitorum profundus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

45) Silikon implantlarda ən çox müşahidə olunan yerli ağırlaşma hansıdır?

A) allergik xəstəliklərin əmələ gəlməsi
B) autoimmun xəstəliklərin əmələ gəlməsi
C) kapsulyar kontrakturanın əmələ gəlməsi
D) implantın düşməsi
E) xərçəng əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

46) Sindaktiliyanın bərpasında aşağıdakılardan hansının istifadə olunması xəstə üçün zərərli ola bilər?

A) 6 aylıq uşaqda baş barmağın qonşuluğundakı sindaktiliyanın bərpa edilməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) bir əldə olan iki qonşu sindaktiliyanın eyni seansda əməliyyat edilməsi
C) bilateral sindaktiliyanın eyni zamanda bərpası
D) toxuma genişləndiricilərin tətbiqi
E) 2 yaşında uşaqda orta barmağın yanındakı sindaktiliyanın bərpası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

47) "Tətik barmaq " deformasiyasında hansı pulley sisteminin uzununa kəsilməsi müalicə üçün yetərlidir?

A) A-1
B) A-2
C) A-4
D) A-5
E) A-3

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

48) Hansı barmaqlarda "Ray " amputasiyası icra edilir ?

A) 1-2
B) 1-3
C) 2-3
D) 1-5
E) 2-5

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

49) Aşağıdakı defektlərdən hansı üçün müalicə metodu dəri qreftidir?

A) əlin üstündə "paratenon"-un sağlam olduğu defektlər
B) boyun nahiyyəsi defektləri
C) süd vəzisi defektləri
D) Ovucun defektləri
E) topuq defektlər

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

50) Aşağıdakılardan hansında "nonabsorbel" (sorulmayan) saplardan istifadə etmək olmaz ?

A) əzələ
B) vətər
C) fassiya
D) dəri

www.srsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) dərialtı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

51) Təkrari çıxıqlara hansı sinir məruz qalır?

A) dirsək siniri
B) bayır dəri-əzələ siniri
C) içəri dəri-əzələ siniri
D) mil siniri
E) orta sinir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

52) Sanderland təsnifatına görə hansı tip sinir zədələnmələrində intranevral nevromanın inkişaf etmə ehtimalı var?

A) tip-II
B) tip-V
C) tip- I
D) tip-III
E) tip-IV

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

53) Aşağıdakı donor sahələrindən hansı sümük qrefti kimi istifadə oluna bilər?

A) kürək
B) əl falanqaları
C) ayaq falanqaları
D) dirsək
E) qamış

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

54) Sinir toxumasında aksonoplazmanın hərəkətinə və sinirin gərilmələrinə qarşı elastiklik yaradan təbəqə hansıdır ?

A) perinevrum
B) epinevrum
C) dendrit
D) akson
E) endonevrum

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

55) Sinir bərpasında sinir qrefti hansı məqsədlə istifadə edilir ?

A) aksonal hərəkət üçün ötürücü (boru) funksiyası yerinə yetirir
B) sinirə infeksiyanın düşməsinin qarşısını alır
C) sinirin sağalmasında retraksiyanın qarşısını alır
D) sinir dəri impulslarının ötürülməsini dərhal başlamasını təmin edir
E) sinir defektini aradan qaldırır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

56) Lateral supramalleolyar fleb hansı arteriyadan gələn perforant (deşici) şaxələrlə qidalanır ?

A) ön qamış arteriyası
B) bud arteriyası
C) incik arteriyası
D) dizaltı arteriya
E) arxa qamış arteriya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

57) Yanıq yarasının müalicəsində istifadə edilən ,geniş nahiyələrə tətbiq etdikdə ,isə hiponatremiyaya səbəb olan yerli antibakterial maddə hansıdır?

A) penisillin
B) gentamisin
C) gümüş nitrat
D) gümüş sulfadiazin
E) povidon-yod

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

58) Yara sağaldıqdan sonra yaranın dartılma müqavimətinin ən yüksək faizi neçəyə bərabərdir ?

A) 100
B) 60
C) 80
D) 93
E) 75

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

59) Cərrahi mikroskopla işləyərkən böyütmə nisbətinin 10 olması zamanı , 1 mm ölçülü damar neçə mm qəbul edilir?

A) 2mm
B) 10mm
C) 5mm
D) 3mm
E) 1mm

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

60) Əl cərrahiyyəsi praktikasında sinir ilə vətəri bir birindən makroskopik olaraq ayırmaq çətin olduqda hansı əlamət istiqamət verici ola bilər?

A) vətər rənginin daha sarımtıl ağ olması
B) sinirin vena ilə birlikdə olması
C) epinevrum üzərində boylama (longitidunal) damarın olması
D) vətər üzərində boylama qidalandırıcı (nutrisyonal) damarın olması
E) perinevrum üzərində boylama (longtidunal) damarın olması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

61) Mikrocərrahiyyədə ilk iki tikiş arasındakı məsafəni(uc-uca anastomozda) ,hansı bucaqla ifadə etmək olar?

A) 90 °
B) 180 °
C) 60 °
D) 45 °
E) 120 °

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

62) Flebin yaşaması (qopmaması) üçün tez-tez istifadə olunan dekstran-40 mayesinin günlük dozası nə qədərdir və neçə gün verilməlidir ?

A) 500 ml , 5 gün
B) 10 ml/kq ,3 gün
C) 2ml/ kq ,5 gün
D) 15 ml/kq, 7 gün
E) 20 ml/ kq ,7 gün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

63) Sinir patologiyaları arasında hansı strukturun zədələnməsi şüa terapiyasının ağırlaşması olaraq ən çox rast gəlinir və kliniki əhəmiyyət daşıyır ?

A) bazu kələfi
B) gözaltı sinir
C) bud siniri
D) orta sinir
E) qamış siniri

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

64) Sümük uzatma texnikasında ("distraction osteogenesis") gündəlik dartma ölçüsü hansı sərhədlər daxilində olmalıdır?

A) 1-1.5 sm
B) 2-5 mm
C) 2-4 mm
D) 0,5-1.5 mm
E) 1.5-2.5 sm

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

65) Baş dərisini (Skalpı) qidalandıran bütün damarların bağlanması halında kəllə sümüklərdə hansı qidalanma problemləri meydana çıxar?

A) qismən və ya ani nekroz yaranar
B) bir müddətdən sonra avaskulyar nekroz əmələ gələr
C) hissəvi nekrozlar əmələ gələr
D) əgər bayır tabula nəmli saxlanılsa heç bir problem olmaz
E) kəllə sümükləri a.meningea mediana ilə qidalandığı üçün heç bir problem yaranmaz

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

66) Çənə nahiyyəsində ağrı,səs və hərəkət məhdudluğundan şikayət edən xəstələrin çənə oynağı nahiyyəsinin düz rentgenoqrafiyalarının neçə faizində normal rentgen görüntüsü əldə edilə bilər ?

A) 20 %-də
B) 85% -də
C) 40 %
D) 30 %-də
E) 50 %-də

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

67) Sefaloqramma nədir?

A) Dərin venaların rentgenoqrafiyası
B) Ortoqnatik cərrahiyyədə rentgenoloji metod
C) Kəllənin rentgenoqrafiyası
D) Çənə oynağı rentgenoqrafiyasına verilən xüsusi ad
E) Burun ətrafı ciblərin rentgenoqrafiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

68) Aşağıdakılardan hansı barmaq böyüməsi-makrodaktiliya hesab edilir ?

A) limfahemangioma ilə birlikdə olan barmaq böyüməsi
B) Klippel-Weber-Trenaunay sindromu
C) neyrofibromatoz ilə birlikdə olan barmaq böyüməsi
D) anadangəlmə statik və proqressiv barmaq böyüməsi
E) hemangioma ilə birlikdə olan barmaq böyüməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

69) Z-plastika metoduna aid olanlardan hansı yanlışdır?

A) qollar arasındakı bucaq böyüdükcə transpozisiya çətinləşir
B) z hərfinin 3 qolu da bir-birinə bərabər olmalıdır
C) ən çox 60°-li bucaq istifadə olunur
D) qollar arasındakı bucaq kiçildikcə fleplərin yaşamaq qabiliyyəti azalır
E) əsasən çapıq kontrakturalarında istifadə olunur

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

70) 33 yaşlı qadın 1 aydır ki ayaq dabanında əmələ gələn, travma ilə əlaqəsi olmayan, sağalmayan yara şikayəti ilə poliklinkaya müraciət edib. İlkin diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər ?

A) yastı hüceyrəli karsinoma
B) dermatofibrosarkoma protuberans
C) skvamoz hüceyrəli karsinoma
D) bazal hüceyrəli karsinoma
E) melanoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

71) Palmar (ovuc) nahiyyədə toxuma genişləndirici hansı toxuma nahiyyəsinə qoyulur ?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) palmar fassiyanın altına qoyulmalıdır
B) palmar fassiya üzərinə qoyulmalıdır
C) palmar nahiyəyə toxuma genişləndirici qoyulmur
D) dəri altına qoyulmalıdır
E) Palmar nahiyədə istənilən nahiyəyə toxuma genişləndirici qoymaq olar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

72) Allen testi ilə hansi damarlar müayinə edilir ?

A) barmaq arteriyaları
B) bud arteriyası və bud venası
C) ancaq mil arteriyası
D) mil və dirsək arteriyaları
E) ayağın arxa arteriyası və kalkaneal (axilles) arteriya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

73) Mastoektomiyadan sonra autogen toxumalardan hansı süd vəzisi rekonstruksiyasında az istifadə olunur ?

A) " latissimus dorsi" fleb
B) "Lateral kalkaneus "flebi
C) "lateral arm" fleb
D) "gluteus maksimum"flebi
E) "rectus abdominus" flebi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

74) 5 ildir ki, üz sinirli iflici olan xəstədə üzün bərpası üçün hansı metod seçilməlidir ?

A) N.suralis ilə "cross-nerve" qrefti-II mərhələli fassial reanimasiyanın I mərhələsi olaraq
B) üz sinirində neyrorafiya
C) Neyrovaskulyar əzələ flebi
D) sadə əzələ qrefti ilə bərpa
E) Dəri əzələ flebi ilə bərpa

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

75) Flebin metabolizmini zəiflətməyən prosedur hansıdır ?

A) flebi masaj etmək

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) flebin isidilməsi
C) hiperbarik oksigen tətbiqi
D) flebə qısa məsafəli tikişlər qoymaq
E) flebə zəli tətbiqi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

76) Hansi metod kiçiltmə mamoplastikası əməliyyatları arasında sərbəst NAC qrefti(nipple-areola complex) metodu olaraq da tanınır ?

A) Skoog metodu
B) Strombeck metodu
C) McKissock metodu
D) Thorek metodu
E) Gilles metodu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

77) Bəd xassəli hematoma nədir ?

A) Anadangəlmə anevrizma
B) bəd xassəli melanoma ilə birlikdə rast gəlinən hematoma
C) ölçüləri 4x8 sm və daxilində 500ml qan olan hematomanın xüsusi adı
D) İstənilən böyük hematoma
E) üz dartma əməliyyatlarından sonra əmələ gələn hematoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

78) Ən dərində yerləşən köklü diş hansıdır?

A) kəsici dişlər
B) ağıl dişləri
C) I premolyar dişlər
D) köpək dişləri
E) III molyar dişlər

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

79) Dodaq yarığı ,hipospadiyası,aksilyar-polidaktiliyası olan uşağın yaşına görə cərrahi əməliyyatlar hansı ardıcıllıq sırası ilə aparılmalıdır?

A) hamısı birlikdə və uşaq 3 aylıq olduqda
B) hamısı birlikdə və uşaq doğulan kimi
C) polidaktiliya- dodaq yarığı -hipospadiya
D) hamısı birlikdə və uşaq 2 yaşında olduqda

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) dodaq yarığı-polidaktiliya -hipospadiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

80) Uşaqlarda ən çox hansı nahiyyənin elektrik yanığına rast gəlinir ?

A) əl
B) ayaq
C) dodaq
D) qulaq
E) dil

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

81) Mil sinirinin tam iflicində istifadə olunan vətər trasnferləri içərisində hansı metodun tətbiqi doğrudur?

A) Pronator teres → Ekstensor karpi radialis brevis
B) Fleksor carpi ulnaris→ ekstensor digitorum communis
C) Fleksor carpi radialis→ekstensor digitorum communis
D) Hamısı
E) Palmaris longus→Ekstensor pollicis longus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

82) Dirsək sinirinin iflicində aşağıdakı funksiyalardan hansı itir?

A) baş barmaq fleksiyası
B) baş barmaq ekstensiyası
C) barmaqların adduksiyası
D) baş barmaq opozisyası
E) baş barmaq abduksiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

83) Mil siniri əlin hansı hərəki funksiyasında iştrak etmir?

A) Baş barmağın opozisyası
B) Baş barmağın ekstensiyası
C) Biləyin ekstensiyası
D) II barmağın ekstensiyası
E) V barmağın ekstensiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

84) Orta sinir bilək səviyyəsində kəsilərsə, aşağıdakılardan hansı inkişaf etməz?

A) Radial tərəfdə üç barmaq fleksiyasında zəiflik
B) Əl baş barmağını qarşılaşdıran əzələnin atrofiyası
C) baş barmaqda opozisiyanın itməsi
D) pəncə-əl deformasiyası
E) Radial tərəfdə III,V barmaqların bayır səthində hisiyyatın itməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

85) Yuxarı səviyyədə orta sinirin kəsilməsinin əlamətləri hansılardır?

A) Əldə radial tərəfdə üç barmaqda tam hissiyyatın itməsi
B) baş barmağın opozisya etməməsi
C) Əldə IV barmağın yarısına kimi palmar səthdə hissiyatın itməsi
D) baş barmağın falanqalar arası oynaqda fleksiyanın itməsi
E) hamısı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

86) Orta sinirin bilək səviyyəsində kəsilməsi zamanı hansı əzələnin funksiyanın itməsi müşahidə olunur?

A) m.volar interosseus -ön sümükarası əzələ
B) m.fleksor carpi ulnaris -biləyi bükən dirsək əzələ
C) m.dorsal interosseus- arxa sümükarası əzələ
D) m.fleksor carpi radialis -biləyi bükən mil əzələ
E) m.opponens pollicis-baş barmağı qarşılaşdıran əzələ

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

87) Dirsək sinirinin bilək səviyyəsində kəsilməsi zamanı hansı əzələnin funksiyasının itməsi müşahidə olunur?

A) m.fleksor carpi ulnaris- biləyi bükən dirsək əzələsi
B) m.abduktor digiti minimi -çeçələ barmağı uzaqlaşdıran əzələ
C) m.ekstensor pollicis longus -baş barmağı açan uzun əzələ
D) m.opponens pollicis-baş barmağı qarşılaşdıran əzələ
E) m.abduktor pollicis brevis -baş barmağı uzaqlaşdıran əzələ

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

88) Sümük sinastozlarında sindaktiliyanın hansı forması müşahidə edilir?

A) Natamam

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Kompleks
C) Sadə
D) Tam
E) Sadə,tam

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

89) Aşağıdakıları qruplaşdırın.
I. sindaktiliya 1. Barmaqlarda hipoplaziya
II. braxidaktiliya 2. Yapışmış barmaq
III. klinodaktiliya 3. Eyri barmaq
IV. polidaktiliya 4. Barmaq dublikasiyası
V. makrodaktiliya 5. Barmaqlarda anormal böyümə

A) I-2, II-3, III-2, IV-1, V-4
B) I-2, II-4, III-5, IV-3, V-1
C) I-1, II-3, III-4, IV-2, V-5
D) I-2, II-1, III-3, IV-4, V-5
E) I-3, II-3, III-1, IV-4, V-5

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

90) Hansı qreft vətər qrefti kimi istifadə edilə bilməz?

A) M.fleksor pollicis longus
B) M. indicis proprius
C) M.fleksor digitorum superfacialis IV
D) M.palmaris longus
E) M.Plantaris

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

91) Sinir qrefti olaraq ən çox hansı donor sinir istifadə olunur?

A) N.radialis
B) N.axillaris
C) N.suralis
D) N.musculocutaneus
E) N.medianus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

92) Barmaqda distal falanqalar arası oynaq səviyyəsində və ovuc səthində kəsik olduqda hansı anatomik struktur zədələnmir?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) barmaqları bükən dərin əzələnin vətəri
B) barmaq arteriyaları
C) oynaq kapsulu
D) barmaq sinirləri
E) barmaqları bükən səthi əzələnin vətəri

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

93) Tenar nahiyyəsinin əzələ qrupu hansı sinirlə hərəki innervasiya olunur?

A) Bayır dəri əzələ siniri
B) Mil siniri
C) Dirsək siniri
D) İçəri dəri əzələ siniri
E) Orta sinir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

94) Əldə birinci barmaq aralığının arxa hissəsini hansı sinir innervasiya edir?

A) Bayır dəri əzələ siniri
B) Mil siniri
C) İçəri dəri əzələ sinir
D) Orta sinir
E) Dirsək sinir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

95) Aşağıdakılardan hansı sinirin bərpası metodlarına aid deyil?

A) Fassikulyar qrup bərpası
B) Qreftlə bəra
C) Aksonal bərpa
D) Epineyral bərpa
E) Fassikulyar bərpa

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

96) Aşağıdakı sinirlərdən hansı, sinir qrefti kimi istifadə oluna bilməz?

A) N.suralis
B) N. interosseus anterior
C) N.medianus cutaneus antibrachialis
D) N.medianus
E) N.letaralis cutaneus antebrachialis

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

97) Bükücü vətər anatomiyasında hansı nahiyyə "2 –ci kəszona" adlandırılır?

A) Bilək xəttindən əldarağı falanqa oynağı xəttinə qədər olan nahiyyə
B) Barmaq ucundan bilək xəttinə qədər olan nahiyə
C) Orta falanqanın mərkəzindən biləyə qədər olan nahiyə
D) Orta falanqanın mərkəzindən arxa ovuc xətti arasında qalan nahiyyə
E) Karpal tunel nahiyyəsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

98) Sinirin İkincili bərpasının hansı üstünlükləri var?

A) hamısı
B) Əməliyyatın planlaşdırılması daha yaxşı aparılır
C) Daha az infeksiyalaşır
D) sıxılmış və qəlpəli sümük zədələnmələrində normal fassikulyar diaqnozun qoyulması asan olur
E) Kök hüceyrənin bərpası üçün vaxt qazanılır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

99) Aşağıdakı faktorlardan hansı sinirin bərpasında vacib rol oynamır?

A) Xəstənin yaşı
B) Sinirin növü (hərəki /hissi)
C) Kəsilmənin səviyyəsi
D) Xəstənin cinsi
E) Bərpa metodu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

100) Sinir bərpasından sonra aksonal regenerasiyanın sürəti təqribən nə qədər olur?

A) 5-6 mm/gün
B) 3-4 mm/gün
C) 4-5 mm/ gün
D) 1-3 mm/ gün
E) 7-8 mm/gün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

101) Birincili sinir bərpasının üstünlükləri aşağıdakılardan hansıdır?

A) Sinir uclarının minimal gərginlikdə olması
B) Çapıqsız toxumada disseksiyanın daha rahat olması
C) Cərrahi müdaxilənin bir dəfə olması
D) Hamısı
E) Sinirin sağalması tez başlaması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

102) Barmaqları bükən səthi əzələnin vətəri ilkin olaraq hansı oynaqdan barmağı hərəkət etdirir?

A) əldarağı falanqa oynağından
B) Distal falanqalararası oynaqdan
C) Biləkarası oynaqdan
D) bilək əldarağı oynağından
E) Proksimal falanqalar arası oynaqdan

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

103) Birincili sinir bərpasının seçilməsində və tətbiqində nəyə diqqət yetirmək lazımdır?

A) yara təmiz və ya minimum kontagioz olmalıdır
B) Hamısına
C) sinir düzgün kəsilməlidir
D) Xəstə metabolik və emosional olaraq əməliyyata hazır olmalıdır.
E) yumşaq toxuma örtüyü və vaskulyarizasiya kifayət qədər olmalıdır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

104) Hansı Barmaqda sinir kəsikləri ilk növbədə bərpa edilməlidir?

A) III barmaq ulnar tərəf
B) V barmaq radial tərəf
C) II barmaq ulnar tərəf
D) Baş barmaqda ulnar tərəf
E) IV barmaq ulnar tərəf

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

105) Aşağıdakılardan hansı karpal tuneldən keçmir?

A) M.Fleksor digitorum superfacialis

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) M.Fleksor digitorum profundus
C) M. Fleksor carpi ulnaris
D) M.Fleksor pollicis longus
E) N.medianus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

106) Aşağıdakı sinirlərdən hansı sinir qrefti kimi istifadə oluna bilər?

A) Hamısı
B) bazunun orta dəri siniri
C) sümükarası sinirlər
D) Baldır siniri
E) saidin orta dəri siniri

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

107) Ən çox istifadə olunan vətər qreftləri hansılardır?

A) M.palmaris longus, M.pronator teres
B) M.pronator teres, M.anconeus
C) M.palmaris longus, M.plantaris
D) M.pronator teres, M.extensor digiti minimi
E) M.pronator teres, M.Plantaris

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

108) Hansı tip sinir zədələnməsində aksonlarda zədələnmə olmadan lokal ötürülmə blokadası müşahidə edilir?

A) Vallerian generasiyası
B) Aksonotmezis
C) neyropraksiya
D) Neyrotmezis
E) sanderland təsnifatına görə IV tip zədələnmə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

109) Sinir bərpasında zamanla əlaqəli ifadələrdən hansı doğrudur?

A) 5 və 7 gün ərzində aparılan bərpa " gecikmiş birincili bərpa" adlanır
B) Bir həftədən sonra aparılan bərpaya "ikincili bərpa " adlanır
C) ilk 8 saat ərzində olan sinir bərpası" birincili bərpa" adlanır
D) Ən geci 12 saat ərzində olan sinir bərpasına " birincili bərpa" adlanır
E) Hamısı

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

110) Hansı vətər biləyin bükülməsində iştrak etmir?

A) M.Fleksor carpi ulnaris biləyi bükən dirsək əzələ
B) M.abductor pollicis- baş barmağı qarşılaşdıran əzələ
C) M.Fleksor carpi radialis-biləyin bükən mil əzələ
D) M.Fleksor pollicis longus-baş barmağı bükən uzun əzələ
E) M.Palmaris longus -Ovucun uzun əzələsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

111) Aşağıdakı sinirlərin hansının bərpasında qalıq əlamət az qalır?

A) Said səviyyəsində dirsək siniri
B) Barmaq sinirləri
C) Mil siniri
D) Dirsək səviyyəsində orta sinir
E) Biləyin distal səviyyəsində orta sinir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

112) Karpal tunelin bıçaqla zədələnmələrində ən az zədələnmə ehtimalı olan anatomik struktur hansıdır?

A) Baş barmağı bükən uzun əzələ
B) Orta sinir
C) Mil siniri
D) Dirsək siniri
E) Səthi bükücü vətər

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

113) Dirsək sinirinin iflicində aşağıdakılardan hansı müşahidə edilmir?

A) Əlin palmar səthində IV və V barmaqların ulnar səthində hissiyatın itməsi
B) "sallanmış " bilək
C) Palmar və dorzal sümükarası əzələlərdə zəifliyin olması
D) Baş barmağın adduksiyasının itməsi
E) biləyin fleksiyasının itməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

114) Orta sinirin aşağı səviyyədə ifilicində yaranan ən ciddi hərəki funksiya itkisi hansıdır?

A) baş barmaq supinasiyası
B) Baş barmaq adduksiyası
C) Baş barmaq pronasiyası
D) Baş barmaq oppozisyası
E) Bilək fleksiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

115) Kəskin replantasiyaya göstərişlər hansılardır?

A) Baş barmağın amputasiyası
B) Birdən çox barmağın amputasiyası
C) Uşaq yaşlarında olan amputasiyalar
D) İkitərfli amputasiyalar
E) Hamısı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

116) Replantasiyada bərpa hansı ardıcılhıqla aparılır?
1. sümük
2. arteriya
3. vena
4. bükücü vətər
5. açıcı vətər
6. sinir

A) 2,1,4,6,5,3,
B) 1,2,3,4,5,6,
C) 1,4,2,5,3,6,
D) 1,2,6,4,3,5
E) 2,1,3,4,5,6,

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

117) Qopmuş barmaq əməliyyat otağına necə çatdırılmalıdır?

A) fizioloji məhlulla dolu olan qabda daşınır
B) qutunun içinə qoyulur, bu qutu ilıq suyun içində gətirilir
C) qopmuş barmaq təmiz bintə bükülərək gətirilir
D) ağzı bağlı qaba qoyulur , qab isə içərisində buzlu su olan başqa qaba qoyularaq daşınır
E) buzla dolu qabın içində gətirilir

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

118) Aşağıdakı amputasiya səviyyələrindən hansı bərpadan sonra daha çox funksional qabiliyyətə malik olur?

A) saidin amputasiyası
B) topuğun üstündən baldırın amputasiyası
C) Barmaq amputasiyası
D) Biləyin amputasiyası
E) Dizin yuxarısından ,budun aşağı 1/3 dən amputasiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

119) Volkman kontrakturası ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Etiologiyasında mütləq bazunun sınığı olur
B) Möhkəm və pis qoyulmuş gipsin təsiri ilə yarana bilər
C) Zədə almış əzələlərdə funksiya pozuntusu olur
D) Ətrafların passiv hərəkəti zamanı şiddətli ağrı yaranır
E) Ancaq saidin bükücü səthində əmələ gəlir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

120) Düpüytren kontrakturası aşağıdakılardan hansı ilə birlikdə rast gəlinmir ?

A) Plantar fibromatoz
B) Barmaq toxumasında kiçik şişkinliklər
C) Fibrosarkoma qabarıqlığı
D) Penis fibromatozu
E) Miofibroblast

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

121) Aşağıdakı ifadələrdən hansı səhvdir?

A) Amputant uzun müddət işemiyaya məruz qalması üçün dondurulur
B) Hamısı səhvdir
C) Bütün barmaqların amputasiyası zamanı V barmaqdan replantasiya başlanır
D) Amputasiyadan sonra proksimal hissədəki damarlar tapılıb qan dövranını pozmaq üçün bağlanmalıdır
E) Replantasiya zamanı birinci arteriyalar bərpa edilməlidir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

122) Aşağıdakılardan hansı replantasiyalarda mütləq göstəriş deyil?

A) Barmağın distal amputasiyası
B) ikitərəfli amputasiya
C) Uşaq amputasiyaları
D) Baş barmaq amputasiyası
E) Metakarpal səviyyədən saidə qədər olan nahiyyənin amputasiyası -total əl amputasiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

123) Amputantın transportu zamanı lazım olan optimal tempratur nə qədərdir?

A) + 4O C
B) 0O C
C) +2 O C
D) +18 O C
E) - 4OC

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

124) Volkmanın İşemik kontrakturasında ən çox xəsarət alan əzələ və sinir cütlüyü hansılardır?

A) M.Flexor Carpi Radialis-N.Medianus
B) M.Flexor Pollicis Longus-N.Ulnaris
C) M.Flexor Carpi Radialis-N.Ulnaris
D) M.Flexor Digitorum Profundus-N.Medianus
E) M.Flexor Digitorum Profundus-N.Ulnaris

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

125) Düpüytren xəstəliyində ən çox hansı barmaq zədələnir ?

A) Şəhadət
B) Orta barmaq
C) Üzük barmaq
D) Baş barmaq
E) Çeçələ barmaq

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

126) Bütün barmaqların amputasiyası zamanı birinci hansı barmağın replantasiyası aparılmalıdır?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) II və III barmaqları
B) I və III barmaqlar
C) IV və III barmaqlar
D) V və III barmaqlar
E) II barmaq

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

127) Bir çox replantasiya əməliyyatlarında ilk olaraq hansı tibbi prosedur icra edilməlidir?

A) Sümük fiksasiyası
B) Yaranın cərrahi işlənməsi
C) Yumşaq toxuma bərpası
D) Sinir bərpası
E) Arterial anastamoz

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

128) Orta sinirin aşağı səviyyədə iflicində rast gəlinən ən ciddi hərəki defisit hansıdır ?

A) Biləyin fleksiyası
B) Baş barmağın adduksiyası
C) Baş barmağın supinasiyası
D) Baş barmağın fleksiyası
E) Baş barmağın oppozisiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

129) Beşinci barmağın proksimal falanqalar arası oynağı səviyyəsində, anadangəlmə bükülmə deformasiyası necə adlanır ?

A) Klinodaktiliya
B) Kamptodaktiliya
C) Polidaktiliya
D) Sindaktiliya
E) Ameliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

130) Beşinci barmağın distal hissəsinin radial tərəfə deviasiyası ilə xarakterizə olunan anadangəlmə anomaliya hansıdır ?

A) Sindaktiliya

www.sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Klinodaktiliya
C) Kamptodaktiliya
D) Adaktiliya
E) Fokomeliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

131) Bükücü vətər zədələnmələri zamanı, " karpal tunel sindromu " hansı " sahə "də yaranır ?

A) Sahə 4
B) Sahə 5
C) Sahə 3
D) Sahə 2
E) Sahə 1

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

132) Hansı sinir biləyin stabil vəziyyətdə saxlanılmasını və barmaqların ekstensiyasını təmin edir?

A) N.Musculocutaneus
B) N.Ulnaris
C) N.Radialis
D) N.Medianus
E) N.cutaneus antibrachi lateralis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

133) Birincili sinir bərpa üsulunun seçilməsi və tətbiq olunması üçün aşağıdakılardan hansının olması vacib deyil ?

A) Xəstənin metabolik və emosinal vəziyyəti əməliyyata uyğun olmalıdır
B) Vətər Sinirlə birlikdə kəsilməməlidir
C) Sinir kəsilmə xətti düzgün olmalıdır
D) Əməliyyat Qrupunun mikrocərrahi təcrübəsi olmalıdır
E) Yara təmiz, infeksiyalaşması minimum səviyyədə olmalıdır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

134) Hansı düzgündür ?

A) Neyropraksiya mütləq cərrahi yolla müalicə edilməlidir
B) Proksimal səviyyəli sinir kəsiklərində proqnoz daha yaxşı olur

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Gecikmiş sinir bərpasında motor funksiya bərpa olunmaya bilər, hissi funksiya isə bərpa olunur.
D) Sinir hüceyrələrinin xüsusiyyətinə görə sinir bərpasında yaş faktorunun proqnoza təsiri yoxdur
E) Sinir bərpalarından dərhal sonra ətraf aktiv idman hərəkətləri etməlidir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

135) Aşağıdakı sinirlərdən hansı sinir qrefti kimi istifadə edilmir ?

A) N.Medianus
B) N.Suralis
C) n.interossei dorsales sinirinin terminal şaxəsi
D) n.antibrachii cutaneus lateralis et medialis
E) n.intercostalis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

136) Bükücü vətər zədələnmələri zamanı " No men's land " kimi adlandırılan sahə hansıdır?

A) Sahə 1
B) Sahə 5
C) Sahə 3
D) Sahə 2
E) Sahə 4

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

137) Hansı əzələnin vətərinin zədələnməsi əldə ciddi funksiya itkisinə səbəb olmur ?

A) M.Ekstensor pollicis longus
B) M.Palmaris longus
C) M.Fleksor digitorum profundus
D) M.Fleksor pollicis longus
E) M.Ekstensor digitorum communis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

138) Əldə ən əhəmiyyət kəsb edən barmaq arası dəri sahəsi hansıdır?

A) II və III barmaq arası dəri
B) III barmaq arası dəri
C) II barmaq arası dəri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) IV barmaq arası dəri
E) I barmaq arası dəri

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

139) Sinirin sağalması hansı amillərdən asılıdır?

A) Əməliyyat Vaxtının düzgün seçilməsi
B) Xəstənin yaşı
C) Bərpa texnikası ilə bağlı faktorlar
D) Hamısı
E) Sinir zədələnməsinin səviyyəsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

140) Süd vəzinin augmentasiyası zamanı protez hansı kəsik ilə yerləşdirilə bilər ?

A) Periareolyar , Submammarial
B) Periareolyar
C) Submammarian
D) Transaksilyar
E) Hamısı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

141) Aşağıdakıların hansı alt dodaq defektindən sonra bərpada istifadə olunan metodlardan biri deyil?

A) Burov
B) "wedge " rezeksiyası
C) Simanovski
D) Mustard
E) Karapandzic

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

142) Karapandzic metodu ilə bərpadan sonra ən çox rast gəlinən deformasiya hansıdır ?

A) Sfinkter funksiyasının itirilməsi
B) Persistent ağrı
C) Perioral paresteziya
D) Mikrostomiya
E) Selik axması

www.srsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

143) Mastektomiyadan sonra istifadə olunan ayaqcıqlı TRAM flebi (Transvers Rectus Abdominis Əzələ dəri flebi) qidalandıran müvafiq arteriya və vena hansıdır ?

A) Diafraqma-əzələ Arteriya –Vena
B) Arxa-döş Arteriya –Vena
C) Aşağı qarınüstü Arteriya –Vena
D) Qalçanın səthi dolanan Arteriya –Vena
E) Yuxarı qarınüstü Arteriya –Vena

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

144) 19 yaşlı qadın süd vəzinin hipoplaziyası səbəbiylə Poliklinikaya müraciət etmişdir. müayinə zamanı böyük döş əzələsinin olmaması, arxanın enli əzələsinin hipoplaziyası aşkar edilmişdir.Təxmini dianoz aşağıdakılardan hansı ola bilər ?

A) Poland sindromu
B) Treacher collins sindromu
C) Gorlin-Golts sindromu
D) Mafucci sindromu
E) Pier-robin sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

145) Süd vəzi giləsi və areola kompleksini hansı sinir innervasiya edir ?

A) 1-ci lateral interkostal sinir
B) Dərialtı sinir
C) Qoltuqaltı sinir
D) 2-ci lateral interkostal sinir
E) 4-cü lateral interkostal sinir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

146) Dodaq rekonstruksiyasında istifadə olunanlardan hansı "uzaq" fleb deyil ?

A) Platizma əzələ dəri flebi
B) alın flebi
C) Pectoralis major əzələ-dəri flebi
D) Bakamciem fleb
E) Karapandzic fleb

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

147) Süd vəzi rekonstruksiyasında hansı toxumalar istifadə olunur ?

A) Gluteus maksimus əzələ-dəri flebi
B) Hamısı
C) Süd vəzisinin öz toxuması (süd vəzisi böyük olduqda)
D) Rectus abdominis əzələ-dəri flebi
E) Latissimus dorsi əzələ-dəri flebi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

148) Gilə-areola kompleksinin bərpasına hansı aid deyil?

A) Cinsiyyət dodaqlarından piqment dəri qrefti istifadə oluna bilər
B) Müdaxiləyə ehtiyac yoxdur, getdikcə gilə nahiyəsinin rəngi dəyişir
C) Digər gilə nahiyəsindən qreft götürülə bilər
D) Süd vəzisi rekonstruksiyası ilə eyni seansda aparılmaması məsləhətdir
E) Tatuaj ilə gilə-areola düzəldilir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

149) Hansı kraniofassial anomaliya daha çox rast gəlinir ?

A) Hemifassial mikrosomiya
B) Goldenhar sindromu
C) Treacher Collins sindromu
D) Nagar sindromu
E) Bilateral kraniofassial mikrosomiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

150) Bilateral dodaq yarığı cərrahiyəsinin ağırlaşmalarına hansı aid deyil ?

A) Fit deformasiyası
B) Çapığın böyüməsi
C) Maksilyar retruziya
D) Qısa dodaq
E) Yaranın aralanması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

151) Aşağıdakılardan hansı yumşaq damaq-udlaq yarıqlarının cərrahi müalicə üsullarından deyil ?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Adenoidektomiya
B) push-back
C) Mukoperiostal ada flebi
D) Farinqoplastika
E) Faringeal fleb

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

152) Hansı əlamət Pier-Robin sindromunda müşahidə edilir ?

A) Triqonosefaliya
B) Retroqnatizm
C) Maksilyar hipoplaziya
D) Yarıq dodaq
E) Almacıq hipoplaziyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

153) Xəlbirəbənzər səfhə hansı kəllə sümüyünün hissəsidir?

A) Əng
B) Əsas
C) Xəlbir
D) Alın
E) Burun

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

154) Nəyə əsasən Birincili və ikincili damaq yarığı təsnifatı aparılır?

A) Yarığın böyüklüyü
B) Anadangəlmə və qazanılma olması
C) Qanadabənzər çıxıntı
D) Yanaşı dodaq yarığının olması
E) Kəsici dəlik (foramen İncisium)

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

155) Hansı dodaq-burun deformasiyasına aid deyil ?

A) Almacığın hipoplaziyası
B) Vermilyonun düzgün olmayan forması
C) Filtrum itirilməsi
D) Labiobukkal sulcusun az olması
E) Dodaqda horizontal artıqlıq

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

156) Aşağıdakılardan hansı kraniofassial deformasiya deyil ?

A) PLagiosefaliya
B) Kvadrosefaliya
C) Okulosefaliya
D) Skaposefaliya
E) Akosefaliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

157) Düpütryen xəstəliyinə hansı aid deyil ?

A) Müalicədə palmar fassiyaektomiya edilir
B) Əsasən baş barmaqda rast gəlinir
C) Proses üzük barmaqda başlayır
D) Xəstəliyin patogenezində palmar fassiyada destruktiv dəyişiklikləri durur
E) Kişilərdə daha çox müşahidə edlilir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

158) Aşağıdakılardan hansı Replantasiya zamanı ilk növbədə icra edilir ?

A) Arteriya anastomozu
B) Sinir bərpası
C) Vena anastamozu
D) Sümük fiksasiyası
E) Vətər bərpası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

159) Replantasiya zamanı cərrahi müdaxilələr hansı ardıcıllıqla aparılır ?

A) Vətər bərpası,sümük fiksasiyası, arteriya anastomozu, sinir bərpası
B) Sümük fiksasiyası, vətər bərpası, arteriya anastomozu, sinir bərpası
C) Sinir bərpası, arteriya anastomozu, vətər bərpası, sümük fiksasiyası
D) Arteriya anastomozu, vətər bərpası, sümük fiksasiyası, sinir bərpası
E) Sinir bərpası, vətər bərpası, arteriya anastomazu, sümük fiksasiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

160) Düpüytren kontrakturasını zamanı hansı anatomik struktur zədələnir ?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Palmar fassiya
B) açıcı vətərlər
C) barmaq venaları
D) barmaq sinirləri
E) barmaq arteriyaları

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

161) Aşağıdakılardan hansı düpüytren xəstəliyi ilə yanaşı rast gəlinən xəstəlikdir ?

A) Peyroni xəstəliyi
B) hiqroma Kista
C) Revmatoid artrit
D) Sistemli skleroz
E) fibroz Kista

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

162) Aşağıdakı faktorlardan hansı replantasiyanın nəticəsinə təsir edir ?

A) Siqaret çəkmə
B) Yaralanma forması
C) Hamısı
D) Yaralanmanın səviyyəsi
E) İşemiya vaxtı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

163) Distal digital amputasiyalarda revaskulyarizasiya üçün Hansı tikiş materialları istifadə olunur ?

A) 5/0
B) 8/0
C) 4/0
D) 6/0
E) 10/0

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

164) Düpüytren xəstəliyi üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyil ?

A) Xəstəlik əlin 4-cü barmağının palmar fassiyasının zədələnməsi ilə başlayır
B) Xəstəlik adətən ovucda dərinin distal hissəsində düyün şəklində başlayır
C) Palmar fassiyadakı dəyişikliklər penisdə (Peyroni) və plantar fassiyada da ola bilər

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Xəstəlik kompartman (işemik) sindromundan sonra inkişaf edir
E) Müalicə cərrahi olub çox vaxt palmar fassioektomiya şəklindədir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

165) Replantasiya əməliyyatları ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Əzələ toxuması bərpası zamanı işemiya riski nəzərə alınmalıdır
B) Ən uğurlu replantasiyalar qopmuş tip amputasiyalardan sonra aparılır
C) Uşaqlarda barmaq amputasiyalarında replantasiyaya mütləq göstəriş var
D) Travmadan sonra ilkin olaraq ümumi vəziyyət qiymətləndirilir, sonra tənəffüs və vaskulyarizasiya nəzarət altına alınır
E) Qopan hissə ilk yardım olaraq dərhal fizioloji məhlul ilə yuyulub bilavasitə buzla təmas etməyəcək şəkildə iki torbaya qoyulur

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

166) Hansı halda replantasiyaya göstərişi yoxdur ?

A) Bilək səviyyəsində amputasiya
B) Uşaqlarda barmaq amputasiyaları
C) Ağır əzilmə və geniş soyulma şəklində yaralanmalar
D) Başbarmağın amputasiyası
E) Multipl (birdən çox) barmaq amputasiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

167) Düpüytren xəstəliyi ilə birlikdə rast gəlinmə ehtimalı çox olan xəstəliklər hansılardır ?
1. Diabetes Mellitus
2. Ürək çatışmazlığı
3. Epileptik tutmalar
4. Xronik alkoqolizm
5. Kron xəstəliyi

A) 1-3-5
B) 1-3-4
C) 2-3-4
D) 1-2-3
E) 1-2-3-4-5

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

168) Aşağıdakılardan hansı " Volkman " işemik kontrakturası üçün doğru deyil ?

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sıxılmış nahiyənin daxilində təzyiqi artıran faktorlar eksternal (möhkəm gips ola bilər)
B) Əzələlərin işemik kontrakturası ilə əlaqədar olaraq “ pəncə əl ” deformasiyası inkişaf edir
C) Ən çox saiddə ektensor əzələlərin sıxılmasında rast gəlinir
D) Subfassial təzyiqin artması nəticəsində inkişaf edən işemik əzələ nekrozunun gecikmiş klinik formasıdır
E) Müalicə cərrahi yolladır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

169) Replantasiya zamanı qopan hissələr hansı sıra ilə bərpa olunur ?
1. Dəri
2. Sinir
3. Arteriya
4. Sümük
5. Vena
6. Fleksor və ekstensor vətərlər

A) 6-4-5-2-3-1
B) 1-2-3-4-5-6
C) 4-6-3-5-2-1
D) 2-4-5-3-6-1
E) 4-5-3-2-6-1

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

170) Hansı halda aşağı ətrafın itirilməsi ehtimalı yüksəkdir ?

A) İntraartikulyar komponentli kalkaneal əzilmə və ya açıq topuq yarası
B) Seqmental qamış sinir itkisi
C) Devaskulyarizasiya olmuş ayaq
D) Plantar səthin qopması
E) Hamısı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

171) Aşağıdakı hallardan hansı Düpüytren kontrakturasına aid deyil ?

A) Əldə yanıq
B) Hepatit B infeksiyası
C) Epilepsiya
D) Diabetes mellitus
E) Xronik alkoqolizm

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

172) Hansı halda Düpüytren kontrakturası zamanı əməliyyata göstəriş var?

A) bilək falanqa oynağının 20O-dən böyük kontrakturası
B) Biləyin stabil vəziyyətdə durması
C) Saidin pronasiya kontrakturası
D) bilək falanqa oynağının 5O-dən kiçik kontrakturası
E) Proksimal falanqalar arası oynaq kontrakturasının 15O-dən böyük olmaması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

173) Volkman kontrakturasında əl və said hansı vəziyyəti ala bilməz?

A) bilək falanqa oynağının fleksiyası
B) Saidin supinasiyası
C) Biləyin fleksiyası
D) Saidin pronasiyası
E) proksimal və distal falanqalar arası oynaqlarda barmaqların fleksiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

174) Volkmanın işemik kontrakturası üçün hansı doğrudur ?

A) Müalicəsi zədələnmiş qolun amputasiyasıdır
B) zədələnmiş ətrafa əzələ transferi (köçürmə) mümkün deyil
C) səbəbi suprakondilyar bazu sınıqlarıdır
D) kompartman sindromunun gecikmiş formasıdır
E) bilək supinasiya vəziyyətindədir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

175) Aşağıdakılardan hansı Düpüytren xəstəliyinə aiddir ?

A) Granulomatoz iltihab
B) Palmar fassiada nekroz
C) Bükücü vətərlərdə spontan yırtılma
D) Limfatik infiltrasiya
E) Birləşdirici toxumada fibroz

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

176) Aşağıdakılardan hansı Düpüytren xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan cərrahi metoddur ?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Bükücü vətərlərin ləğv olunması
B) Regional fassioektomiya
C) Neyroliz
D) Açıcı vətərlərin burulması
E) Vətərlərin köçürülməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

177) Hansı faktor replantasiya üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir ?

A) Hamısı
B) Mövcud olan digər xəstəliklər
C) Zədələnmənin yaranma mexanizmi
D) Xəstənin yaşı
E) Zədələnmədən ötən müddət

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

178) Amputasiya-replantasiya ilə bağlı aşağıdakılardan hansı düzgündür ?

A) barmağa gedən damarlar möhkəmləndikdən sonra sümük və vətər ikinci seansda bərpa edilir
B) Uşaqlarda postoperativ nəzarət çətin olduğu üçün replantasiyaya nadir hallarda göstəriş olur
C) Replantasiya zamanı qopmuş üzvün saxlanma müddəti vacib əhəmiyyət daşımır
D) Replantasiya zamanı qopmuş hissələrin qidalanması bir arteriya ilə təmin olunmalıdır
E) Üzüklə əlaqəli zədələnmələrdə proqnoz pis olduqda replantasiya etmək olar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

179) Hansı hal Düpüytren kontrakturasında müalicədən sonra residiv vermə ehtimalını artırır?

A) Yanaşı Peyroni xəstəliyinin olması
B) Xəstənin gənc olması
C) Ayağın plantar nahiyəsində oynaq yastıqcıqlarının olması
D) Əlin açıcı səthində düyünlərin olması
E) Alkaqol qəbulu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

180) Düpüytren xəstəliyində hansı anatomik struktur zədələnir ?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Grayson bağı
B) M.Fleksor carpi ulnaris-vətəri
C) M.Palmaris longus-vətəri
D) Kleland bağı
E) M.Fleksor digitorum superficialis-vətəri

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

181) Düpüytren xəstəliyi hansı xəstəliklər ilə birlikdə rast gəlinə bilər ?

A) Xronik ağciyər xəstəlikləri
B) Diabetes mellitus
C) Hamısı
D) Tuberkulyoz
E) Xroniki alkoqolizm

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

182) Volkman işemik kontrakturasında hansı əzələlər daha ağır zədələnir ?

A) M.Brachioradialis, M.Abductor pollicis longus
B) M. Ekstensor digitorum communis, M.fleksor carpi radialis
C) M.Fleksor digitorum superficialis, M.Fleksor pollicis longus,
D) M.Fleksor carpi ulnaris, M.fleksor carpi radialis
E) M.Fleksor pollicis longus, M.fleksor digitorum profundus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

183) Aşağıdakılardan hansı "sindaktiliya" təsnifatına aiddir ?

A) Hamısı
B) tam
C) sadə
D) kompleks
E) natamam

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

184) "Kampodaktiliya" nədir?

A) III barmağın proksimal falanqalararası oynağında açıcı deformasiyası
B) Baş barmağın proksimal falanqalararası oynağında açıcı deformasiyası
C) IV barmağın distal falanqalararası oynağında bükücü deformasiyası
D) II barmağın distal falanqalararası oynağında açıcı deformasiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) V barmağın proksimal falanqalararası oynağında izolə olunmuş, bükücü deformasiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

185) Sindaktiliyalarda cərrahi əməliyyatın vaxtının seçilməsi ilə bağlı olaraq aşağıdakılardan hansı düzdür?

A) əməliyyat nəticəsinin uğurlu olması üçün reabilitasiya ve uşağın ictimai mühitdə olmağı lazımdırsa, cərrahi müdaxilənın "dörd yaşından sonra" həyata heçirilməsi məqsədə uyğundur
B) Əgər cərrahi əməliyyat sonrası " qazanılacaq" barmaqlarda kortikal readaptasiya lazımdırsa,cərrahi müdaxilə "üç yaşından əvvəl " həyata keçirilməlidir.
C) anadangəlmə bant sindromunda olduğu kimi barmaqların, muvafiq ətraf hissələrinin yaşaması üçün təxirəsalınmaz cərrahi müdaxiləyə ehtiyac duyulur.
D) Aşağıdakıların hamısı doğrudur
E) Sümüklərdə də bitişiklik varsa əməliyyat 6 aylıq ikən aparılmalıdır,yoxdursa(sadə tip 1) 1yaşına qədər ləngidilə bilər.

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

186) 1950 və 1960cı illərdə istifadə olunan,ətraf anomaliyalarına yol açan preparat hansıdır?

A) Gentamisin
B) Bleomisin
C) Talidamid
D) Penisillin
E) Trixlor asetat turşusu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

187) 5-ci barmağın proksimal falanqalar arası oynaq səviyyəsindəki anadangəlmə fleksiyon deformasiyasına necə adlanır?

A) Klinodaktiliya
B) Kamptodaktiliya
C) Sindaktiliya
D) Ameliya
E) Polidaktiliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

188) Barmaqların bir-birinə yapışma deformasiyasına necə adlanır?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Fokomeliya
B) Ameliya
C) Klinodaktiliya
D) Polidaktiliya
E) Sindaktiliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

189) Aşağıdakılardan hansı anadangəlmə əl anomaliyası deyil?

A) Paronixiya
B) Makrodaktiliya
C) Klinodaktiliya
D) Sindaktiliya
E) Polidaktiliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

190) Aşağıdakılardan hansı sindaktiliyaya aid deyil?

A) Kişilərdə daha çox rast gəlinir
B) Daha çox 3-cü və 4-cü barmaqlar arasında rast gəlinir
C) Sadə və kompleks ola bilər
D) Dogulan kimi əməliyyata ehtiyac yaranır
E) Autosom dominant yolla ötürülür

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

191) Yuxarı ətrafın proksimal hissəsinin defekti ilə xarakterizə olunan anomaliya hansıdır?

A) Fokomeliya
B) Amelya
C) Afalangiya
D) Sindaktiliya
E) Klinodaktiliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

192) 5-ci barmağın distal nahiyyəsinin radial tərəfə deviasiyasi ila xarakterizə olunan anadangəlmə anomaliya hansıdır?

A) Sindaktiliya
B) Klinodaktiliya
C) Fokomeliya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Adaktiliya
E) Kamptodaktiliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

193) Aşağıdakılardan hansı ən çox rast gəlinən əl anomaliyasıdır?

A) Polidaktiliya
B) Yarıq əl
C) Makrodaktiliya
D) Sindaktiliya
E) Klinodaktiliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

194) Qocalma ilə əlaqədar dəridə meydana çıxan dəyişikliklərə hansı aid deyil?

A) Dərialtı toxumaların adgeziyasının azalması
B) Dərinin piqmentasiyası
C) Piy atrofiyası
D) Dərinin qalınlığının artması
E) Dərinin elastikliyinin itməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

195) Hansı xəstəlik zamanı üz dartma əməliyyatı əks göstərişdir?

A) Şəkərli Diabet
B) Dematofibrosarkoma
C) Epilepsiya
D) Hipodireoidizm
E) Bronxial astma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

196) Yanıq restitusiyasının yetərsizliyini göstərən ən dəqiq əlamət hansıdır?

A) Xəstənin huşu
B) Ağciyər kapilyar təzyiqi
C) Arterial qan təziyiqi ve ürəyin vurğu həcmi
D) Mərkəzi venoz təzyiq
E) Sidik ifrazının azalması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

197) Termiki travma nəticəsində immun sistemdə hansı proses baş vermir ?

A) T limfosit funksiyalarında azalma
B) Neytrofil funksiyalarının azalması
C) T supressor aktivliyində azalma
D) Retikulo Endotelial Sistem funksiyalarında azalma
E) Fibronektinin azalması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

198) Rinoplasika əməliyyatının hansı mərhələsində qanaxma riski yüksəkdir?

A) Septoplastika
B) Burun əsasının plastikası
C) Medial osteotomiya
D) Burun ucunun plastikası
E) Lateral osteotomiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

199) Blefaroplastikadan əvvəl hansı müayinənin aparılmasına ehtiyac yoxdur ?

A) Görmə itiliyinin yoxlanılması
B) Gözə Təzyiq testi
C) Görmə sahəsinin yoxlanılması
D) Schirmer testi ilə gözyaşı sekresiyasının dəyərləndirilməsi
E) Göz alması hərəkətliliyini yoxlanılması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

200) Yanıq sahəsinin təyinində" 9-lar" prinsipində səhvi tapın.

A) Aralıq- 2%
B) Gövdənin ön səthi- 18%
C) Baş- 9%
D) 1 aşağı ətraf – 18%
E) 1 yuxarı ətraf- 9%

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

201) Yanıq haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) 3-cü dərəcəli yanıqda vezikul-bulla meydana çıxır
B) 4-cü dərəcə yanıq dərialti toxumaya qədər keçir
C) 3-cü dərəcə yanıq olduqca ağrılıdır

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 1-ci dərəcə yanıq epidermislə sərhədlənir
E) 2-ci dərəcəli yanıqda eritema əmələ gəlir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

202) Aşağıdakı əməliyyatlardan hansı kosmetik cərrahiyyəyə aid deyil?

A) Süd vəzini böyütmə əməliyyatı
B) Üz dartma əməliyyatı
C) Süd vəzini kiçiltmə əməliyyatı
D) Rinoplastika əməliyyatı
E) Dodaq yarığının bərpası əməliyyatı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

203) Dodaq yarığı üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Damaq yarığı ilə birlikdə rast gəlinə bilər
B) Dodaq yarığı unilateral və bilateral müşahidə edilir
C) Dodaq yarığı ancaq unilateral müşahidə edilir
D) 3 aydan əvvəl əməliyyat olunmalıdır
E) Dodaq yarığının bərpası əsasən Millard üsulu ilə aparılır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

204) Damaq yarığı ilə bağlı səhvi seçin.

A) Körpə əmməkdə çətinlik çəkir
B) Əməliyyatdan sonrakı əsas ağırlaşması fistulun əmələ gəlməsidir
C) Kompleks vəya kompleks olmayan tipi var
D) Velofaringeal çatışmazlıq və nitq qüsuru müşahidə edilir
E) Uşaq 3 aylığından tez əməliyyat edilməlidir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

205) Kraniosinostoz haqqında hansı səhvdir?

A) Hidrosefaliya ən çox rast gəlinən kraniosinostoz növüdür
B) əməliyyatın məqsədi dismorfogenezin və funksional pozgunluqların aradan qaldırılmasıdır
C) təsnifatı Prosesə məruz qalmıs tikişə və əmələ gələn deformasiyaya görə aparılır
D) əsas səbəbi Tikişlərin tez bağlanmasıdır
E) Əsas funksional risk kəllədaxili təzyiqin artmasıdır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

206) Hansı anatomik struktura əsasən birincili və ikincili damaq yarığı təsnif olunur?

A) Foramen ceracum
B) Foramen incisivum
C) Uvula
D) Os palatinus
E) Foramen palatinum major

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

207) Hansı damaq əzələsi deyil?

A) M.Levator veli palatini
B) M.palatoglossus
C) M. uvula
D) M. Myohyoideus
E) M.glossopharingeus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

208) Aşağıdakı ağırlaşmalardan hansı damaq yarığı olan uşaqda rast gəlinə bilər?

A) Nitq problemləri
B) Hamısı
C) Orta qulağın iltihabı
D) Qidalanma problemləri
E) Aspirasion pnevmoniya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

209) Skafosefaliyada hansı tikiş tez bağlanır?

A) Koronar tikiş
B) Sagital tikiş
C) Metopik tikiş
D) Metopik tikiş və Koronar tikiş
E) Lambdayabənzər tikiş

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

210) Hansı sindrom üçün akrosefalodaktiliya xarakterikdir ?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Karpester sindromu
B) Krouzon sindromu
C) Apert sindromu
D) Pfeyfer sindromu
E) Sezre-Kotzen sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

211) Damaq yarığı deformasiyası əsasən hansı əməliyyat metodu ilə aradan qaldırılır ?

A) Le-fort
B) Ternison-Randall
C) Millard
D) Mohler
E) Veau-Vardill-Kilner

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

212) Dodaq və damaq yarıqları ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir ?

A) Damaq bərpası dodaq əməliyyatından ən azı altı ay sonra aparılmalıdır
B) Udma funksiyası pozulduğu üçün damaq yarığı olan xəstələr əməliyyata qədər nazoqastral zondla qidalandırılmalıdırlar
C) Dodaq və Damaq yarıqlarında nitq qüsuru müşahidə edilmir
D) Əməliyyatlarda ən çox Millard üsulundan istifadə olunur
E) Damağın inkişafının pozulmaması üçün əməliyyat ən azı üç yaşa qədər ləngidilməlidir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

213) İki frontal sümük arasındakı tikiş hansıdır?

A) Frontal və Sagital tikiş
B) Lyambdayabənzər tikiş
C) Koronar tikiş
D) Metopik tikiş
E) Sagital tikiş

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

214) Hansı spesifik patologiya məhz Kraniosinostoz üçün səciyyəvidir ?

A) Doğuş Travması
B) Kranial tikişlərin tez sorulması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Başın ölçülərinin normadan böyük olması
D) Kəllə daxili təyziqin artması
E) Kranial tikişlərin gec bağlanması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

215) Damaq yarığının etiologiyası ilə bağlı hansı səhvdir?

A) Çoxsaylı faktorların təsiri
B) hamiləliyin 20 həftəliyində dərman preparatlarının qəbulu
C) Hamiləliyin ilk 2 həftəsi ərzində dərman preparatlarının qəbulu
D) Hamiləlikdə alkaqol qəbulu
E) Hamiləlikdə Qıcolma əleyhinə preparatların qəbulu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

216) Dodaq yarığının bərpasında hansı əzələ bərpa edilməlidir?

A) m.angulus depressor oris-Ağız bucağını endirən əzələ
B) m.zygomatis major- Böyük almacıq əzələsi
C) m.levator labium superior-Y uxarı dodağı qaldıran əzələ
D) m.levator labium inferior- Aşağı dodağı endirən əzələ
E) m.orbicularis oris-Ağızın dairəvi əzələsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

217) Dodaq-damaq yarığı olan ailənin növbəti uşağında eyni patologiyanın olma riski nə qədərdir?

A) 4%
B) 8%
C) 16%
D) 12%
E) 1%

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

218) Hansı damaq əzələsi üçlü sinirin çənə şaxəsi ilə innervasiya olunur?

A) m.uvulae
B) m.levator veli palatini
C) m.palatopharingeus
D) m.palatoglossus
E) m.tensor veli palatini

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

219) Hansı preparatın Hamiləlik zamanı istifadəsi kraniofassial anomaliya riskini artırır?

A) Talidomid
B) Fenitoin
C) Kortikosteroidlər
D) Hamısı
E) Tretinoin

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

220) Ən çox rast gəlinən kraniofassial anomaliya hansıdır?

A) "Teacher Collins " sindromu
B) Bilateral hamifassial mikrosomiya
C) Nagor sindromu
D) Hemifassial mikrosomiya
E) Golderhar sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

221) Dodaq-damaq yarığı, glossoptoz, mikroretrognatiyadan ibarət sindrom hansıdır?

A) Vardenberq sindromu
B) Piyerr-robin sindromu
C) Apert sindromu
D) 13-cü xromosomun trisomiyasısı
E) Van Der Ueyd sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

222) Nitq probleminin olmaması üçün damaq yarığının müalicəsi ən gec nə vaxt aparılmalıdır?

A) 5 yaş
B) 6 yaş
C) 4 yaş
D) 2 yaş
E) 3 yaş

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

223) Dodaq yarıqları nə vaxt əməliyyat edilir?

A) 14-16 aylıqda
B) 16-18 aylıqda
C) 2.5-6 aylıqda
D) 8-12 aylıqda
E) 12-14 aylıqda

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

224) Damaq yarığı olan yenıdoğulmuş necə qidalanmalıdır?

A) Sağ tərəfi üstə
B) Qarnı üstə
C) 45 dərəcə maili vəziyyətdə
D) Sol tərəfi üstə
E) Arxası üstə uzanıqlı vəziyyətdə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

225) Aşağıdakılardan hansı kraniofassial cərrahiyyənin ağırlaşmalarına aiddir ?

A) Kəllədaxili hematoma
B) Korluq
C) Hidrosefaliya
D) Hamısı
E) Meningit

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

226) Hansı halda Kraniofassial cərrahiyyə əməliyyatı aparılır?

A) Krouzon sindromu zamanı
B) Hamısı düzdür
C) Apert sindromu zamanı
D) Piyerre-Robin sindromu zamanı
E) Golderhar sindromu zamanı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

227) Dodaq-damaq yarıqları ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Rastgəlinmə tezliyi 1/750 ilə 1/1000 arasındadır
B) Etiologiyası multifaktorialdır
C) Müxtəlif sindromların tərkibində rast gəlinir

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Yerli anesteziya ilə əməliyyat aparılır
E) Cərrahi müalicəsində “10- lar” qaydası əsasdır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

228) Ən çox rast gəlinən damaq yarığı hansıdır?

A) İkincili natamam damaq yarığı
B) Birincili natamam damaq yarığı
C) Dilçəyin ikiləşməsi (Bifid uvula)
D) İkincili tam damaq yarığı
E) Birincili tam damaq yarığı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

229) Kraniosinostozlar haqqında hansı doğrudur?

A) Plagiosefaliya daha çox rast gəlinən patologiyadır
B) ən gec Metapik tikiş bağlanır
C) Prosesə məruz qalan tikişə perpendikulyar böyümə davam edir
D) Xəstələrin 80% də hər hansı sindroma bağlı inkişaf edir
E) Prosesə məruz qalan tikişə paralel böyümə davam edir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

230) Ən çox rast gəlinən izolyasiya olunmuş tikiş sinostozu hansıdır?

A) Holoprozonsefaliya və Plagiosefaliya
B) Skafosefaliya
C) Holoprozonsefaliya
D) Plagiosefaliya
E) Trigonosefaliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

231) Damaq yarığının bərpası üçün ən uyğun yaş hansıdır?

A) 8 ay
B) 4-6 ay
C) 20 ay
D) 24 ay
E) 12-14 ay

Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

232) Damaq yarığının bərpasında qarşıya qoyulan əsas məqsədə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Aspirasyon pnevmoniyanın qarşısının alınması
B) Üz inkişafının pozulmasının qarşısının alınması
C) Qidalanma probleminin aradan qaldırılması
D) Qulaq infeksiyalarının əmələ gəlməsinin qarşısının alınması
E) Nitq probleminin aradan qaldırılması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

233) Yanıqla bağlı gecikmiş ağırlaşmalar hansıdır?

A) Estetik problemlər
B) Psixoloji problemlər
C) əmək qabiliyyətinin itirilməsi
D) Hamısı
E) Çapıq kontrakturası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

234) Yanıq zamanı əmələ gələn çapıq toxumasının müalicə variantları hansıdır?

A) Hamısı
B) Qreft
C) Lokal flep
D) Sərbəst flep
E) Z plastika

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

235) Üzün qocalmasına səbəb olmayan faktor hansıdır?

A) Ani çəki dəyişiklikləri
B) Genetik faktorlar
C) Piylənmə
D) Günəş şüalarına çox məruz qalmaq
E) Emosional faktorlar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

236) 30 kiloqramlıq uşağın bazal günlük maye ehtiyacı nə qədərdir?

A) 2000 ml
B) 2200 ml

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 1500 ml
D) 1700 ml
E) 1000 ml

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

237) Hansı sindrom zamanı 15-ci xromosomda mutasiya ,fibrin zulalının defisiti nəticəsində birləşdirici toxumanın zədələnməsi baş verir?

A) Ehler-Danlos sindromu
B) Apert sindromu
C) Werner sindromu
D) Marfan sindromu
E) Pfeyfer sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

238) Hansı hospitalizasiyaya göstəriş deyil?

A) Böyüklərdə Bədən səthinin 20% dən çoxunu əhatə edən yanıqları
B) Inhalyasiya yanıqları
C) Üz, əl, ayaq yanıqları olan xəstələr
D) Bədən səthinin 10% dan çoxunu əhatə edən II dərəcəli yanıqlar
E) Bədən səthinin 10% dan çoxunu əhatə edən I dərəcəli yanıqlar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

239) Hansı halda yanığı olan xəstənin yanıq mərkəzinə aparılmasına ehtiyac yoxdur?

A) Bədən səthində yanığın 20% dən çox olması
B) Üzdə, əldə, ayaqda, aralıqda yanığın olması
C) Xəstənin komada olması
D) Böyüklərdə bədən səthinin 5%-nin yanması
E) İnhalyasiya yanığı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

240) epidermisin yalnız üst qatlarının zədələnməsinə səbəb olan yanıq neçənci dərəcəlidir?

A) Səthi II
B) III
C) I
D) Dərin II

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) II və III

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

241) ikincili burun əməliyyatları zamanı toxuma artırmaq üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?

A) Sümük
B) Qığırdaq və sümük
C) Hamısı
D) Qığırdaq
E) Bioimplantlar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

242) Kimyəvi yanıqla təcili yardıma qəbul edilmiş xəstəyə təcili olaraq hansı müdaxilənin aparılmasına ehtiyac yoxdur?

A) Ağrıkəsicilərin inyeksiyası
B) Damar yolu ilə maye köçürməyə başlamaq
C) Yanıq nahiyyəsini yumaq
D) Yanığı əmələ gətirən maddəni tapmaq
E) Antibiotik mualicəsinə başlamaq

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

243) Üzdə olan sıyrıqların müalicəsinə hansılar aiddir?

A) Dermobraziya
B) tam qalınlıqlı dəri qrefti
C) İncə dəri qrefti
D) Flep ilə bağlama
E) Sarğı və müşahidə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

244) Hansı əməliyyat yalnız kosmetik məqsədlə aparılır ?

A) Çəpər əyriliyinin aradan qaldırılması
B) Progeniyanın aradan qaldırılması
C) Liposaksiya ilə kontur düzəltmə
D) Makromastiyada süd vəzisinin kiçildilməsi
E) Total süd vəzi rekonstruksiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

245) Neçənci dərəcəli yanıq yarası terapevtik müalicə ilə tam sağalmır?

A) Dərin II dərəcə
B) III dərəcə
C) I dərəcə
D) Səthi II dərəcə
E) I və səthi II dərəcə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

246) Hansı yanıqlarda klassik düsturlara əsasən köçürülməsi lazım olan miqdardan daha artıq maye köçürmək tələb olunur?

A) Bədənin ümumi səthinin 80% dən artıq yanıqlarında
B) Körpə uşaq yanıqlarında
C) Elektrik yanıqlarında
D) Hamısı
E) İnhalyasiya yanıqları ilə birgə yanıqlarda

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

247) Süd vəzisinin protez ilə böyüdülməsi əməliyyatı zamanı hansı ağırlaşmalar yarana bilər ?

A) İnfeksiya
B) Hematoma
C) Kapsulyar kontraktura
D) Hamısı
E) İmplantın cırılması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

248) Dəridəki çapıq və qırışlar hansı üsulun köməyi ilə aradan qaldırılır ?

A) Dermobraziya
B) Kimyəvi soyma
C) Hamısı
D) piy toxumasının inyeksiyası
E) Lazer

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

249) Qocalan dəridə nə kimi dəyişikliklər əmələ gəlir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Dərinin elastikliyinin azalması
B) Hamısı
C) Dərinin qalınlığının azalması
D) Piy atrofiyası
E) Dərinin dərialtı toxuma ilə birləşməsinin zəifləməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

250) Elektrik yanıqları ilə bağlı səhv hansıdır?

A) III dərəcəli yanıqlarda təmas və ağrı hissiyyatı olmur
B) Mioqlobinuriya müşahidə olunarsa mütləq mannitol istifadə olunmalıdır
C) Elektrikə ən yüksək müqaviməti olan toxumalar damarlar,sinirlər və sümüklərdir
D) Dərinin II və III dərəcəli yanıqları zamanı adətən yerli antibiotiklərin təyini məsləhətdir
E) İlk 12 saatda kolloid mayelərin köçürülməsi məqsədə uyğun deyil

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

251) Pulaski və Tennisona görə doqquzlar qaydasına uyğun olmayan hansıdır?

A) Baş 9%
B) Hər bir yuxarı ətraf 9%
C) Hər bir aşağı ətraf 9 %
D) Aralıq 9%
E) Gövdənin ön səthi 18%

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

252) Aşağıdakılardan hansı kosmetik cərrahiyyəyə aid deyil?

A) Üz dartma
B) Blefaroplastika
C) Liposaksiya
D) Alın dartma
E) Dodaq-damaq yarığının bərpası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

253) Liposaksiya nədir?

A) Daxili orqanların ətrafındakı piy toxumasının xaric edilməsi
B) Göz qapaqlarındakı yağın xaric edilməsi
C) Dərman preparatları ilə yağların miqdarının azaldılması
D) Piy toxumasının kəsilərək ekssiziya edilməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Xüsusi aspirator vasitəsilə bədən konturlarını pozan piylərin bədəndən xaric edilməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

254) Aşağıdakılardan hansı yanıq müalicəsində istifadə olunan elektrolit mayelərə aid deyil?

A) Qan plazması
B) Qələvi mayelər
C) Ringer laktat
D) Dekstrozalı ringer laktat
E) Fizioloji məhlul

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

255) Aşağıdakılardan hansı Maye çatışmazlığının klinik simptomlarına aid deyil ?

A) Tərləmə
B) Qusma
C) bədən tempraturunun aşağı düşməsi
D) Mərkəzi Sinir Sistemi pozulmaları
E) Susuzluq hissiyatı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

256) Molyar augmentasiya nədir?

A) Maksillar implant öncəsində yetərli sümük qalınlığı,yüksəkliyi və genişliyi əldə etmək üçün tətbiq edilən əməliyyatdır
B) Molyar dişlərin protezləridir
C) Molyar sahəyə implantın qoyulmasıdır
D) Molyar sahənin tunerlərinin çıxarılmasıdır
E) Molyar sahənin sınıqlarının müalicə üsuludur

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

257) Estetik cərrahiyyə üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Kimyəvi soymada fenol istifadə edilir
B) Blefaroplasikada göz qapaqlarında əməliyyat aparılır
C) Liposaksiya arıqlama metodudur
D) Sizanaqdan sonrakı çapıqlarda dermobraziya istifadə edilir
E) Rinoplastikada həm estetik həm də funksional nəticə əldə edilməlidir

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

258) Yanıq zamanı hansı hal traxeostomiyaya göstərişdir?

A) Traxeanın zədələnmələri
B) Ağız boşluğuna qusuntu kütlələrinin yığılması
C) Hamısı
D) İnhalyasiya yanıqları
E) Kəllə beyin travmaları

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

259) Yanıq haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Müalicədə mayelərin köçürülməsi vacibdir
B) Yanıq sahəsi doqquzlar qaydası ilə təyin edilir
C) Antibiotiklərlə müalicə mütləqdir
D) III dərəcəli yanıqlarda dərinin bütün qatları zədələnir
E) Təsnifatı Dərinliyinə və sahəsinə görə aparılır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

260) Yanıq sahəsi neçə faiz olduqda hospitalizasiya lazımdır?

A) 7%
B) 10%
C) 20%
D) 5%
E) 9%

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

261) Parkland formuluna görə yetkin xəstənin ilk 24 saatdakı maye ehtiyacı nə qədərdir?

A) 2000 mm x xəstənin boyu (m) /xəstənin ağırlığı (kg)
B) Yanıq sahəsi faizlə miqdarının x 200mm x xəstələrin boyu
C) 4mm x xəstənin bədən səthi x yanıq sahəsinin faizlə miqdarı
D) 4mm x xəstənin çəkisi (kg) x yanıq sahəsinin faizlə miqdarı
E) 10mm x xəstənin ağırlığı (kg) x yanıq sahəsinin faizlə miqdarı x xəstələrin boyu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

262) 32 yaşlı qadın 4 ildir ki, qulaq önü törəmənin olması şikayəti ilə ilə klinikaya daxil olmuşdur. Xəstənin fiziki müayinəsində dərin qulaq önu yerləşən təxminən 3x4 cm hərəkətli bir kütlə təyin edilmişdir.Boyun limfadenopatiyası inkar edilən bu xəstəyə yüksək ehtimalla hansı diaqnozu qoymaq olar?

A) Onkositoma
B) Qarışıq şiş
C) Limfoma
D) Pilomatriksoma
E) Pleomorfik adenokarsinoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

263) Aşağıdakılardan hansı bədxassəli parotis (qulaq dibi tüpürcək vəzisi) şişlərindən deyil?

A) Adenoid kistalı karsinoma
B) Limfoma
C) Asinar hüceyrə şişi
D) Mukoepidermoid karsinoma
E) Pilomatriksoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

264) Aşağıdakılardan hansı hemangioma müalicəsində istifadə edilmir?

A) Antiplatelet agentlər
B) Hemangiomadaxili flukanazol
C) Triamsinolon asetonid
D) Hemangiomadaxili OK-432
E) İnterferon alfa 2a

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

265) Vaskulyar anomaliyalar üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Hemangiomalar adətən qazanılmış olur
B) Vaskulyar malformasiyalar bədənlə mutənasib olaraq böyüyürlər
C) Hemangiomalar zəif və sürətli axımlı zədələnmələr olaraq təsnif olunur
D) Vaskulyar malformasiyaların venoz mənşəliləri pulsasiya etmirlər, yumşaqdırlar
E) Hemangiomalar bir çox hallarda proliferasiyası və involyusiyası 7 yaşına kimi tamamlanır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

266) Trombositlərin tutulması ilə əlaqəli, həyat üçün təhlükəli kaogulopatiya hansı hemangioma üçün xarakterikdir?

A) Mafucci sindorumu
B) Klaynfelter sindorumu
C) Klippel-trenaunay sindorumu
D) Kasabax-Meritt sindorumu
E) Osler-Veber-Rendu sindorumu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

267) Hansı cibin xərçənginə daha çox rast gəlinir?

A) Xəlbir cibi
B) Əng cibi
C) Xəlbir cibi, Əsas cib
D) Əsas cibi
E) Alın cibi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

268) Parotis vəzisinin ən çox rast gəlinən xoşxassəli şişi hansıdır?

A) Monoformik adenoma
B) Xoşxassəli miks şiş
C) Onkositoma
D) Xoşxassəli limfoepitelial törəmə
E) Varthin şişi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

269) Tüpürcək vəzi şişlərində, histoloji mərhələ ilə birgə aşağıdakılardan hansının olması pis proqnoz əlaməti deyil?

A) Boyun metastazı
B) Frey sindromu
C) Ağrı
D) Üz sinirinin iflici
E) Dəri invaziyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

270) Parotis vəzi xəstəliklərinin diaqnostikasında hansı müayinə daha informativdir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Nuklear sintiqrafiya
B) Kompyuter Tomoqrafiyası
C) Rengenografiya
D) Maqnit RezonansTomoqrafiyası
E) Sialogramma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

271) Dil şişləri ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Ən çox rast gəlindiyi yer dilin hərəkətli hissəsinin yan kənarıdır
B) Ən çox rast gələn tipi skvamoz hüceyrəli karsinomadır
C) Daha çox yaşlılarda və kişilərdə rast gəlir
D) Nadir hallarda limfatik metastaz verdiyinə görə hemiglosektomiyanın aparılması kifayətdir
E) Müalicəsində ilk cərrahi metod tətbiq edilir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

272) Aşağıdakılardan hansı ağız boşluğu şişlərinin etiologiyasında mühüm rol oynayır?

A) Paradontoz
B) Ağız boşluğu zədələnmələri
C) Tütün,alkogol,pis gigiyena
D) Plummer-Vilson sindromu.
E) Hepatit C və B Virusu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

273) Ən çox rast gəlinən tüpürcək vəzi şişi hansıdır?

A) Skvamoz hüceyrəli karsinoma
B) Mukoepidermoid karsinoma
C) Xoşxassəli pleomorfik adenoma
D) Bədxassəli pleomorfik adenoma
E) Varthin şişi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

274) Uşaqlarda ən çox rast gəlinən tüpürcək vəzi şişi hansıdır?

A) Xoşxassəli miks şiş
B) Varthin şişi
C) Mukoepidermoid karsinoma

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Liposarkoma
E) Hemangioma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

275) Aşağıdakılardan hansı ağız boşluğu xərçənginin etioloji faktorlarından deyildir?

A) Siqaret
B) Alkoqol
C) ağzın Pis gigiyenası
D) Gingivit
E) Tütün çeynəmə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

276) Tüpürcək vəzi şişləri ən çox hansı nahiyələrdə rast gəlinir ?

A) Gözyaşı vəzi
B) Kiçik tüpürcək vəziləri
C) Sublingual vəz
D) Submandibulyar vəz
E) Parotis vəzi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

277) Parotis vəzisində ən çox rast gəlinən şiş hansıdır?

A) Varthin şişi
B) Skvamoz hüceyrəli karsinoma
C) Pleomorfik adenoma
D) Bazal hüceyrəli karsinoma
E) Monomorfik adenoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

278) Ən çox rast gəlinən dəri xərçəngi hansıdır?

A) Bəd xassəli melanoma
B) Bouven xəstəliyi
C) Keratoakantoma
D) Bazal hüceyrəli karsinoma
E) Skvamoz hüceyrəli karsinoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

279) Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Eritroplagiya rezeksiya olunmalıdır
B) Eritroplagiya ən bəd xassəli prekanserogen törəmələrdəndir
C) Leykoplagiyanın təxminən 10%-nin xərçəngə keçmə riski var
D) Leykoplagiya xroniki zədələnmələr nəticəsində yaranır
E) Ağız aftaları prekanseroz prosesdir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

280) Çənə rekonstruksiyasında aşağıdakı sərbəst fleplərdən hansı istifadə oluna bilər?

A) TRAM
B) Sərbəst fibula
C) İnguinal flep
D) Latissimus dorsi
E) Pektoralis mayor əzələ dəri flepi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

281) Paratiroidektomiyada hansı strukturun zədələməməsinə çalışmaq lazımdır ?

A) n.facialis
B) n.trigeminus
C) a.temporalis superfacialis
D) Çeynəmə əzələsi
E) Stenon kanalı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

282) Parotis vəzinin ən çox rast gəlinən bədxassəli şişi hansıdır?

A) Adenokista
B) Onkositoma
C) Mukoepidermoid
D) Varthin şişi
E) qarışıq şiş

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

283) Dəri xərçəngi üçün əsas risk faktoru hansıdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Travma
B) Ultrabənövşəyi şüalar
C) Yaş
D) Qidalanma
E) Cinsiyyət

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

284) Sialitiazis ən çox hansı vəzidə rast gəlinir?

A) Sublingual
B) Parotis
C) Sublmandibulyar
D) Parotis, Minor vəzlər
E) Minor vəzlər

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

285) Tüpürcək vəzi şişləri üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur?
1. Pleomorfik adenomalar ən çox rast gəlinən şişlərdir
2. Parotis şişləri adətən bədxassəlidir
3. Bədxassəli şişlərin çoxu minor kiçik vəzlərdən başlayır
4. Parotis kütlələrinin təyinində,İAB qızıl standartdır

A) 1,4
B) 2,4
C) 1,2,3
D) 1,3,4
E) 1,3

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

286) Aşağıdakı çənə şişlərindan hansı odontogen epiteldən əmələ gəlir?

A) Radikulyar kista
B) Anevrizmal sümük kistası
C) Reparativ qranuloma
D) Osteoma
E) Ameloblastoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

287) Aşağıdakı tüpürcək vəzilərindən hansında maliqnizasiyaetmə riski ən yuksəkdir?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Parotis və Sublingual
B) Sublingual
C) Minor tupurcək vəziləri
D) Parotis
E) Submandibulyar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

288) Parotisdən inkişaf edən hansı şişdə üz sinirinin elevasiyası həyata keçirilir?

A) Dermatofibrosarkoma
B) Varthin şişi
C) Skavamoz hüceyrəli xərçəng
D) Adenoid kistik xərçəng
E) Mukoepidermoid xərçəng

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

289) Etiologiyasında yanıq olan bədxassəli şiş hansıdır?

A) Mukoepidermoid xərçəng
B) Bazal hüceyrəli xərçəng
C) Dermatofibrosarkoma
D) Bəd xassəli Melanoma
E) Skavamoz hüceyrəli xərçəng

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

290) Hansı bədxassəli dəri şişidir?

A) ksantolazma
B) Melanoma
C) Lipoma
D) Fibroma
E) Hemangioma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

291) Hansı Varthin şişidir?

A) Papilyar limfamatoz kistadenoma
B) Mukoepidermoid xərçəng
C) Bazal hüceyrəli xərçəng
D) Pleomorfik adenoma
E) Bəd xassəli melanoma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

292) Hansı tüpürcək vəzi şişi deyil?

A) adeno kistalı xərçəng
B) Epidermoid xərçəng
C) Mukoepidermoid xərçəng
D) Varthin şişi
E) Pleomorfik adenoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

293) Parotis vəzisi ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) vartın şişi parotis şişlərinə daxildir
B) Parotis bir paydan ibarətdir
C) Üz siniri parotis paylarının arasından keçir
D) Parotis iki paydan ibarətdir
E) Ən çox rast gəlinən şişi qarışıq şişdir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

294) Hansı halda dəri xərçənginin əmələ gəlmə riski yüksək deyildir?

A) Nevus sebaceous
B) Sturge- Veber sindromu
C) Albinizm
D) Bazal hüceyrəli nevus
E) Kseroderma pigmentosum

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

295) Ən çox rast gəlinən intraoral karsinoma hansıdır?

A) Tüpürcək vəzi mənbəli karsinoma
B) Skvamoz hüceyrəli karsinoma
C) Melanoma
D) Sarkoma
E) Bazal hüceyrəli karsinoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

296) Ən çox rast gələn bədxassəli tüpürcək vəzi şişi hansıdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Adenocarsinoma
B) Bəd xassəli qarışıq şiş
C) Adenokistik xərçəng
D) Skvamoz hüceyrəli karsinoma
E) Mukoepidermoid xərçəng

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

297) Ağız ətrafına yayılmaq xüsusiyyətinə malik şişlər hansılardır?

A) Bəd xassəli qarışıq şiş
B) Skvamoz hüceyrəli karsinoma
C) Skvamoz hüceyrəli karsinoma və Bəd xassəli qarışıq şiş
D) Hamısı
E) Adenokistalı xərçəng

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

298) Əsasən üz,sinə,barmaqlarda yerləşən,sürətlə inkişaf edən ,müəyyən müddətdən sonra böyüməsi dayanan papulayabənzər törəmələr ilə xarakterizə olunan tez qanayan törəmə hansıdır?

A) Qlomus şişi
B) Piogenik granuloma
C) Keratoakantoma
D) Neyrofibroma
E) Teleangioektaziya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

299) Parotis vəzinin xoşxassəli qarışıq şişlərinin müalicəsi necə aparılır ?

A) İlkin radiotrapiya
B) Üz siniri ilə birlikdə radikal ekssiziyası
C) üz sinirini saxlamaq şərti ilə şişin ətraf normal toxuma da daxil olmaqla çıxarılması
D) Şişin lokal ekssiziyasından sonra radioterapiya
E) Şişin ətraf normal toxuma ilə birgə çıxarılması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

300) Kəsildiklərində selikli kimi görunən mukoid material saxlayan iltihabi törəmələrlə səhv salınan tüpürcək vəzi şişi hansıdır?

A) Hemangioma

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qarışıq t şiş
C) Varthin şişi
D) Xoşxassəli limfoepitelial şiş
E) Adenoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

301) Aşağıdakı ağız boşluğu törəmələrdən hansında malignizasiya riski ən yüksəkdir?

A) Adenoma
B) Keratoz
C) Eritroplagiya
D) Hemangioma
E) Leykoplagiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

302) Bədxassəli dəri şişlərinə hansı aid deyil?

A) Skvamoz hüceyrəli xərçəng
B) Kaposi sarkoması
C) Keratoakantoma
D) Bazal hüceyrəli karsinoma
E) Vaskulyar orijinli tumor

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

303) ağız boşluğu xərçənglərinin etiologiyasında aşağıdakılardan hansının rolu yoxdur?

A) Alkoqol
B) Tütün
C) Ağız gigiyenasına riayət etməmək
D) İsti qidalar
E) Plummer-Vilson sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

304) Pleomorf adenomanın mualicəsi necə olmalıdır?

A) Ximoterapiya
B) Cərrahi
C) Radioterapiya və Ximoterapiya
D) Müalicəyə ehtiyac yoxdur

www.snskaz ödənişsiz istifadə üçün

E) Radioterapiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

305) Aşağıdakı dəri şişlərindən hansı maliqnizasiya edən şişdir ?

A) Ziyil
B) Keratoakantoma
C) Keloid
D) Bazal hüceyrəli xərcəng
E) Dermal nodulyar fibroz

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

306) Aşağıdakılardan hansı ağız boşluğu xərçənginin etiologiyasına aid deyil?

A) Alkoqol istifadəsi
B) Ağız gigiyenasına riayət etməmək
C) Pis qidalanma
D) Vit B12 çatışmazlığı
E) Tütün istifadəsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

307) Parotis şişləri haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Əksəriyyəti xoşxassəli olur
B) Adenokistik törəmədə nevral invaziyaya diqqət yetirmək lazımdır
C) Tüpürcək vəzi şişləri ən çox parotisə nüfuz edir
D) İnsizion biopsiyanın mühüm rolu vardır
E) Pleomorfik adenoma ən çox rast gəlinən xoşxassəli şişdir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

308) Parotis şişlərində müayinəsində ən uyğun radioloji metod hansıdır?

A) Rentgenoqrafiya
B) Maqnit Rezonans Tomoqrafiya
C) Kompyuter Tomoqrafiya
D) Sialografiya
E) Nuklear görüntüləmə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

309) Aşağıdakı sindromlardan hansında əl ilə tutma qabiliyyəti olmur?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Crouzon sindromu
B) Pfeiffer sindromu
C) Apert sindromu
D) Nagor sindromu
E) Saethre-Chotzen sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

310) Ağdərili irqə mənsub insanlarda ən çox rast gəlinən bədxassəli dəri şişi hansıdır?

A) Ağciyər kiçik hüceyrəli xərçəng
B) Skvamoz hüceyrəli xərçəng
C) Epidermoid xərçəng
D) Bəd xassəli melanoma
E) Bazal hüceyrəli xərçəng

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

311) Aşağıdakılarda hansı dəri törəməsi üçün bədxassəli transformasiya əlaməti deyil?

A) Böyümə
B) Qaşınma
C) Rəng dəyişikliyi
D) Qanama
E) Kiçilmə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

312) Angle təsnifatı harda tətbiq edilir ?

A) Arxa dişlərin bukkal lingual munasibətlərində
B) Skelet çənə deformasiyasına bağlı malokluziyalarda
C) üz sümüklərinin sınıqlarında
D) Ön arxa dental okkluziyalarında
E) Fassial tarazlıq vəya tarazsızlıqda

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

313) Mandibulyar retrognatiya diagnozuna ən uygun çənə hansıdır?

A) Hipoplastik çənə ,əngi önə çıxan çənə
B) Hipoplastik cismli ,geniş çıxıntılara malik və normal görünüşlü çənə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Normal ölçülü ,arxada yerləşən çənə
D) Normal ölçülü,əngi önə çıxan çənə
E) Hipoplastik cisimli arxada yerləşən çənə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

314) Orbita sınıqlarında hansı anatomik strukturlar zədələnir ?

A) Əng
B) Hamısı
C) Almacıq
D) Alın sümüyü
E) Burun və xəlbir sümüyü

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

315) Aşağıdakılardan hansı əng sınıqlarının gecikmiş ağırlaşmasıdır?

A) Enoftalmiya
B) Malunion
C) Nonunion
D) Hamısı
E) İnfraorbital sinir hipestesiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

316) Ortognatik cərrahiyyə ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Sümük problemləri çox erkən yaşlarda aradan qaldırılmalıdır
B) Əng osteotomiyası ən çox Lefort I üsulu ilə aparılır
C) Xəstələr stomatoloqlarla birgə izlənilməlidir
D) Xəstələrin diaqnozunda mütləq sefalometrik analiz aparılmalıdır
E) Çənə əməliyyatlarında ən çox şaxənin sagital split osseotomiyası aparılır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

317) Ortognatik cərrahiyyədə sefalometrik ölçmələr dodağın hansı vəziyyətində aparılır?

A) İstirahət
B) Maksimum bağlı
C) Yarım açıq vəziyyətdə
D) Dodaqlarası məsafə 2-3.5mm
E) Maksimum gülmə

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

318) Normal ağız açıqlığı nə qədərdir?

A) 7 cm
B) 4-5 cm
C) 10 cm
D) 2 cm
E) 3 cm

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

319) Prognatiyada ən çox istifadə olunan metod hansıdır?

A) Vertikal şaxə osteotomiyası
B) "İnverted L" (L şəkilli) osteotomiya
C) Sagital split şaxə(ramus) osteotomiyası
D) Lefort II osteotomiyası
E) Horizontal şaxə osteotomiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

320) I sinif okkluziya nədir?

A) Maksilyar retrognatiya
B) Maksilyar prognatiya
C) Mandibulyar retrognatiya
D) Mandibulyar prognatiya
E) Normokluziya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

321) üzün Mimiki əzələlərinə hansı deyil?

A) Temporalis
B) Orbicularis oculi
C) Zygomaticus major
D) Platizma
E) Risoris gülümsəmə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

322) Sefalometrik analizdə istifadə olunan S hərfi hansı nahiyyəni göstərir?

A) Supraspinal

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Subspinal
C) Sella turcica
D) Sfenoidal cib
E) Submental

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

323) Hansı deformasiyada sagital split ramus osteotomiyası icra edilir?

A) Hemifassiyal atrofiya
B) Molyar hipoplaziya
C) Molyar hipoplaziya
D) Prognatiya
E) Çəpər əyriliyi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

324) Orbitanın quruluşunda iştirak etməyən sümük hansıdır?

A) Xəlbir
B) Almacıq
C) gicgah
D) Əng
E) Əsas

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

325) Aşağıdakılardan nansı class-3 monokluziyanı göstərir?

A) mikrognatiya
B) Açiq dişləm deformasiyası
C) Retrognatiya
D) Molyar hipoplaziya
E) Prognatiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

326) Lefort III sınığında hansı sümüyün sınması şərt deyil?

A) Zygomatico-frontal
B) Zygomatico temporal
C) Fronto nazal birləşmə
D) Naso- maxillar
E) Zygomatico-maxillar

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

327) Mandibulyar prognatiya nədir ?

A) Çənə əngə görə öndədir
B) Çənə əngə görə geridədir
C) Çənə əngə görə medialdadır
D) Çənə əngə görə normal vəziyyətdədir
E) Çənə əngə görə lateraldır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

328) Genioplastika nədir?

A) Çəpər əyriliyinin aradan qaldırılması
B) Orbita deformasiyalarının aradan qaldırılması
C) Almacıq deformasiyalarının aradan qaldırılması
D) Hipertelorizmin aradan qaldırılması
E) Çənə deformasiyasının aradan qaldırılması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

329) Angle təsnifatına görə class 3 okkluziyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Mikrognatiya və Laterognatiya
B) Prognatiya
C) Mikrognatiya
D) Retrognatiya
E) Laterognatiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

330) Prognatiyalı xəstələrdə ən çox istifadə olunan osteotomiya metodu hansıdır?

A) Lefort III
B) Horizontal mandibula simfiz osteotomiyası
C) Lefort II
D) Sagital split ramus osteotomiyası
E) Lefort I

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

331) Ortognatik cərrahiyyədə ən çox hansı intubasiya növü istifadə edilir ?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) İntroral orta xətt
B) Transnazal
C) İntraoral medial
D) İntraoral lateral
E) Traxeostomiya yolu ilə

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

332) Normokluziyanı əldə etmək üçün archbar və şina telləri ilə fiksasiyada saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) 6 ay
B) 3 ay
C) 6 həftə
D) 3 həftə
E) 1 il

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

333) Hansı ortognatik cərrahiyyədə ən çox istifadə olunan cərrahi texnikadır?

A) Mentum osteotomiyası
B) Korpus mandibula osteotomiya
C) Subkondulyar osteotomiya
D) Lateral ramus osteotomiya
E) Sagital split ramus osteotomiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

334) Ortognatik cərrahi korreksiya kişilərdə hansı yaşdan sonra aparılmalıdır?

A) 18
B) 5
C) 10
D) 1`
E) 12

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

335) Ortognatik cərrahiyyədə hansı əməliyyatlar aparılır?

A) Sagital split ramus osteotomiya
B) Hamısı
C) Le Fort I üsulu ilə osteotomiya
D) Vertial mandibula ramus osteotomiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Genioplastika

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

336) Ortognatik cərrahiyyədə hansı əməliyyat aparılmır?

A) sərt damağın Millard üsulu ilə bərpası
B) Genioplastika
C) Vertial mandibular ramus osteotomiya
D) Lefort I üsulu ilə osteotomiya
E) Sagital split ramus osteotomiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

337) Aşağıdakılardan hansıClass 2 malokluziyasına aiddir ?

A) Laterognatiya
B) Maksilyar retrognatiya
C) Maksilyar retroqnatiya və mandibulyar prognatiya
D) Mandbulyar prognatiya
E) Mandibulyar retrognatiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

338) Aşağıdakı sümuklərin hansı orbita təşkilində iştirak etmir?

A) Gicgah
B) Alın
C) Almacıq
D) Əsas
E) Əng

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

339) Mikrocərrahiyyədə hansı tikiş sapı daha incədir?

A) 9/0
B) 6/0
C) 7/0
D) 10/0
E) 8/0

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

340) Aşağı ətrafın travmasından sonra hansı faktor ətrafın saxlanılmasına zəmin yaradır ?

A) Ağır açıq baldır zədələnməsi
B) Devaskulyarizsiya olunmuş ayaq
C) Segmental tibial sinirin itgisi
D) Ayağın dorzal nahiyyəsində soyulma
E) Plantar səthin soyulması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

341) Açıq sınıqlardan sonra daimi infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Avaskulyar və infeksion çapıq
B) Nekrotik və infeksiyalaşmış sümük
C) Hamısı
D) Sekvestirlər
E) Yumşaq toxumaların çatışmazlığı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

342) Mikrocərrahiyyə ilə bağlı hansı səhvdir?

A) Mikrocərrahi əməliyyat aparmaq üçün xəstənin ümumi vəziyyəti kafi olmalıdır.
B) Venoz durğunluq varsa zəli qoyulmalıdır
C) 8/0,9/0,10/0 neylon iynəli saplar istifadə olunmalıdır
D) Damar anastamozlarından sonra işemiyanı azaltmaq üçün soyuq və vazokonstruktorlar istifadə olunmalıdır
E) Mütləq lupa və cərrahi mikroskoplar istifadə olunmalıdır

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

343) Aşağıdakılardan hansı sərbəst flepin köçürülməsinə göstərişdir?

A) Sümük vəziyyətini dəyişdirən açıq yara
B) Skalpda sebaseoz kista
C) Paranixiya
D) Burunda nevus
E) Əldə soyulma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

344) Aşağı ətraf yaralanmalarında hansı sərbəst flepin köçürülməsinə göstəriş deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Diabetik xora
B) Şiş rezeksiyasında sonra geniş deffekt
C) crush zədələnməsi zamanı açıq sınıq
D) Protez yerləşdirilən oynaq sahəsinin bağlanması
E) Alov yanığı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

345) Diabetik ayağın müalicəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil ?

A) Yaranın cərrahi işlənməsi
B) Hiperbarik oksigen müalicəsi
C) Flep köçürmə
D) Biopsiya
E) Güdül sarğısı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

346) Hansı mikrocərrahiyyə əməliyyatının nəticəsinə təsir etmir?

A) Cərrahi texnika
B) Xəstənin yaşı
C) Müdaxilə aparılan sahənin radioterapiya alması
D) Şəkərli diabetin olması
E) Xəstənin cinsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

347) Baldırın sümük yerdəyişməsi ilə müşayət edilən zədələnmələrinin bərpasında, aşağıdakılardan hansını köçürmək olmaz ?

A) Sərbəst flep
B) Tam qalınlıqlı dəri qrefti
C) Açıcı qısa əzələ flepi
D) Lateral supramalleolyar flep
E) Dorsalis pedis dəri fassiya flepi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

348) Funksional toxuma transferi üçün istifadə edilən əzələlər hansılardır ?

A) M.Gracilis
B) Hamısı
C) M.Serratus anterior

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) M. Pectoralis major
E) M.Latissimus dorsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

349) Hansı əzələ Ayaq baş barmağının falanqalar arası oynaqda ekstensiyasını təmin edir ?

A) Extensor dorsalis superficialis
B) Extensor pollicus longus
C) Ekstensor dorsalis profundus
D) Extensor digitorum longus
E) Extensor hallucis longus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

350) Aşağıdakılardan hansı aşağı ətraf xoralarının yaranmasına səbəb olmur?

A) İnfeksiya
B) Venoz durğunluq
C) Revmatoid artrit
D) Yanıq
E) Şəkərli Diabet

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

351) Ayağın ön qrup əzələlərinə hansı əzələ aid deyil?

A) M. Soleus
B) M.Extensor hallucis longus
C) M.Peroneus longus
D) M.Extensor digitorum communis
E) M.Tibialis anterior

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

352) Aşağıdakı fleplərdən hansı ayaq aşağı 1/3 rekonstruksiyasında istifadə oluna bilməz?

A) Dorsalis pedis dəri fassiya flepi
B) Nəli əzələ flepi
C) Arxa qamış arteriya ayaqcıqlı ada flepi
D) Cross-leg flep
E) Lateral supramalleolyar flep

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

353) Hansı halda mikrocərrahiyyə əməliyyatına ehtiyac yoxdur?

A) Penis amputasiyası
B) Vətər kəsilmələri
C) Barmaq amputasiyası
D) Epidermal sıyrıq
E) Skalp soyulması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

354) aşağı ətraf rekonstruksiyasında hansı prosedur icra edilmir ?

A) Dəri qrefti
B) Yaraya qulluq və müşahidə
C) İmmuno terapiya
D) Yerli vəya uzaq flep
E) Antibiotik terapiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

355) Hansı flep aşağı ətrafda istifadə olunmur?

A) Döşkörpücükməməyəbənzər əzələ flepi
B) Tibialis anterior əzələ flepi
C) lateral kalkaneal fleb
D) Latissimus dorsi flepi
E) Radial ön qol flepi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

356) Ayağın ön qrup əzələlərinə hansı aid deyil ?

A) Extensor hallucis longus
B) Peroneus tertens
C) Tibialis anterior
D) Peroneus longus
E) Extensor digitorum longus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

357) Aşağı ətraf rekonstruksiyasında hansı flep istifadə olunarsa funksional qüsür yaranar?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) M.Tibialis anterior
B) Lateral nəli əzələ
C) M.Soleus
D) Medial nəli əzələ
E) Latissimus dorsi flepi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

358) Mikrocərrahi sinir bərpası texnikasına hansı aid deyil?

A) Grup fassikulyar bərpa
B) Epinevral bərpa
C) Epinevral və qrup fassikulyar bərpa
D) İntraoral bərpa
E) Fassikulyar bərpa

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

359) Hansı halda Mikrocərrahiyyə əməliyyatına ehtiyac duyulmur ?

A) Orqan transplantasiyası
B) Revaskulyarizasiya
C) Sərbəst flep ilə toxuma köçürmə
D) Replantasiya
E) Aorta cərrahiyyəsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

360) Şəkərli Diabet daha çox hansı arteriyanı zədələyir?

A) Ayaq arteriyaları
B) Bud arteriyası
C) Radial arteriya
D) Dizaltı arteriya
E) Ön və dal qamış arteriyaları

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

361) Hansı halda Mikrocərrahi toxuma bərpasına göstəriş var?

A) Hamısı
B) Onkoloji əməliyyat sonrası rekonstruksiya
C) Anadangəlmə deffektlərin bağlanması
D) Xronik yaraların rekonstruksiyası
E) Travma sonrakı rekonstruksiyası

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

362) Hansı faktor aşağı ətraf replantasiyasında göstəriş deyil?

A) Bir səviyyəli amputasiya
B) Müddətin altı saatdan qısa olması
C) Yaranın steril olması
D) Xəstənin az yaşlı olması
E) Xəstənin yaşının 65dən yuxarı olması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

363) Hansı bədxassəli melanomanın əmələ gəlmə səbəbi deyil?

A) Displastic nevus
B) Ailədə melanomanın olması
C) Junctional nevus
D) Müəyyən fasilələrlə günəş altında qalma
E) dəri rənginin Açıq olması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

364) Hansı faktor melanoma riskini artırmır?

A) sarışın saç
B) dəri rənginin Açıq olması
C) Nəhəng tüklü nevus
D) Anamnezində melanomanın olması
E) Compound nevus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

365) Clark təsnifatına görə melanoma hansı mərhələdə dərinin retikulyar qatına invaziya edir?

A) 4
B) 5
C) 1
D) 2
E) 3

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

366) Nevuslarda görünən dəyişiklərdən hansı maliqnizasiya şübhəsi yaradır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Davamlı böyümə
B) Hamısı
C) Asimmetriya və sərhədlərin qeyri müəyyənliyi
D) Rəng heterogenliyi
E) Elevasiya və 6 mmdən böyük ölçü

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

367) Bəd xassəli melanoma üçün hansı fikir səhvdir?

A) Səthi melanoma radial şəkildə yayılır
B) Yaşlı xəstələrdə baş-boyun nahiyyəsində ən çox lentiqo tipi rast gəlinir
C) Nodulyar melanoma radial şəkildə yayılır
D) Başlanğıcını Melanositlərdən götürür
E) Displastik nevus melanomaya çevrilir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

368) Akral lentiqioz tipli melanoma ən çox harada lokalizasiya olunur?

A) Qaraciyər
B) Boyun
C) Scalp
D) Ətraflar
E) Dodaqlar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

369) Hansı halda Bədxassəli melanoma Clarc təsnifatına görə düzgün göstərilib ?

A) Clarc 4- retikulyar dermis dərialtı toxuma sərhəddinə invaziya
B) Clarc 5- dərialtına invaziya
C) Clarc 3- retikulyar dermisə invaziya
D) Clarc 2- papilyar retikulyar dermis sərhəddinə invaziya
E) Clarc 1- papilyar dermis invaziyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

370) Hansı amil Bədxassəli melanoma üçün risk faktoru deyil?

A) İmmunosupressiya
B) Günəş şüaları
C) Xosxassəli melanositar nevuslar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Qadın cinsi
E) Genetik faktorlar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

371) Ayaq dabanı və ovucda rast gəlinən melanoma tipi hansıdır?

A) Lentigo malign melanoma
B) Səthi yayılan melanoma
C) Akral lentigiaz melanoma
D) Amelanotik melanoma
E) Nodulyar melanoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

372) Bəd xasssəli melanoma əmələ gətirən törəmə hansıdır?

A) Melanoma insitu
B) Hamısı
C) Anadangəlmə melanositar nevus
D) Displastik nevus
E) Çox rast gəlinən akkiz melanositar nevus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

373) Bədxassəli melanomada ən vacib prognostik faktor hansıdır?

A) Xoralaşma
B) İlkin şişin qalınlığı
C) Şişin lokalizasiyası
D) Yaş
E) Cinsiyyət

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

374) Ən çox rast gəlinən bədxassəli melanoma tipi hansıdır?

A) Səthi yayılan melanoma
B) Amelanotik melanoma
C) Lentigo melanoma
D) Nodulyar melanoma
E) Akral lentigioz melanoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

375) Biopsiya nəticəsində Qulaq nahiyyəsində melanoma diaqnozu qoyulan 40 yaşlı xəstədə hansı halda radikal boyun disseksiyası aparılmır?

A) Səthi Bəd xassəli melanoma histoloji tipində olması
B) Breslow təsnifatına görə Törəmənin 1.5 mmdən dərin olması
C) Melanomanın vertikal böyüməsi zamanı
D) Clark təsnifatına görə Törəmənin 4-cü mərhələdə olması
E) Boyunda limfa düyünlərinin palpasiya edilməməsi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

376) Aşağıdakı t Bəd xassəli melanoma iplərindən hansı erkən metastaz verir?

A) Nodulyar
B) Lentigioz
C) Səthi
D) Lentigo
E) Amelanotik

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

377) Aşağıdakılardan Hansı bədxassəli şiş deyil?

A) Bazal hüceyrəli xərçəng
B) Mukoepidermoid xərçəng
C) Lentigo maligna
D) adenokistalı xərçəng
E) Skvamoz hüceyrəli xərçəng

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

378) Kürək və ayaqda ən çox rast gəlinən melanoma növü hansıdır ?

A) Akrolentigioz melanomalar
B) Amelanotik melanoma
C) Səthi yayılan
D) Nodulyar melanomalar
E) Lentigo maligna

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

379) Ən xoş prognozlu melanoma hansıdır?

A) Mukozal melanoma
B) Akrolentigioz melanoma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Səthi yayılan melanoma
D) Nodulyar melanoma
E) Lentigo maligna

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

380) Hansı Bəd xassəli melanoma tipi deyil?

A) Akral lentigioz
B) Verrikoz
C) Səthi yayılan
D) Lentigo
E) Nodulyar

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

381) Aşağıdakılardan hansı Bəd xassəli melanoma ilə differensasiya edilmir ?

A) Bazal hüceyrəli xərçəng
B) İntrodermal hematoma
C) Hemangiaoma
D) Marjolin xorası
E) Seborreya keratozu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

382) Bəd xassəli melanoma tipi hansıdır?

A) Nodulyar
B) Akral lentigioz
C) Hamısı
D) Lentigo
E) Səthi yayılan

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

383) Hansı faktor Bəd xassəli melanoma ehtimalını artırmır?

A) Çilli olmaq
B) Boyun qısalığı
C) Genetik faktor
D) Günəş şüası
E) Açıq saç rəngi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

384) Qara dərili insanlarda ən çox rast gələn Bəd xassəli melanoma hansıdır?

A) Lentigo
B) Acral lentigioaz
C) Nodulyar
D) Amelonotik
E) Səthi yayılan

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

385) Hansı orta sinirin hərəki şaxəsidir?

A) N. Interossea Superior
B) N.cutaneus palmaris
C) N.cutaneus brachii
D) N. interossea Posterior
E) N.cutaneus antibrachii

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

386) Hansı mil sinirinin hərəki şaxəsidir?

A) N. Interossea Superior
B) N. interossea Posterior
C) N.cutaneus antibrachii
D) N.cutaneus palmaris
E) N.cutaneus brachii

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

387) Hansı dirsək siniri tərəfindən innervasiya edilmir?

A) M.Flexor Digitorum Profundus IV, V
B) m.flexorum carpi ulnaris
C) m.abductor pollicis longus
D) m.palmaris interosseus
E) m.dorsalis interosseus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

388) Karpal kanaldan hansı keçmir?

A) m.flexor.digitorum prof
B) m.flexor. pollicis longus

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) n.medianus
D) m.flexor. pollicis brevis
E) m.flexor.digitorum superficialis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

389) Prefix braxial plexus variasiyası hansı spinal ön köklərdən əmələ gəlir?

A) C4-8
B) C7-8,Th1-3
C) C6-8,Th1-2
D) C5-8,Th1
E) C3-7

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

390) Postfix braxial plexus variasiyası hansı spinal ön köklərdən əmələ gəlir?

A) C4-8
B) C6-8,Th1-2
C) C3-7
D) C7-8,Th1-3
E) C5-8,Th1

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

391) Ulnar sinir bilək kanalında hansı əzələnin üzərində yerləşir?

A) Flexor.carpi ulnaris
B) Flexor.digitorum profundus
C) Flexor.carpi ulnaris
D) Flexor.digitorum superficialis
E) Flexor.pollicis longus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

392) Guyon kanalından aşağıdakı anatomik strukturlardan hansı keçir?

A) n.radialis,n.ulnaris
B) n.medianus,a.radialis
C) a.ulnaris,n.radialis
D) a.ulnaris,n.ulnaris
E) a.radialis. n.radialis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

393) bilək strukturunun əsasını hansı sümük təşkil edir?

A) Os Triquetrum
B) Os hamatum
C) Os scafoideum
D) Os capitatum
E) Os lunatum

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

394) Ən çox sınan bilək sümüyü hansıdır?

A) Aypara sümük
B) Qarmaqlı sümük
C) Başlı sümük
D) Üçvəchli sümük
E) Qayığabənzər sümük

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Колонтай Ю.Ю. Открытые повреждения кисти. Киев, 1983

395) Bilək hansı sümüklər vasitəsilə mil sümüyü ilə oynaq əmələ gətirir?

A) Os capitetum/hamatum
B) Os hamatum/triquetrum)
C) Os scafoideum/trapesium
D) Os scafoideum/lunatum
E) Os trapezium/trapizoideum

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

396) Hansı vətər haşiyəvi şəkli ilə biləyin mərkəzinin açılmasına səbəb olur?

A) Extension carpi radialis longus
B) Extension carpi radialis breves
C) Extension carpi ulnaris
D) Palmaris longus
E) Extension pollicis longus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

397) Anatomik külqabı nahiyyəsinin hissi innervasiyası hansı sinir təmin edir?

A) n.radialis

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) n.cutaneus.brachi lateralis
C) n.cutaneus antebrachi lateralis
D) n.medianus
E) n.ulnaris

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

398) Biləyin 1-ci açıcı yatağından hansı əzələlərin vətərləri keçir?

A) Extensor Digiti Minimi
B) Abductor Pollicis Longus,Extensor Pollicis Brevis
C) Extensor Pollicis Longus
D) Extensor Carpi Radialis Brevis,Extensor Carpi Radialis Longus
E) Extensor Digiti Carpi ulnaris

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

399) Tenar nahiyyəsinə hansı əzələlər aiddir ?

A) Hamısı
B) m.adductor pollicis
C) m.opponens pollicis
D) m.adbuctor pollicisbrevis
E) m.flexor policis brevis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

400) Hipotenar nahiyyəsinə h ansı əzələlər aiddir ?

A) m.abductordigiti minimi
B) Hamısı
C) m.opponens digiti minimi
D) m.palmaris brevis
E) m.flexor digiti minimi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

401) Sindaktiliyaya ən çox hansı barmaqlar arasındarast gəlinir ?

A) II və III
B) I,II və III
C) IV və V
D) I və II
E) III və IV

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

402) Hansı polidaktiliya növu az rast gəlinir?

A) Mərkəzi polidaktiliya
B) Postaksiyal polidaktiliya
C) Tam polidaktiliya
D) Preaksiyal polidaktiliya
E) Kompleks polidaktiliya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

403) Hansı sindrom zamanı həm kranial həm də əl anomaliyaları müşahidə edilir?

A) Poland sindromu
B) Crouzon sindromu
C) Fallat sindromu
D) Apert sindromu
E) Marfan sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

404) Mərkəzi piylənmə,mikrogenitaliya,əqli inkisafdan qalma,mərkəzi polidaktiliya ilə təzahür sindrom hansıdır?

A) Lavrence-Moon-Biedle sindromu
B) Crouzon sindromu
C) Phegler sindromu
D) Poland sindromu
E) Apert sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

405) Menopauza keçirən evdar qadın əlində keyləşmə və ağrı şikayətləri ilə həkimə müraciət etmişdir. Ilkin diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər ?

A) Revmatoid artrit
B) Gut artriti
C) De Gerven tenosinoviti
D) Kubital tunel sindromu
E) Karpal tunel sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

406) Hansı zonanın bükücü vətərinin zədələnməsi müalicəyə pis tabe olur ?

A) Zona 3
B) Zona 5
C) Zona 1
D) Zona 2
E) Zona 4

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

407) Xalq arasında " Şeytan dırnağı" infeksiyası kimi adlandırılan barmaq infeksiyası hansıdır?

A) Felon
B) Tətik barmaq
C) Eponixiya
D) Dolama
E) Paronixiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

408) Barmaq ucuna top dəyməsi nəticəsində meydana çıxan,Distal falanqalar arası oynağın açılmaması ilə xarakterizə edilən patologiya hansıdır?

A) Çəkic barmaq
B) Tətik barmaq
C) Bennet sınığı
D) Felon
E) Açıcı tenosinovit

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

409) Horner sindromu hansı xəstəliklə birlikdə rast gəlinə bilər?

A) Serebral iflic
B) Obstetrik iflic
C) Qurğuşun zəhərlənməsi
D) Botulizm
E) Amniotik bağ sindromu

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

410) hansı anatomik strukturlar Volkman işemik kontrakturasına daha çox məruz qalır?

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) M. Extensor Digiti Carpi,n.radialis
B) mm.lumbriciales,n.ulnaris
C) M.Extensor Digiti Carpi ulnaris, n.ulnaris
D) M.Flexor Carpi Ulnaris, n.ulnaris
E) M.Flexor Pollicis Longus,M.Flexor Digitotum Profundus ,n.medianus

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

411) Travmadan sonra ,sinirin distal hissəsində baş verən dəyişikliklər necə adlanır?

A) Vallerian degenerasiyası
B) Apoptoz
C) Nevroma
D) Neyrotropizm
E) Spontan regenerasiya

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

412) Siniri əhatə edən birləşdirici toxumanı daxildən xaricə doğru sayın.

A) Endo,peri,epinevrum
B) Endo,epi,perinevrum
C) peri, epi, endonevrum
D) Peri,endo,epinevrum
E) Epi,endo,perinevrum

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

413) Qurban kəsərkən əlini kəsən qəssabda 1-2 həftə sonra qara rəngli pustulalar meydana çıxmışdır,ən çoxhansı törədicidən şübhələnmək olar?

A) Shigella
B) Stafilokok
C) Streptokok
D) Qram (-) spor
E) Bacillius antracis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

414) Qurban kəsərkən əlini kəsən qəssabda 1-2 həftə sonra qara rəngli pustulalar meydana çıxmışdır,bu halda hansı preparatlarla antibiotikoterapiya məsləhətdir?

A) Vankomisin

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Penisilin
C) 3-cü nəsil sefalosporinlər
D) Aminoqlikozid
E) Tetrasiklin

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

415) Əldə ən çox rast gəlinən bədxassəli şiş hansıdır?

A) Metastatik şişlər
B) Nəhəng hüceyrəli vətər şişi
C) Ganglion
D) Xondrosarkoma
E) Osteosarkoma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

416) DE Quearin xəstəliyində hansı cərrahi metod istifadə olunur?

A) Radial sinirin transpozisiyası
B) Karpal kanalın genişləndirilməsi
C) 1-ci açıcı vətər yatağının sərbəstləşdirilməsi
D) A 1 çarx sərbəstləşdirilməsi
E) Ulnar sinirin arteriya transpozisiyası

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

417) Anadangəlmə baş barmaq falanqaları olmayan xəstədə aşağıdakılardan hansı müalicə növü deyil?

A) Polisizasiya
B) Kök hüceyrə nəqli
C) Ayaqdan ələ barmaq köçürmə
D) Metakarpin uzadılması
E) Protez

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

418) m.pronator teres-in içərisində hansı sinir sıxıla bilər?

A) n. Interossea Posterior
B) n.radialis
C) n.ulnaris
D) n.cutaneus antibrachii
E) n.medianus

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

419) Boksçu sınığı ən çox hansı sümükdə rast gəlinir ?

A) 3-cü əldarağı
B) qayığa bənzər
C) 4-cü əldarağı
D) Ayabənzər
E) 2-ci əldarağı

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

420) Əldə ən çox rast gəlinən sümük şişi hansıdır?

A) Enxondroma
B) Osteoid osteoma
C) Osteoxondroma
D) perixondroma
E) Miositis ossificans

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

421) Əlin ən çox rast gəlinən yumşaq toxuma şişi hansıdır?

A) Xondroma
B) Lipoma
C) Ganglia
D) Mioma
E) Fibroma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

422) II-V barmaqları adduksiya vəziyyətinə gətirən əzələ hansıdır?

A) m.palmaris interosseus
B) m.adductor pollicis
C) m.dorsalis interosseus
D) mm.lumbricales
E) m.adductor pollicis brevis

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

423) Hansı mobilizasiyasına görə fleb növü deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) İnterpolasion flep
B) Rotasion flep
C) Transpozision flep
D) Aksial flep
E) İrəlilətmə flepi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

424) 43 yaşlı qadının sol qolunda pleomorfik liposarkoma aşkar edilib. Bükücü yataq cərrahiyyəsi ilə geniş rezeksiyadan sonra xəstənin qolunun ön-iç səthində təxminən 21x14 sm ölçüdə toxuma deffekti yaranıb. bükücü restorasiyanı nəzərə alaraq xəstəyə hansı flebi köçürmək məqsədə uyğundur ?

A) Funksional ayaqcıqlı m.brachioradialis əzələ-dəri transferi
B) Funksional ayaqcıqlı m.gracilis əzələ-dəri transferi
C) Funksional ayaqcıqlı m.latissimus dorsi əzələ-dəri transferi
D) Funksional sərbəst m.gracilis əzələ-dəri transferi
E) Funksional ayaqcıqlı m.trapezius əzələ-dəri transferi

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

425) Süd vəzi protezlərinin ağırlaşmaları ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Protezlə əlaqədar laktasiya pozula bilər
B) Protez yerini dəyişərsə formada dəyişiklik ola bilər.
C) İnfeksiyanın əmələ gəlməsinə şərait yarada bilər
D) Protezin ətrafında yad cism reaksiyası ilə əlaqədar kapsul kontrakturası əmələ gələ bilər
E) protez parçalanması ola bilər

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

426) Dodaq xərçəngi ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Ən çox alt dodaqda müşahidə olunur
B) Kişilərdə daha çox müşahidə olunur
C) Etiologiyasında siqaret, alkaqol və Ultrabənöşvəyi şüalar var
D) Dodaq xərçəngləri ağız boşluğu xərçənglərinin içində ən sürətli metastaz verən şişdir.
E) Üst dodaqda və komissuralarda proqnoz daha pisdir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

427) Dodaq xərçənginin diaqnozunda aşağıdakılardan hansının əhəmiyyəti yoxdur ?

A) sarkoidoz
B) leykoplagiya
C) herpes
D) keratoakantoma
E) piogenik qranuloma

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

428) İdeal süd vəzisi kiçiltmə əməliyyatlarında səhf olanı işarələyin ?

A) Uzun müddət süd vəzisinin formasının saxlanması
B) Az çapıq
C) Estetik baxımdan qəbul edilən forma
D) Hissiyyatın saxlanılması
E) Laktasiyanın saxlanılması

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

429) Aşağıdakılardan hansı süd vəzisi rekonstruksiyasına aid deyil?

A) Qastrkrenium
B) Rubens flebi (periiliac yağ toxuması)
C) Latissimus dorsi fleb
D) Transvers rectus abdominis flebi
E) Qluteal fleb

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

430) Dodaq xərçəngi üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Dodağın yarısını tutan şişdə " Wedge " rezeksiyası tətbiq olunur
B) Dodaq xərçənginin patogenezində ən çox skvamoz hüceyrəli xərçəng yer alır
C) Ən çox alt dodaqda rast gəlinir
D) Siqaret, alkoqol, ağız gigiyenasın pis olması təkan verici səbəblərdir
E) Xəstələr xora əmələ gəlməmiş müraciət edir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

431) Dodağın ən çox hansı hissəsinin götürülməsi zamanı birincili bərpa şansı mümkündür?

A) 2/3 hissəsini

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 1/3 hissəsini
C) ½ hissəsini
D) ¾ hissəsini
E) hamısını

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

432) Dodaq xərçəngi ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Şiş çıxardıqdan sonra Karapandzic a metodu ilə bərpa edilir
B) Siqaret istifadəsi residiv riskini artırır
C) ən çox üst dodaqda müşahidə olunur
D) Ultrabənövşəyi şüalar təkan verici faktordur
E) Kişilərdə daha çox müşahidə edilir

Ədəbiyyat: Grabb and Smith's - Plastic Surgery, 2010

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün