Laborant

Bölmə 1. Kliniki laborator müayinə üsulları.

1) Laborant nəyi bacarmalıdır?

A) Sadalananların hamısını
B) Qan yaxmasını hazırlamağı
C) Sidiyin mikroskopik müayinəsi üçün çöküntünü hazırlamağı
D) Biomaterialların fiziki-kimyəvi müayinəsini aparmağı
E) Reaktivləri hazırlamağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 4 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 9-10 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 8

2) Laboratoriyada müayinə materialını digərləri ilə qarışıq salmamaq üçün nə etmək lazımdır?

A) Toplamaq
B) Sentrifuqalaşdırmaq
C) Ardıcıl yığmaq
D) Qızdırmaq
E) Nömrələmək (kodlaşdırmaq)

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh. 4. В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 13

3) Laboratoriyada hansı kimyəvi maddələrlə işləmək təhlükəlidir?
1. NaOH
2. NaCl
3. HCl
4. HNO3
5. Na2CO3
6. H2SO4

A) 1, 2, 5, 6
B) 2, 3, 4, 5
C) 2, 4, 5, 6
D) 1, 3, 4, 6
E) 1, 3, 4, 5

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 5

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

4) Laboratoriyada müayinə materialını müayinədən sonra nə etmək lazımdır?

A) Gətirilən qabla atmaq
B) Zərərsizləşdirmək
C) İki gün saxlamaq
D) Suya tökmək
E) Kağıza büküb atmaq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 5

5) Qan yaranma prosesi necə adlanır?

A) Hemostaz
B) Regenerasiya
C) Hiperseqmentasiya
D) Hiposeqmentasiya
E) Hemopoez

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 72 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 17

6) Normal məhlul necə hazırlanır?

A) 1 qr maddə,100 ml suda həll edilir
B) Qram ekvivalent çəkisi məlum olan fiksanal l l. ölçülü kolbada distillə suyunda həll edilir
C) 5 q maddə 250 ml suda həll edilir
D) Qram molekul çəkisi məlum olan fiksanal l l. suda həll edilir
E) Maddənin qram molekul çəkisi hesablanıb l l. kolbada distillə suyunda həll edilir

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 154 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 304

7) Orqanizmin daxili maye mühitini hansı toxuma təşkil edir?

A) Qığırdaq toxuması
B) Sinir toxuması
C) Qan
D) Əzələ toxuması
E) Sümük toxuması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı. 1996 səh 71 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 16

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

8) Plazmanın üzvi tərkibində hansı maddələr yoxdur?

A) Azotsuz üzvi maddələr
B) Zülallar, fermentlər
C) Vitaminlər, hormonlar
D) Zülalsız azotlu maddələr
E) Anionlar, kationlar

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 72 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 16-18

9) Leykoliz (leykositoliz) nədir?

A) Eritrositlərin parçalanma prosesidir
B) Leykositlərin % - lə hesablanmasıdır
C) Leykositlərin parçalanma prosesidir
D) Leykositlərin aqqlütinasiyasıdır
E) Bütün hüceyrələrin parçalanmasıdır

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 152

10) Rezistentlik nədir?

A) İmmunitetin zəifləməsidir
B) Hüceyrənin boyanma xüsusiyyətidir
C) Müxtəlif zədələndirici faktora qarşı, orqanizmin (hüceyrənin) müqavimətidir
D) Müxtəlif amillərə qarşı yaranan allergik reaksiyadır
E) Hüceyrələrin parçalanma prosesidir

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 Səh 153

11) Plazma qanın neçə faizini təşkil edir?

A) 62 - 68 %
B) 52 - 58 %
C) 48 - 52 %
D) 42 - 48 %
E) 60 - 62 %

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 71-72

12) Formalı elementlər qanın neçə fazini təşkil edir?

A) 42 - 48 %
B) 52 - 58 %
C) 60 - 62 %

ssk.az ödənissiz istifadə üçün

D) 48 - 52 %
E) 62 - 68 %

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 71-72

13) Qanın xüsusi çəkisi nəyə bərabərdir?

A) 1,064-1,065
B) 1,005-1,010
C) 1,050-1,060
D) 1,034-1,036
E) 1,022-1,030

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 72 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 116-117

14) Hemoqlobinsianid üsulunda hansı reaktivdən istifadə olunur?

A) İzotonik məhlul
B) Harison - Fuşe məhlulu
C) Fizioloji məhlul
D) 0, 1n hidrogen xlorid məhlulu
E) Transformaedici məhlulu (Drapkin)

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 83

15) Hemoqlobinsianid üsulunda hansı cihazdan istifadə olunur?

A) Spirtometr
B) Elektrokalorimetr
C) Fotoelektrokalorimetr
D) Sali hemometr
E) Sentrifuqa

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 83

16) Hemoqlobinin Sali hemometrin köməyi ilə təyinində hansı reaktivdən istifadə olunur?

A) 1 % - li HCl
B) 0, 1n NaCl
C) 0, 1n HNO3
D) 0 ,1n HCl
E) 10 % - li HCl

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 82

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

17) Qan yaxması üçün əşya şüşəsi necə təmizlənir?

A) Yuyulur, 45 dəq yuyucu toz məhlulunda qaynadılır
B) 10 %-li HCl məhlulunda saxlanılır
C) 1 %-li xloramin məhlulunda qaynadılır, yuyulur
D) 1 %-li kalium permanqanat məhlulunda saxlanılır
E) 1 %-li yuyucu toz məhlulunda 35-45 dəq qaynadılır, yuyulur

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88

18) Nikiforov qarışığının tərkibi hansı reaktivlərdən ibarətdir?

A) Spirt, efir
B) Spirt, yod
C) H2SO4, su
D) Spirt, HCl
E) Efir, NaCl

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88

19) Sitoplazması çəhrayı-bənövşəyi tozşəkilli danəli, nüvəsi 2-5 seqmentli bənövşəyi rəngli, 8 -12 mkm ölçüdə olan hüceyrə hansıdır?

A) Mieloblast
B) Seqment nüvəli neytrofil
C) Bazofil
D) Monosit
E) Limfosit

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 74 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 120

20) Sitoplazma geniş, iri, sarı-qırmızı danəli, əksər halda nüvə 2 seq¬ment¬li¬dir,¬ 10-14 mkm ölçüsü olan hansı hüceyrədir?

A) Monoblast
B) Seqment nüvəli eozinofil
C) Bazofil
D) Seqment nüvəli neytrofil
E) Eritroblast

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 74 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 120

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

21) Ölçüsü 7-9, 12-13 mkm olan, nüvəsi tünd bənövşəyi, sitoplazma mavi, göy rəngli, perinuklear zonalı hüceyrə hansıdır?

A) Trombosit
B) Limfosit
C) Monosit
D) Eritrosit
E) Limfoblast

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 75 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 120

22) 12-20 mkm ölçülü müxtəlif formalı iri nüvəyə, geniş boz sitoplazmaya malik bənövşəyi rəngli hüceyrə hansıdır?

A) Eritrosit
B) Monosit
C) Trombosit
D) Limfosit
E) Neytrofil

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 76 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 121

23) Ölçüsü 7-8 mkm, çəhrayı rəngli, kənarı tünd, mərkəzi zəif boyanan hüceyrə hansıdır?

A) Limfosit
B) Trombosit
C) Neytrofil
D) Eritrosit
E) Retikulosit

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 76 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 122

24) Hiolomer və qranulomeri olan hüceyrə hansıdır?

A) Bazofil
B) Trombosit
C) Eritrosit
D) Neytrofil
E) Eozinofil

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 77 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 123

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

25) Retikulositin danəlik xüsusiyyəti hansı üsulla aşkar edilir?

A) Noxt üsulu
B) Maya-Qrunvalt üsulu
C) Romanovski üsulu
D) Papenheyin üsulu
E) Supravital boyanma üsulu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 92 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 155-157

26) Hemoqlobin hansı hüceyrənin daxilində yerləşir?

A) Limfositin
B) Neytrofilin
C) Eritrositin
D) Trombositin
E) Monositin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 78 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 123

27) Eritrositin xarici səthində yerləşən maddələr hansılardır?

A) Lipidlər, sial turşusı, oliqosaxarid antigeni
B) Antigen
C) Hb, kalium, maqnezium
D) ATF, Hb, natrium
E) Hemoqlobin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 79, А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 123-124

28) Eritrositlərin daxili səthində olan maddələr hansılardır?

A) Karbon qazı
B) Polisaxarid
C) Sial turşusı,antigenlər
D) Oliqosaxarid
E) Hb, qlukoprotein

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 79 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 123-124

snsk.az ödənişsiz İstifadə üçün

29) Eritrosit sırası hüceyrələrinin differensiasiya etməsi üçün böyrəklərdə hansı hormon hazırlanır?

A) Adrenalin
B) Antidiuretin
C) Noradrenalin
D) Eritropoetin
E) İnsulin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 76 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 122

30) Qanın laxtalanmasında daha çox hansı qan hüceyrəsi iştirak edir?

A) Leykosit
B) Endotel hüceyrə
C) Trombosit
D) Eritrosit
E) Plazmatik hüceyrə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 80 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 125

31) Trombositlərin miqdarı hansı üsulla təyin edilir?

A) Kbinq üsulu
B) Fonnio üsulu
C) Supravital boyanma üsulu
D) Heylmeyer üsulu
E) Nikolayev üsulu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 90 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва «Медицина» 1989 səh 153-155

32) Qanda leykositlərin sayılması hansı üsulla aparılır?

A) Nikolayev üsulu
B) Fonnio üzrə
C) Noxt boyanma üsulu
D) F.E.K. üsulu(Fotoelektrokalorimetr üsulu)
E) Qan yaxmasında

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 86 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва «Медицина» 1989 səh 176-188

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

33) Meyl indeksi hansı göstərici ilə xarakterizə olunur?

A) Nüvə göstəricisi ilə
B) Danəliliyə görə
C) Leykositin ümumi miqdarı ilə
D) Mütləq miqdarına görə
E) Kimyəvi dəyişkənliyə görə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 80, 81

34) Toz halında Romonovski boyağı hansı boyaq maddələrindən ibarətdir?

A) Metilen abısı, briliant yaşılı
B) Sudan III, metilen abısı
C) Azur II və turş Eozin
D) Qırmızı neytral, briliant yaşılı
E) Metilen abısı, qırmızı neytral

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 89 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва «Медицина» 1989 səh 149

35) Romonovski boyağının tərkibi hansı kimyəvi maddələrdən ibarətdir?

A) Romonovski tozu, Eozin, spirt
B) Romonovski tozu, qliserin
C) Romonovski tozu, Eozin, qliserin
D) Romonovski tozu qliserin, spirt
E) Romonovski tozu, metil spirt, qliserin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 89 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва «Медицина» 1989 səh 149

36) Normada 1 yaşında uşağın qan yaxmasInda limfositlərin miqdarı neçə %-dir?

A) 20 - 25 %
B) 60 - 65 %
C) 19 - 25 %
D) 10 - 12 %
E) 25 - 30 %

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 77, 78

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

37) Asidoz nədir?

A) Qanda OH ionlarının artması
B) Qanda leykositlərin miqdarının artması
C) Qanda bilirubinin artması
D) Qanın xüsusi çəkisinin yüksəlməsi
E) Qanın tərkibində H ionlarının artması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 72 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 116, 117

38) Alkoloz nədir?

A) Qanda H ionlarının artması
B) Qanın pH-nın yüksəlməsi
C) Qanda OH ionlarının artması
D) Qanda düz bilirubinin artması
E) Qanda qlobulin zülalının artması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 72 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 116, 117

39) Retikulositlər hansı boyaqla boyanır?

A) Sudan III boyağı
B) Eozin boyağı
C) Brilliyant krezil abısı
D) Gensian violet boyağı
E) Metilen göyü

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 92 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 55

40) Qanın ümumi müayinəsinə hansı göstəricilər aiddir?

A) Hb, leykositlər, eritrositlər, EÇS
B) E.C.S-nin leykositlərin, protrombinin təyini
C) Qan qrupları, Hb, laxtalanmanın təyini
D) Hb, trombositlərin, qanaxmanın təyini
E) Qanaxma müddətinin, hemotokritin təyini

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 82

snskaz ödənişsiz istifadə üçün

41) EÇS (Eritrositlərin çökmə sürəti)-nin təyinində reaktivlə qanın bir-birinə nisbəti necə olur?

A) 1:3
B) 1:4
C) 3:1
D) 2:2
E) 4:2

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88

42) Qan yaxması neçə dərəcəli bucaq altında çəkilir?

A) 50°
B) 35°
C) 45°
D) 20°
E) 90°

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88

43) Qanda leykoformulanın sayılması üçün hansı boyaqdan istifadə olunur?

A) Azur II
B) Azur I
C) Maya – Qrunvalt
D) Romanovski
E) Turş eozin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 85

44) Normada eritrositlərin yaşama müddəti nə qədərdir?

A) 1 aya kimi
B) 9-12 gün
C) 30-35 gün
D) 90-120 gün
E) 1ildən çox

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 79

45) Soliklon anti-A, anti-B ilə təyinatda hansı görünüş O (I) qan qrupu olduğunu bildirir?

A) Yalnız anti-A ilə aqqlütinasiya gedir hər iki reagentlə mənfidir.
B) Soliklon anti-A və anti-B ilə aqqlütinasiya reaksiyası getmir, mənfidir.

tusk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Soliklon anti-A və anti-B ilə aqqlütinasiya reaksiyası müsbətdir.
D) Soliklon anti-A ilə müsbət, anti-B ilə mənfidir.
E) Soliklon anti-A ilə mənfi, anti-B ilə müsbətdir.

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 117

46) Soliklon anti-A, anti-B ilə müayinədə hansı görünüş AB (IV) qan qrupu olduğunu bildirir?

A) Yalnız anti-B ilə aqqlütinasiya reaksiyası müsbətdir
B) Soliklon anti-A ilə müsbət, anti-B ilə aqqlütinasiyası mənfidir.
C) Soliklon anti-A və anti-B ilə aqqlütinasiya reaksiyası mənfidir.
D) Yalnız anti-A aqqlütinasiya reaksiyası müsbətdir
E) Soliklon anti-A və anti-B ilə aqqlütinasiya reaksiyası müsbətdir.

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 117

47) Leykositoz nədir?

A) Leykositlərin miqdarının normadan az olması
B) Neytrofil leykositdə toksiki danəlilik
C) Leykositlərin miqdarının normada olması
D) Leykositlərin miqdarının normadan çox olması
E) Leykositlərin olmaması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh

48) Leykositlərin ayrı-ayrı növlərinin faizlə təyini necə adlanır?

A) Leykositlərdə fermentlərin təyini
B) Sola meyl indeksi
C) Leykoformula
D) Aqqlütinasiya
E) Osmotik davamlılıq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 84, 85

49) Fonio üzrə trombositlər qan yaxmasında neçə eritrositə görə sayılır?

A) 100
B) 110
C) 10000
D) 1000
E) 500

sns.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 90

50) Hemoqlobin hansı üsulla təyin edilir?

A) Düke üsulu ilə
B) Hemoqlobinsionid üsulu ilə
C) Qazometrlə
D) Rozental kamerada
E) Polyarimetrlə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 83

51) Qanyaxmasında trombositləri saymaq üçün hansı reaktivlərdən istifadə olunur?

A) MgSO4, EDTA
B) KJ, EDTA
C) MgSO4, KCl
D) KJ, natrium sitrat
E) NaCl, KJ

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 90

52) Trombositlərin yaşama müddəti neçə gündür?

A) 10-17 gün
B) 20-27 gün
C) 17-20 gün
D) 7-10 gün
E) 15-16 gün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 80

53) Aşağıdakılardan hansı eritrositlərin çökmə sürətinin artmasına təsir edir?

A) Eritrositlərin miqdarının azalması
B) Qanda qlobulinin artması
C) Qanda xolesterinin miqdarının çoxalması
D) Qanda asidoza meyllikdə
E) Qanda albuminin artması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 144, 145

sask.az ödənişsiz istifadə üçün

54) Hansı xəstəliklərdə qanda eozinofilin miqdarı artır?

A) Qarın yatalağı, anemiya
B) Apendisit, poliomiyelit
C) Nefrit, qastrit
D) Anemiya
E) Bronxial astma, askaridoz

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 96 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова.Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 158

55) Hansı xəstəlik zamanı retikulositoz müşahidə olunur?

A) Krupoz pnevmoniyada
B) Aplastik anemiyada
C) Hemolitik anemiyada
D) Şüa xəstəliyində
E) Miokard infarktında

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 92 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва «Медицина» 1989 səh 186

56) Eritrositlərin osmotik davamlılığı əsasən hansı xəstlikdə təyin edilir?

A) Hemolitik anemiya
B) Trombositopatiya
C) Qastrit, meningit
D) Miyelofibroz
E) Kəskin posthemorragik aenmiya

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 93 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 168, 169

57) Anemiya zamanı eritrositlərdə hansı keyfiyyət dəyişkənliyi müşahidə edilir?

A) Eozinofiliya, eozinopeniya
B) Normositoz, neytropeniya
C) Normoxrom, neytrofilez
D) Limfositoz, monositoz
E) Anizositoz, poykilositoz

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 97-98 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 161, 163

snskaz.ödənişsiz istifadə üçün

58) Anemiya zamanı poykilosit eritrosit nədir?

A) Eritrositlərin formasının dəyişməsi
B) Toksik dənəlilik xüsusiyyəti
C) Eritrositlərin ölçüsünün dəyişməsi
D) Yaşama müddətinin dəyişməsi
E) Boyaq qəbul etmə xüsusiyyətinin dəyişməsi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 98 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 162

59) Anizositoz zamanı eritrositdə hansı əlamət müşahidə olunur?

A) Ölçüsünün dəyişməsi
B) Normoblast
C) Anizoxrom
D) Formasının dəyişməsi
E) Kebot həlqəli eritrosit

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 97-98 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 162

60) Hansı anemiyada mikrositoz müşahidə olunur?

A) Kəskin posthemorragik anemiyada
B) B12 vitamini çatışmazlığı anemiyasında
C) Meqaloblast anemiyada
D) Addison-Birmer xəstəliyində
E) Dəmir çatışmazlığı anemiyasında

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 99 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 164

61) Hansı anemiyada meqalasitoz müşahidə olunur?

A) Posthemorragik anemiyada
B) B12 vitamini, fol turşusu çatışmazlığında
C) Dəmir çatışmazlığında
D) Aplastik anemiyada
E) Talassemiyada

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 101 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 166

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

62) Hansı anemiya zamanı sidiyin rəngi qara rəngdə olur?

A) Vitamin B12 çatışmazlığı anemiyasında
B) Dəmir defisitli anemiyada
C) Aplastik anemiyada
D) Posthemorragik anemiyada
E) Hemolitik anemiyada-qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza ferment aktivliyinin azalması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 103 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 170

63) Aşağıda göstərilənlərdən hansı irsi hemolitik anemiyaya səbəb ola bilər?

A) Miyelopoyezin pozulması
B) İrinli-iltihabi proses
C) Limfopoezin pozulması
D) Eritrositdə ferment aktivliyinin pozulması
E) Trombopoezin pozulması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 76 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 122

64) Normada eritrositin quruluşu necə olur?

A) Dairəvi, diskə bənzər
B) Oraqvari
C) Ellips şəkilli
D) Uzunsov şəkilli
E) Şar şəkilli

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 76 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 122

65) Normada eritrosit hansı ölçülərdə olur?

A) Diametri 12 -13 mkm, qalınlığı 3 mkm
B) Diametri 10 - 12 mkm, qalınlığı 3 mkm
C) Diametri 1, 5 mkm, qalınlığı 1 mkm
D) Diametri 7 - 8 mkm, qalınlığı 2 mkm
E) Diametri 4 - 5 mkm, qalınlığı 3 mkm

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 76 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 122

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

66) Rəng göstəricisi normada nə qədər olur?

A) 0, 4 - 0,5
B) 1, 5
C) 0, 6 - 0, 8
D) 0, 4 - 0,5
E) 0, 85 - 1, 05

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 87 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова.Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 142,143

67) Oksofil nədir?

A) Qələvi və turş boyalarla boyanma
B) Neytral boyalarla boyanma
C) Turş boyalarla boyanma
D) Əsasi boyalarla boyanma
E) Qələvi boyalarla boyanma

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 153

68) Qan yaranma prosesinin pozulması nəticəsində hansı anemiya baş verir?

A) Autoimmun hemolitik anemiya
B) Posthemorragik anemiya
C) Kəskin posthemorragik anemiya
D) Hemolitik anemiya (qazanılma)
E) Dəmir və B12 vitamini çatışmazlığı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 97 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 164, 165

69) Kastlın qaraciyərdə aşkar etdiyi xarici faktor (maddə) hansıdır?

A) A vitamini
B) C vitamini
C) E vitamini
D) PP vitamini
E) B12 vitamini

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 100 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 165

70) Hansı maddələrin birləşməsindən antianemik kompleks əmələ gəlir?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Qlükoprotein zülalı + C vitamini
B) HCl + B2 vitamini
C) Qlükoza + ATF komleksi
D) Qlükoprotein zülalı + B12 vitamini
E) Qlükoprotein zülalı + B6 vitamini

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 100 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 165

71) B12 vitamini çatışmazlığında rəng göstəricisi hansı səviyyədə olur?

A) 0, 6 - 0, 8 hipoxporm
B) 0, 85 -1, 05, normoxrom
C) 0, 9 - 1, 15, normoxrom
D) 1 ,3 -1, 8, hiperxrom
E) 0, 5 - 0, 6 hipoxrom

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 101 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 165

72) Sola meyillilik nədir?

A) Prolimfositlərin qanda faizlə çoxalması
B) Normositlərin qanda faizlə çoxalması
C) Qanda yetişməmiş neytrofilin faizlə çoxalması
D) Monositlərin faizlə azalması
E) Qanda promonositin faizlə çoxalması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 80 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 158, 159

73) Sağa meyillilik nədir?

A) Eritrositlərin çoxalması
B) Limfositlərin çoxalması
C) Cavan neytrofillərin periferik qana keçməsi
D) Hiperseqmentasiyalı neytrofilin çoxalması
E) Bazofilin çoxalması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 80 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 165

74) Aşağıda verilən göstəricilərdən hansı qanda patoloji vəziyyəti göstərir?

A) Leykosit – 4,0x109 l, ECS – 10 mm/s
B) Leykosit – 15,0x109 l, ECS – 30 mm/s

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Leykosit – 8,0x109 l, ECS – 12 mm/s
D) Leykosit – 7,0x109 l, Eritrosit – 4,0x1012 l
E) Leykosit – 7,0x109 l, ECS – 2 mm/s

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh

75) Aşağıda verilən göstəricilərdən hansı qanın normal göstəricisidir?

A) Hb – 20 q/l, Leykosit – 3,0x109 l, ECS – 2 mm/s
B) Hb – 170 q/l, Leykosit – 20,0x109 l, ECS – 5 mm/s
C) Hb – 130 q/l, Leykosit – 6,0x109 l, ECS – 10 mm/s
D) Hb – 100 q/l, Leykosit – 3,5x109 l, ECS – 20 mm/s
E) Hb – 40 q/l, Leykosit – 4,0x109 l, ECS – 20 mm/s

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh

76) Hansı anemiyada sağa meyillilik müşahidə olunur?

A) Dəmir çatışmazlığında
B) Posthemorragik anemiyada
C) B12 vitamin çatışmazlığında
D) Hemolitik anemiyada
E) Aplastik anemiyada

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 101

77) Hemorragik diatezlərin ümumi əlaməti hansıdır?

A) Sümük kövrəkliyi
B) Qanaxma müddətinin azalması
C) Qanaxma ilə davam edən koaqulopatiya
D) Dərinin quruması
E) Trombozun əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 107 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 189

78) Qanın laxtalanma sisteminin pozulması ilə əlaqədar olan irsi xəstəlik hansıdır?

A) Xroniki monositar leykoz
B) Hemofiliya
C) Anemiya
D) Kəskin leykoz
E) Eritremiya

sənəd ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 108 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 190-191

79) Hansı vitaminin sorulmasında ödün rolu var?

A) C vitamini
B) PP vitamini
C) K vitamini
D) B6 vitamini
E) A vitamini

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 108 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 191-192

80) Qanaxma müddəti hansı üsulla təyin edilir?

A) Burker üsulu ilə
B) Nikolayev üsulu ilə
C) Hemoqlobinsionid
D) Duke üsulu ilə
E) Suxaryev üsulu ilə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 110 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 184, 185

81) Nomada qanaxma müddəti (Duke üzrə) neçə dəqiqəyə kimidir?

A) 6 dəq.
B) 4 dəq.
C) 10 dəq.
D) 12 dəq.
E) 2 dəq.

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 110 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 184, 185

82) Kapilyar qanın laxtalanma müddəti hansı üsulla təyin edilir?

A) Fonio üsulu
B) Fotometrik üsul
C) Li-Uayt üsulu
D) Suxaryev üsulu
E) Duke üsulu

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 110 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 184

83) Eritrositlərdəki qan qrupunu göstərən aqqlütinogen hansı hərflərlə işarə olunur?

A) B və E
B) B və C
C) A və C
D) A və B
E) A və D

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 111 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 202

84) Aqqlütinin harada yerləşir və hansılardır?

A) Trombositdə D və E
B) Qan zərdabında α və β
C) Eritrositlərdə A və B
D) Leykositdə β və λ
E) Eritrositdə α və β

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 112 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 205

85) Aqqlütinasiya nədir?

A) Hüceyrələrin müxtəlif üsullarla boyanmasıdır
B) Əsas boyaqla boyanan xromatindir
C) Sərt gövdə üzərinə qaz və həllolmuş maddələrin udulmasıdır.
D) Hissəciklərin bir-birinə yapışması və çöküntüyə düşməsidir
E) Müxtəlif və eynicinsli hüceyrələrin qruplaşmasıdır

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 150

86) Soliklon üsulda ABO sistemində hansı amil təyin edilir?

A) Zərdabda aqqlütünogen
B) Eritrositdə aqqlütinogen
C) Zərdabda aqqlütinin
D) Leykositdə aqqlütinin
E) Eritrositdə aqqlütinin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 117

sənəz ödənişsiz istifadə üçün

87) Nə üçün O(I) qan qrupu universal donor hesab edilir?

A) Zərdabında hər iki aqqlütinin var
B) Eritrositdə A aqqlütinagen var
C) Eritrositdə hər iki aqqlütinogen var
D) Eritrositdə B aqqlütinogen var
E) Eritrositdə heç bir aqqlütinogen yoxdur

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 112 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 206

88) Rezus - amili hansı üsullarla təyin edilir?

A) Burker, Düke
B) Şmid sınağı, zərdabla
C) Soliklon anti – A, anti – B
D) Standart zərdabla (anti–rezus), Soliklon anti – D
E) Suxaryev, Bürker

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 119 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 222, 225

89) Qoryayev kamerasında eritrosit neçə böyük kvadratda sayılır və hesablamada praktiki olaraq hansı rəqəmə vurulur?

A) 5 kv,1000
B) 100 kv, 50
C) 5 kv,10000
D) 80 kv, 100
E) 4 kv, 100

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 85 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 162, 163

90) Qoryayev kamerasında leykosit neçə böyük kvadratda sayılır və hesablamada praktiki olaraq hansı rəqəmə vurulur?

A) 20 kv, 50-yə vurulur
B) 80 kv, 100-ə vurulur
C) 100 kv, 50–yə vurulur
D) 5 kv, 1000-ə vurulur
E) 5 kv, 10000-ə vurulur

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 86 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 164

91) Lupus erythematodes (LE)- hüceyrələrini aşkar etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

A) Kapilyar qandan yaxmanın hazırlanması
B) Leykosentratdan yaxmanın hazırlanması
C) Zərdabdan preparat hazırlamaqla
D) Venoz qandan yaxmanın hazırlanması
E) Standart eritrositdən yaxmanın hazırlanması

Ədəbiyyat: В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 196-198

92) Qanla işlədikdən sonra pipet və qabların təmizlənməsində istifadə olunan qarışıq hansıdır?

A) Nikiforov qarışığı ilə
B) Su, perehidrol, yuyucu toz qarışığı
C) Spirt, perehidrol
D) Formalen, su
E) Efir spirti, formalin

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 129

93) Hansı xəstəlikdə qan yaxmasında hədəfəbənzər eritrositin görünməsi müşahidə olunur?

A) Talassemiyada
B) Dəmir çatışmazlığı anemiyasında
C) Kəskin posthemorrogik anemiyada
D) B12 vitaimini çatışmazlığı anemiyasında
E) Aplastik anemiyada

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 103 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 169, 170

94) Hematokrit nədir?

A) Eritrositlərin miqdarı
B) Leykositlərin,eritrositlərə olan nisbəti
C) Plazmada zülalın miqdarı
D) Formalı elementlər ilə plazma arasındakı nisbət
E) Zərdabın miqdarı

sınaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 178, 179

95) Qanın laxtalanma prosesi neçə fazada gedir?

A) 6
B) 1
C) 5
D) 3
E) 2

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 109, 110 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 183

96) Qanın laxtalanmasının son məhsulu nədir?

A) Akselerin
B) Tpombokinaza
C) Protrombin
D) Fibrin
E) Tpombin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 109 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 183

97) Neçə plazma faktoru var?

A) 10
B) 13
C) 15
D) 4
E) 14

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 183, 185

98) Fibrinoliz nədir?

A) Qanın hemoliz olması
B) Qan laxtasının əriməsi
C) Fibrin sapının əmələ gəlməsi
D) Laxtanın əmələ gəlməsi
E) Qanın qatılaşması

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 188

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

99) Eritrositin yaranması və inkişaf etməsi üçün hansı hormon təsir edir?

A) Noradrenalin hormonu
B) Aldesteron hormonu
C) Eritropoetin hormonu
D) İnsulin hormonu
E) Adrenalin hormon

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 76 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 122

100) Bir sutka ərzində böyrəklərdən neçə litr qan dövr edir?

A) 1200 l
B) 500 l
C) 180 l
D) 1000 l
E) 1800 l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 7

101) Orqanizmin bütün qanı böyrəklərdən neçə dəqiqəyə keçə bilər?

A) 5 - 10 dəq
B) 25 - 30 dəq
C) 2 - 3 dəq
D) 50 - 60 dəq
E) 40 - 45 dəq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 7

102) Böyrəklərin əsas iş qabiliyyəti nəyin üzərinə düşür?

A) Beyn maddəsinin
B) Qabıq maddəsinin
C) Böyrək ləyəninin
D) Toplayıcı boruların
E) Nefronların

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 7

103) İlk sidik qan plazmasından hansı tərkibinə görə fərqlənir?

A) Şəkərin olmamağına görə
B) Hormonun olmamağına görə
C) Mineral maddələrə görə

Şəxsi istifadə üçün

D) Zülalın olmamağına görə
E) Zülalın olmasına görə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 8-9

104) Sidiyin miqdarı hansı qabla təyin edilir?

A) Pipetka ilə
B) Erlenmeyer kolbası ilə
C) Ölçülü silindrlə
D) Kimyəvi sınaq şüşəsi ilə
E) Ölçülü kolba ilə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 11

105) Sidiyin təşkil və ifraz olunmasında hansı endokrin vəzlər iştirak edir?

A) Böyrəküstü vəzi, qalxanabənzər vəz
B) Timus vəzi, limfa vəzləri
C) Limfa vəziləri
D) Hipofiz vəzi, böyrəküstü vəz
E) Mədəaltı vəzi, hipofiz vəz

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 10

106) Normada qəbul olunan mayenin neçə % -i sidiklə ifraz olunur?

A) 50 - 55 % - i
B) 80 - 90 % - i
C) 30 - 40 % - i
D) 60 - 80 %
E) 20 - 30 % - i

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 11 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 16

107) Andreyev üsulu ilə sidikdə reaksiyanı təyin etdikdə hansı indikatordan istifadə olunur?

A) Amidopirin
B) Dimetilamidozabenzol
C) Brom-timol abısı
D) Fenoftalein
E) Natrii alizarinsulfon

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 sən 13

108) Keton cismiciklərinə hansı aiddir?

A) Aseton, Betta-oksiyağ turşusu
B) Neytral yağlar
C) Yağ turşusu
D) Aminosirkə turşusu
E) Sirkə turşusu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 sən 22 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 21

109) Sidikdə zülalı hansı üsulla təyin etmək olmaz?

A) Robert-Stolnikov-Brandberq üsulu
B) Ekspres-test
C) Hellerin həlqəvi sınağı
D) Haynes-Akimov sınağı
E) Sulfosalisil sınağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 16-17 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 20-25

110) Sidikdə leykositlərin keyfiyyət xüsusiyyətini hansı üsulla təyin etmək olar?

A) Təxmini üsul
B) Romanovski-Himza
C) Subravital boyanma (safroninlə)
D) Qırmızı neytral
E) Sudan III-lə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 30 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 49-50

111) Sutkalıq diurez hansı xəstəlikdə 3-4 litrə qədər ola bilər?

A) Kəskin nefritdə
B) Xroniki nefritdə
C) Kəskin pielonefritdə
D) Şəkərli diabetdə
E) Xroniki pielonefritdə

sinq.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 11 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 27

112) Hansı xəstəlikdə sidik rəngsiz su kimi olur?

A) Xroniki nefrit
B) Kəskin nefritdə
C) Şəkərli diabet, səkərsiz diabet
D) Pielonefrit
E) Nefrotik sindrom

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 11 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 27 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 16-17

113) Hansı xəstəlikdə sidiyin rəngi tünd, nəcisin rəngi açıq olur?

A) Kəskin nefrit
B) Şəkərli diabet
C) Xroniki tonzillit
D) Kəskin virus hepatiti
E) Hemolitik anemiya

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 23 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 21-22, 72

114) Hansı xəstəlik zamanı sidiyin rəngi ət suyunu xatırladır?

A) Parinximatoz sarılıq
B) Hemolitik anemiya
C) Mexaniki sarılıq
D) Kəskin nefrit, kəskin qlomerulonefrit
E) Şəkərli diabet

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 12 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 26

115) Hansı xəstəlik zamanı sidikdə leykositlərin miqdarı daha çox olur?

A) Mexaniki sarılıq
B) Anemiya
C) Kəskin appendisit
D) Sistit, pielonefrit
E) Vərəm

ensiklopedik ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 30 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 27

116) Hansı xəstəlik zamanı sidikdə eritrositlərin miqdarı çoxalır?

A) Uretrit, hepatit B
B) Post hemorragik anemiya
C) Parinximatoz sarılıq
D) Kəskin nefrit, kəskin qlomerulonefrit
E) Mexaniki sarılıq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 31 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 26

117) Sidikdə hüceyrəvi elementlər hansı üsullarla aşkar edilir?

A) Turşu damızdırmaqla
B) Hellerin həlqəvi sınağı
C) Qızdırmaqla
D) Filtirdən süzməklə
E) Mikroskopik

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 28 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 41, 22, 24

118) Hansı halda sidikdə silindirə daha çox rast gəlinir?

A) Anemik sindrom
B) Şəkərli diabet
C) Nefrotik sindrom
D) Şəkərsiz diabet
E) Menengial sindrom

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 31 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 26

119) Funksional proteinuriya hansı halda olur?

A) Nikturiyada
B) Fiziki, psixi gərginlikdə
C) Kanalcıq zədələnməsində
D) Böyrək durğunluğunda
E) Yumaqcıq zədələnməsində

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 15 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 18-19

120) Sidikdə zülal keyfiyyətcə hansı üsulla təyin edilir:

A) Haynes reaktivi ilə
B) 30%-li sulfosalisil turşusu ilə
C) 20%-li sulfosalisil turşusu ilə
D) Fuşe reaktivi ilə
E) 10%-li qələvi ilə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 15, 16 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 20

121) Sidik isti yerdə qaldıqda qoxusu necə olur?

A) Sirkə tirşusu
B) Gül qoxusu
C) Ammonyak
D) Aseton
E) Alma qoxusu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 15

122) Gecə diurezinin gündüz diurezindən çox olması necə adlanır?

A) Nikturiya
B) Anuriya
C) Oliqouriya
D) Dizuriya
E) Poliuriya

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 11 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 14

123) Neçiporenko üsulu ilə hansı sidik müayinə edilir?

A) 12 saat ərzində toplanan sidik
B) 1 dəfəlik ifraz olunan sidiyin orta payı
C) 1 sutka ərzində toplanan sidik
D) 3 saat ərzində toplanan sidik
E) 5 saat ərzində toplanan sidik

sesk.az odənsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 34 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 43-44

124) Hemolitik sarılıqda sidikdə aşağıdakılardan hansı olur?

A) Urobilinuriya
B) Ketonuriya
C) Qlükozuriya
D) Bilirubinuriya
E) Proteinuriya

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 23 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 21-22

125) Görmə sahəsində normada sidik çöküntüsündə olan elementlər hansıdır?

A) Leykosit 1-3 ədəd, epitel 1-3 ədəd
B) Erotrositlər 5-10 ədəd
C) Tək-tək silindirlər
D) Leykosit topalarla
E) Tək-tək böyrək epiteli

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 30, 33 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 22, 24

126) Gündəlik sidiyin miqdarının çoxalması necə adlanır?

A) Nikturiya
B) Oliqouriya
C) Dizuriya
D) Poliuriya
E) Anuriya

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 11 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 14

127) Hematuriya zamanı sidikdə hansı dəyişiklik müşahidə olunur?

A) Yağların miqdarı artır
B) Bilirubin miqdarı artır
C) Leykositlərin miqdarı azalır
D) Eritrositlərin miqdarı artır
E) Urat duzları təyin edilir

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 30, 31 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 24

128) Sidikdə bilirubin olduqda rəngi necə olur?

A) Tünd çay və pivə rəngində
B) Çəhrayı rəngdə
C) Göy rəngində
D) Ət suyu rəngində
E) Süd rəngində

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 23 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 22

129) Sidikdə uratlar hansı reaktivlə həll olur?

A) Haynes reaktivi ilə
B) Larionov reaktivi ilə
C) 5%-li sirkə turşusu ilə
D) Qələvi damızdırmaqla
E) Spirt əlavə etməklə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 12 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 15

130) İzostenuriya nədir?

A) Daimi olaraq xüsusi çəkisi dəyişməyən sidiyin ifraz olunmasıdır
B) Daimi olaraq sidiyin xüsusi çəkisinin yüksək ifraz olunmasıdır
C) Sutka ərzində sidiyin xüsusi çəkisinin xeyli interval arasında dəyişməsidir
D) Sidiyin çox ifraz olunmasıdır
E) Gecə diurezinin gündüz diurezindən çox ifraz olunmasıdır

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 Səh 151

131) Sidikdə yağlar olduqda sidik necə şəffaflaşdırılır?

A) Efir damızdırmaqla
B) Qızdırmaqla
C) Süzməklə
D) Sentrafuqadan keçirməklə
E) Qələvi damızdırmaqla

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 12 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 15

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

132) Sidikdə şəkər keyfiyyətcə hansı reaktivlə aşkar edilir?

A) Haynes Akimov reaktivi
B) Larionov reaktivi
C) Lakmus kağızı
D) 20%-li sulfosalisil turşusu
E) Selena reaktivi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 18 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 24

133) Sidikdə keton cisimcikləri hansı halda aşkar olunur?

A) Fiziki gərginlikdə
B) Emosional gərginlikdə
C) Soyuq suda çimdikdə
D) Şəkərli diabetin ağır formasında
E) Sidik uzun müddət istidə qaldıqda

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 22 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 21, 38

134) “Aktiv” leykositləri aşkar etmək üçün hansı sidik müayinə edilir?

A) Təzə və səhər sidiyi
B) İfraz olduqdan 3 saat sonra
C) 3 saat ərzində toplanan sidik
D) Sutkalıq sidik
E) 5 saatlıq sidik

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 30 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 49-50

135) Haynes Akimov reaktivi hansı qarışıqdan ibarətdir?

A) $CuSO_4$, NaOH, qliserin
B) $CuSO_4$, qliserin, HCl
C) Qliserin, NaOH, HCl
D) $CuSO_4$, qliserin, sirkə turşusu
E) NaOH, qliserin, KOH, H_2SO_4

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 18, 19 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 28

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

136) Neçiporenkoya görə normada bir litr sidikdə nə qədər eritrositlər ola bilər?

A) 10x106
B) 5x106
C) 1x106
D) 3x106
E) 4x106

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 35 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 43-44

137) Neçiporenkoya görə normada bir litr sidikdə leykositlərin miqdarı nə qədərdi?

A) 15x106
B) 10x106
C) 20x106
D) 4x106
E) 1x106

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 35 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 43, 44

138) Nə zaman sidikdə alma (meyvə) qoxusu verir?

A) Xroniki nefritdə
B) Pielonefritdə
C) Sistində
D) Şəkərli diabetdə
E) Nefrotik sindromda

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13

139) Sidik nə zaman hidrogen –sulfid iyi verir?

A) Şəkərsiz diabetdə
B) Bronxitdə
C) Şəkərli diabetdə
D) Sistitdə
E) Vərəmdə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13

140) Hansı sidikdə qan piqmenti təyin edilir?

A) Təzə ifraz olunmuş sidik
B) 3 saat saxlanmış sidik

Ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 2 saat saxlanmış sidik
D) 1 sutkalıq sidik
E) 3 saat ərzində toplanmış sidik

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 27 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 25-27

141) Sidikdə ağ rəngli çöküntü nə zaman müşahidə olunur?

A) Lipiduriyada
B) Uraturiyada
C) Fosfaturiyada
D) Oksalaturiyada
E) Urekimiyada

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 29

142) Sidiyin xüsusi çəkisinin təyini böyrəklərin hansı funksiyasını göstərir?

A) Süzülmə
B) Reabsorbsiya
C) Seçmə
D) Zənginləşdirmə
E) İfrazetmə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 16

143) Hansı xəstəlikdə daha çox qələvi xassəli sidik müşahidə olunur?

A) Bronxial astmada
B) Sistitdə
C) Sifilisdə
D) Meningitdə
E) Xroniki bronxitdə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 12 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 27

144) Sidikdə qan piqmenti hansı üsulla aşkar edilir?

A) Lanq sınağı, Yaffe sınağı
B) Rozin sınağı, Fuşe sınağı
C) Yaffe sınağı, Amidopirin sınağı
D) Benzidin, Amidopirin sınağı, ekspres-test

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Geya sınağı, Şmid sınağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 27 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 25-27

145) Sidikdə indikan hansı üsulla təyin edilir?

A) Geya sınağı
B) Amidopirin sınağı
C) Rozin sınağı
D) Benzidin sınağı
E) Yaffe sınağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 26 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 40-41

146) Larionova reaktivinin tərkibi hansı maddələrdən ibarətdir?

A) 1:1 NaCl və KCl
B) 1ml HNO_3 + 100ml-1%KCl
C) 99 ml doymuş NaCl məhlulu + 1 ml qatı HNO_3
D) 1:1 HNO_2 və HCl
E) 1q NaOH + 5%-99ml NaCl

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 17 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 32

147) Sidikdə keton cisimcikləri hansı üsulla aşkar edilir?

A) Hellerin həlqəvi sınağı, Leqal sinağı
B) Qlükotest sınağı, Albufan
C) Fuse sınağı, Rozin sınağı
D) Lanq, Leqal sinağı, Ekspres test
E) Haynes Akimov sınağı, Pandi sınağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 22 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 34-36

148) Harrison-Fuşe sınağında hansı reaktivdən istifadə olunur?

A) Fuşe reaktivi, 10% NaCL
B) 10% $BaCl_2$, 5% NaCl
C) Fuşe reaktivi, buzlu sirkə turşusu

sirkaz.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 10% $BaCl_2$ + KJ
E) 15% $BaCl_2$, Fuşe reaktivi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 24

149) Sidikdə zülalın təyinində alınan həlqə hansı rəngdə olur?

A) Ağ
B) Qırmızı
C) Göy
D) Sarı
E) Yaşıl

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 17

150) Hellerin həlqəvi sınağında 2-3 dəqiqə müddətində alınan həlqənin qiyməti nə qədərdir?

A) 0,33 q/l
B) 3,3 q/l
C) 0,66 q/l
D) 0,002 q/l
E) 0,033 q/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 17

151) Sidikdə Florens sınağının aparılmasında istifadə olunan reaktivlər?

A) Efir, $MgSO_4$
B) KCl, HCl, efir
C) H_2SO_4, HCl, efir
D) NaCl, efir, KJ
E) H_2SO_4, HNO_3, efir

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 25

152) Benzidin sınağında istifadə olunan reaktivlər?

A) H_2O_2, NaCl, buzlu sirkə turşusu
B) Benzidin, buzlu sirkə turşusu, 3% -li H_2O_2
C) Benzidin, HCl, H_2SO_4
D) Amidopirin, spirt, KCl
E) Buzlu sirkə turşusu, H_2O_2, amidopirin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 27, 61

sesik.az ödənişsiz istifadə üçün

153) Sidikdə urobilin hansı üsulla aşkar edilir?

A) Leqal sınağı
B) Fuşe sınağı
C) Florens sınağı, ekspres-test
D) Lanq sınağı
E) Qlükotest sınağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 25 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 38-40

154) Sidikdə biluribin hansı üsulla aşkar edilir?

A) Florens sınağı, Rozin sınağı
B) Rozin sınağı, Harrison-Fuşe sınağı, Ekspres-test
C) Lanq sınağı, Florens sınağı
D) Lanq sınağı, Ekspres-test
E) Leqal sınağı, Heller sınağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 24 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 36-38

155) Sidikdə şəkərin miqdarı hansı üsulla təyin edilir?

A) Leqal üsulu, Şmid sınağı
B) Kalorimetr, polyarimetr, ekspres-test
C) Fuşe, Qlukotest üsulu
D) Lanq üsulu, Hellerin həlqəvi sınağı
E) Florens üsulu, Fuşe sınağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 20 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 27-30

156) Sidikdə zülalı miqdarca təyin etdikdə hansı reaktivdən istifadə olunur?

A) Leqal reaktivi, HNO3
B) Larionov reaktivi, HNO3
C) Qələvi, HCl
D) Fuşe reaktivi, Rozin reaktivi
E) Haynes Akimov reaktivi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 17 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 22

snskaz ödənişsiz istifadə üçün

157) Sidik çöküntü elementlərindən hansı yalnız böyrək xarakterlidir?

A) Yastı epiteli
B) Eritrositlər
C) Leykositlər
D) Bakteriya
E) Silindlər

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 31

158) Sidiyin xüsusi çəkisi hansı cihazla təyin edilir?

A) Urometr
B) Hemometr
C) Spidometr
D) Qazometr
E) Arometr

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13

159) Normada sutka ərzində sidiyin çəkisi hansı interval arasında dəyişir?

A) 1,000-1,010
B) 1,008-1,024
C) 1,025-1,030
D) 1,030-1,040
E) 1,005-1,010

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13

160) Sidiyin xüsusi çəkisinin təyini zamanı otağın temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

A) 25-30°C
B) 35-40°C
C) 10-15°C
D) 30-35°C
E) +15°, +25C°

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13

161) Sidikdə zülal miqdarca hansı üsulla təyin edilir?

A) Sulfosalisil sınağı
B) Rozin sınağı
C) Brandberq-Stolnikov

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Haynes-Akimov sınağı
E) Althayzen sınağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 17

162) Sidikdə bakteriya olduqda sidik necə şəffaflaşdırılır?

A) Sirkə turşusu damızdırmaqla
B) Turşu damızdırmaqla
C) Bakterial filtrdən keçirməklə
D) Qələvi damızdırmaqla
E) Sentrifuqalaşdırmaqla

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 12

163) Hansı üsulla sidiyin fiziki və kimyəvi xassələrini eyni zamanda təyin etmək olar?

A) Albufan
B) Universal indiqator kağızı
C) Ekspres-test-Combina
D) Qlükotest
E) Asidotest

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh

164) Normada sidiyin pH-ı hansı xassəyə malikdir?

A) turş pH 4,0-5,0
B) kəskin qələvi pH 8,0-9,0
C) kəskin turş pH 2,0-3,0
D) qələvi pH 7,0-8,0
E) zəif turş, neytral pH 5,3-6,5

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh

165) Sidiyin ümumi müayinəsinə hansılar aiddir?

A) Yalnız mikroskopik xassələri
B) Yalnız kimyəvi xassələri
C) Yalnız zülal və şəkər
D) Yalnız fiziki xassələri
E) Fiziki-kimyəvi,mikroskopikxassələri

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 11

sınaq üçün istifadə üçün

166) İzosteinuriya hansı xəstəliklərdə müşahidə edilir?

A) Xroniki böyrək çatışmazlığında
B) Böyrəyin daş xəstəliyində
C) Sistitdə
D) Şəkərli diabetdə
E) Pielonefritdə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 14 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 26

167) Zimnitski sınağı ilə sidiyin hansı müayinəsi aparılır?

A) Hər payda yalnız zülalın miqdarı
B) Sutkalıq diurez, zülalın təyini
C) Hər payda yalnız şəkərin miqdarı
D) Yalnız gecə və gündüz diurezi
E) Hər payın xüsusi çəkisi, miqdarı, gecə və gündüz diurezi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13, 14 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 16-18

168) Hipostenuriya nədir?

A) Sutkalıq sidiyin miqdarının çox olmasıdır
B) İfraz olunan sidiyin xüsusi çəkisinin daimi yuxarı olmasıdır
C) Sidikdə zülalın olmasıdır
D) Sidiyin ifraz olunmamasıdır
E) İfraz olunan sidiyin xüsusi çəkisinin daim aşağı olmasıdır

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 Səh 153

169) Hansı indikatorla mədə şirəsində sərbəst turşuluq təyin edilir?

A) Unversal indiqator kağızı
B) Qırmızı konqo kağızı ilə
C) Natrium alizarinsulfon turşusu
D) Dimetilamidoazobenzol
E) Fenoftalein

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 44 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 67

ensk.az ödənissiz istifadə üçün

170) Hansı xəstəlikdə mədə şirəsində turşuluq aşağı olur?

A) Xroniki atrofik qastrit
B) Kəskin qastrit
C) Səthi qastrit
D) 12 barmaqbağırsaq yarası
E) Mədə xorası

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 40 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 48

171) Mədə şirəsində turşuluq əsasən hansı üsulla təyin edilir?

A) Uffelman üsulu
B) Mixailes Tepffer üsulu
C) Mikroskopik üsulla
D) NCl-la titirləmə
E) Tuqolukova üsulu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 44 С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 66-68

172) Adsorbsiya nədir?

A) Hüceyrələrin müxtəlif boyanmasıdır
B) Sərt gövdə üzərinə qaz və həll olmuş maddələrin udulmasıdır
C) Hüceyrələrin bir-birinə yapışması və çöküntüyə düşməsidir
D) Müxtəlif və eynicinsli hüceyrələrin qruplaşmasıdır
E) Əsas boyaqla boyanan xromatindir

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 150

173) Hansı xəstəliklərdə mədə şirəsinin acqarına payının mikroskopik müayinəsində nişasta dənəciyinə, yağ damlalarına, çoxlu miqdarda maya göbələklərinə rast gəlinir?

A) 12 barmaq bağırsağın xorası
B) Hiperasit qastrit
C) Mədə yarası
D) Xroniki səthi qastrit
E) Mədənin piloris hissəsinin stenozu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 42 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 52, 53

sirsk.az ödənişsiz istifadə üçün

174) Normada mədə möhtəviyyatının tərkibi hansı maddələrdən ibarətdir?

A) Selik, HCl, fermentlər
B) HCl, süd turşusu, fermentlər
C) Sarsinlər, süd turşusu, selik
D) Maya göbələyi, selik
E) Selik, süd turşusu, HCl

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 39 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 46, 47

175) Zondsuz üsulla mədə möhtəviyyatında turşuluq hansı üsulla təyin edilir?

A) Atsedotest, Tuqolukova
B) Desmoid sınağı Mixayles
C) Mixayles, Tepffer
D) Atsedotest, Sali üzrə desmond sınağı
E) Tepffer, Qastrotest

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 48, 49 С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 74-75

176) Sərbəst xlorid turşusu normada mədə şirəsində nə qədər olur?

A) 80-90 mmol/l
B) 20-40 mmol/l
C) 10-25 mmol/l
D) 65-75 mmol/l
E) 60-70 mmol/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 40-41

177) Normada mədə şirəsində birləşmiş turşuluq nə qədər olur?

A) 25-40 mmol/l
B) 70-80 mmol/l
C) 10-20 mmol/l
D) 60-70 mmol/l
E) 40-60 mmol/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 40-41

178) Atrofiya nədir?

A) Qeyri-adi lokallaşma xüsusiyyətidir

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Ödün bağırsaqlara daxil olmaması və ya azalmasıdır
C) Mədə möhtəviyyatında sərbəst xlorid turşusunun olmamasıdır
D) Orqan və toxumanın həcminin, kütləsinin kiçilməsi ilə yanaşı onların funksiyasının zəifləməsi və ya dayanmasıdır
E) Biopsiya yolu ilə götürülmüş materialdır

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 Səh 151

179) Normada mədə şirəsində turşu qalığı nə qədər olur?

A) 25-35 mmol/l
B) 40-45 mmol/l
C) 2-10 mmol/l
D) 20-25 mmol/l
E) 25-40 mmol/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 40-41

180) Mədənin selikli qişasında şirə ifraz edən hansı vəzlər var?

A) Kardial, limfotik
B) Fundal, limfotik
C) Kardial, piy
D) Fundal, pilorik, kardial
E) Piloris, pankreas

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 37 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 46

181) Mədənin selikli qişasında şirə ifraz edən hansı hüceyrələr var?

A) Büzmə, epitel, toskun
B) Əsas, histosit, endotel
C) Büzmə, əsas, əlavə
D) Tosqun, büzmə, plazmatik
E) Əzələ hüceyrəsi, fibroplast

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 37

182) Mədə möhtəviyyatı hansı təkmilləşdirilmiş üsulla alınır?

A) Fraksion üsulla
B) Punksiya ilə
C) Cərrahi yolla
D) Qusdurmaqla
E) Birdəfəlik üsulla

sırf kaz ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 42 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 53-55

183) Mədə şirəsində süd turşusu hansı üsulla təyin olunur?

A) 0,1 n. HCl titirləməklə
B) Tepffer üsulu ilə
C) Tuqolukova üsulu ilə
D) 0,1 n. NaOH titirləməklə
E) Uffelman üsulu ilə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 45-46 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 60

184) Mədə möhtəviyyatında fermentativ aktivlik hansı üsulla təyin edilir?

A) Atsedotest üsulu
B) Tuqolukova üsulu
C) Mixayles üsulu
D) Uffelman üsulu
E) Desmond sınaq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 46 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 60-62

185) Axlorhidriya nədir?

A) Sərbəst HCl çoxalması
B) Mədə şirəsində HCl-un çoxalması
C) Pepsinin olmaması
D) Mədə şirəsində HCl olmaması
E) Süd turşusunun olmaması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 40 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 48

186) Axiliya nədir?

A) Mədə şirəsində süd turşusunun artması
B) Mədə şirəsində süd turşusunun olmaması
C) Mədə şirəsində pepsinin və HCl-un olmaması
D) Mədə şirəsində pepsinin və HCl-un azalması
E) Mədə şirəsində pepsinin və HCl-un çoxalması

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 40 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 48

187) Normada mədə şirəsinin fiziki xassələri?

A) Aseton qoxulu, rəngsizdir
B) Qoxusuz, rəngsiz mayedir
C) Qoxusuz, pas rənglidir
D) Pis qoxulu, bulanlıq mayedir
E) Bulanlıq mayedir, aseton qoxuludur

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 SƏH 39 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 SƏH 46

188) Normada mədə şirəsinin pH nə qədərdir?

A) pH-1,5-2,5
B) pH-3,5-4,5
C) pH-4,5-5,0
D) pH-5,5-6,0
E) pH-6,0-6,5

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 39 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 SƏH 46

189) Normada 1 sutka ərzində nə qədər mədə şirəsi ifraz olunur?

A) 4,5-5,0 1
B) 3,0-4,0 l
C) 3,0-3,5 1
D) 2,0-2,5 1
E) 3,8-4,0 1

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 39 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 47

190) Qastromukoprotein hansı vitaminin sorulmasında iştirak edir?

A) Vitamin A
B) Vitamin K
C) Vitamin PP
D) Vitamin B12
E) Vitamin C

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 39 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 47

191) Mədə şirəsindəki qeyri-proteolitik ferment hansıdr?

A) Qastromukoprotein
B) Tripsin
C) Lipaza
D) Qastrin
E) Pepsin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 39 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 47

192) Süd turşusu mədə şirəsinin hansı payında təyin edilir?

A) Bazoa sekresiyanın 45/-60/ dəqiqədən sonrakı payında
B) Bazal sekresiyanın ac qarına payında
C) Bazal sekresiyanın 15/-30/ dəqiqədən sonrakı payında
D) Stimulaedici sekresiyadan sonra
E) Histamin iynəsi vurulduqdan sonra

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 45

193) Mədə şirəsində proteolitik ferment hansıdır?

A) Lipaza, peptidaza
B) Pepsin, renin, qastrin
C) Tripsin, fosfataza
D) İnsulin, aminpeptidaza
E) Ximotripsin, amilaza

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 39 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 47

194) Normada “B” öd payının rəngi necədir?

A) Sarı-qırmızı
B) Yaşıl-göy
C) Sarı-yaşıl
D) Yaşıl-palıdı
E) Qırmızı-qara

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 51, 52 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 63

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

195) Normada “B” öd payının xüsusi çəkisi necədir?

A) 1,010-1,018, qələvi
B) 1,014-1,020, neytral
C) 1,016-1,032, qələvi
D) 1,010-1,012 amfoter
E) 1,06-1,08, turş

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 51, 52 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 63

196) Normada 12 barmaq bağırsaq möhtəviyyatının “A” payının mikroskopik müayinəsində təsadüf olunan elementlər hansılardı?

A) Yağ turşuları kristalları, leykosit, eritrosit
B) Maya göbələkləri, eritrositlər
C) Çoxlu miqdarda epitel, bilrubin kristalı
D) Epitel (az miqdarda), tək-tək leykosit
E) Parazitlər, maya göbələyi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 52 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 65-66

197) 12 barmaq bağırsaq möhtəviyyatının alınmasında istifadə olunan qıcıqlandırıcılar hansılardır?

A) NaCl, bitki yağı
B) 33%-i $MgSO_4$, pepton
C) Şorbit, $MgSO_4$, NaCl
D) NaCl, bitki yağı, şorbit
E) Xörəkduzu, bitki yağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 50 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 63

198) Öd yolarının iltihabı xəstəliklərində mikroskopik müayinə zamanı hansı elementlər görünür?

A) Xolesterin kristalı, yağ turşusu, leykosit
B) Epitel hüceyrəsi, xolesterin, selik
C) Çoxlu miqdarda leykosit, epitel hüceyrəsi, selik və makrofaq
D) Epitel hüceyrələri, bilirubin kristalı
E) Az miqdarda epitel hüceyrəsi, bilurubin kristalı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 52 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 65-66

snskaz.odənişsiz istifadə üçün

199) 12 barmaq bağırsaq möhtəviyyatında hansı parazitlərə rast gəlmək olar?

A) Maya göbələyi, sarsinlər
B) Trixomanada, askarida
C) Tükbaş qurd, lyəmbliya sist,
D) Lyambliya sist, toksoplazma
E) Lyambliyanın vegetativ formasına, qurd yumurtalarına

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 53 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 66

200) Öd çatışmazlığı zamanı nəcisin rəngi necə olur?

A) Ağ gil rəngində
B) Sarı-qəhvəyi
C) Palıdı- qırmızı
D) Formalaşmış, palıdı
E) Qəhvəyi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 63 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 72

201) 12 barmaq bağırsaq möhtəviyyatı hansı zondla və üsulla götürülür?

A) Nazik zondda, çox dəfəlik üsul
B) Duodenal zondla 1 fazalı üsul
C) Nazik zondla, birdəfəlik üsul
D) Yoğun zondla, birdəfəlik üsul
E) Duodenal zondla fraksion üsul

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 50, 51 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 62-64

202) Öd saatda və sutkada neçə ml ifraz olunur?

A) Saatda 15 ml, sutkada 100-150 ml
B) Saatda 15 ml, sutkada 250-300 ml
C) Saatda 50 ml, sutkada 800-1000 ml
D) Saatda 10 ml, sutkada 200-250 ml
E) Saatda 25-30 ml, sutkada 300 ml

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 51, 52 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 64

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

203) Ödün kimyəvi müayinəsinin təyininə aiddir?

A) Bilrubinin, şəkərin təyini
B) Şəkərin, xolesterinin təyini
C) Bilurubinin, xolesterinin, fermentlərin təyini
D) Zülalın, bilrubinin, insulinin təyini
E) Zülalın, şəkərin təyini

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 52 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 65

204) Nəcisin rənginə təsir edən amillər hansıdır?

A) Ekzogen, endogen amil
B) Mexaniki faktor
C) Ekzogen, antigen
D) Sinir-humoral amil
E) Endogen, mexaniki amil

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 54 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 67, 68

205) Hansı xəstəlik zamanı nəcisin rəngi ağ və formalaşmamış olur?

A) Virus hepatiti
B) Kolit
C) Enterit
D) Qastrit
E) Hemolitik anemiya

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 63 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 68

206) Nəcisin rənginə təsir edən endogen amil hansıdır?

A) Qarışıq qidalanma
B) Sterkobilin
C) Süd məhsulları
D) Bitki qidaları
E) Ətli qida

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 54 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 68

207) Hansı halda nəcisin rəngi qara olur?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Pankriatit zamanı
B) Viruslu toksiki hepatit
C) Sulfonilamil preparatı qəbul etdikdə
D) Aplastik anemiya
E) Gizli qanaxma, dəmir preparatı qəbul etdikdə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 54 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 68

208) Nəcisdə öd piqmenti hansı üsulla təyin edilir və hansı rəng alınır?

A) Amidopirin, çəhrayi-yaşıl
B) Şmid, çəhrayı-qırmızı
C) Zənginləşdirmə üsulu, qırmızı
D) Şmid, sarı-yaşıl
E) Benzidin, yaşıl-sarı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 61 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 77

209) Nəcisdə gizli qanaxma hansı üsulla təyin edilir?

A) Nativ preparat – rəngsiz
B) Benzidin-göy, Şmid-sarı
C) Benzidin, amidopirin, ekspres-test
D) Trebule-Vişniyakov, qırmızı
E) Şmid, sarı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 60 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 105-106

210) Nəcisdə yağ turşuları metilen abısı ilə hansı rəngə boyanır?

A) Göy
B) qırmızı rəngə
C) Palıdı(qəhvəyi)
D) Yaşıl rəngə
E) Narıncı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 56

211) Nəcisdə neytral yağlar hansı boyaqla boyanır?

A) Brillyant krezil abısı
B) Metilen göyü

ensk az ödənişsiz istifadə üçün

C) Sudan III boyağı
D) Brillyant krezilin yaşılı
E) Neytral qırmızı boyağı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 56

212) Sudan III boyağı ilə boyanmış nəcis preparatında neytral yağlar hansı rəngə boyanır?

A) Palıdı, göy
B) Göy, sarı
C) Qırmızı, narıncı
D) Yaşıl, palıdı
E) Sarı, qonur

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 56

213) Kaproloji müayinədə lüqol məhlulundan hansı məqsəd üçün istifadə olunur?

A) epitel və eritrositləri aşkar etmək
B) yağ turşularını aşkar etmək
C) əzələ lifləri və nişastanı aşkar etmək
D) neytral yağları aşkar etmək
E) Leykositləri aşkar etmək

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 55, 56

214) Amidopirin sınağı ilə nəcisdə gizli qanaxmanı təyin etdikdə hansı reaktivdən istifadə olunur?

A) HCl, amidopirin, 6%-li H_2O_2
B) Buzlu sirkə turşusu, amidopirinin, 3% -li H_2O_2
C) H_2SO_4, efir, buzlu sirkə turşusu
D) Buzlu sirkə turşusu, H_2O_2, $KmnO_4$
E) H_2O_2, amidopin, benzidin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 61

215) Nəcisdə gizli qanaxma olarsa amidopirin sınağında hansı rəng alınır?

A) Yaşıl
B) Qırmızı
C) Bənövşəyi
D) Sarı
E) Ağ

sınaq ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 60 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 105-106

216) Gizli qanaxmanı müəyyən etmək üçün qidalanmada hansı qaydaya əməl edilməlidir?

A) 3-5 gün ərzində maye qəbul edilmir
B) 2-3 gün ərzində mal əti qəbul edilir
C) 3-5 gün müddətində ət məhsulları, balıq, yumurta qəbul edilmir
D) 2-3 gün balıq, yumurta qəbul edilir
E) 4-5 gün ərzində dəmir preparatları qəbul edilir

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 60-61 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 76

217) Nəcisdə zülal hansı üsulla təyin edilir?

A) Amidoprin
B) Şmid sınağı
C) Benziden
D) Amidopirin
E) Tribule-Vişniyakov

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 61 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 77, 78

218) Normada nəcisdə bağırsaq qışası elementləri hansılardır?

A) Az miqdarda selik, leykosit və epitel hüceyrələri
B) Eritrosit, nişasta, bitki sellülozu
C) Əzələ lifləri, birləşdirici toxuma, bədxassəli şiş hüceyrəsi
D) Çoxlu miqdarda selik, leykosit və yağ turşuları
E) Çoxlu miqdarda selik, neytral yağ dənəciyi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 55 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 71

219) Normada nəcisdə hansı qida qalıqları olur?

A) Çoxlu nişasta, neytral yağlar
B) Az miqdarda əzələ lifləri, yağ turşuları
C) Neytral yağlar, əzələ lifləri
D) Yodofil flora, çoxlu əzələ lifləri
E) Birləşdirici toxuma, yağ turşuları

ensiklopedik istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 55 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 71

220) Nəcisdə aşkar edilən yağ turşuları hansı boyaqla boyanır və nə rəng alınır?

A) Hemotoksilinlə qırmizi rəngə boyanır
B) Metilenlə göy rəngə boyanır
C) Sirkə turşusu ilə sarı rəngə boyanır
D) Brilyant yaşılı və qırmızı neytralla boyanmır
E) Sudan III-lə narıncı rəngə boyanır

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 56 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 71

221) Həzm sisteminin müayinəsi zamanı nəcisdən hansı preparatlar hazırlanmalıdır?

A) Yalnız lüqolla boyanmış preparat
B) Yalnız qleserinlə qarışdırılmış preparat
C) Yalnız nativ preparat
D) Nativ, Sudan III, metilen göyü, Lüqolla boyanmış preparat
E) Romanovski preparatı ilə boyanmış preparat

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 54, 55 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 95, 96

222) Nəcisin müayinəsində sudan III boyağının tərkibi hansı maddələrdən ibarətdir?

A) Sudan III, spirt, buzlu sirkə turşusu
B) Sudan III, neytral qırmızı, distillə su
C) Sudan III, eozin, spirt
D) Sudan III, metilen abısı, spirt
E) Sudan III, distillə su, spirt

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 54, 55 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 95, 96

223) Nəcisin mikroskopik müayinəsinin kliniki əhəmiyyəti nədir?

A) Qan yaranmanın pozulmasını öyrənmək
B) Həzm sistemindəki prosesləri öyrənmək, helmintoloji müayinə aparmaq
C) Göbələk xəstəliklərin aşkar edilməsi
D) Dəri-zöhrəvi xəstəliklərinin aşkar edilməsi
E) İfrazat sistemindəki dəyişkənliyi öyrənmək

Şəxsi istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 53 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 69

224) Normada subaraxnoidal boşluqda nə qədər onurğa beyni mayesi olur?

A) 10-15 ml
B) 20-40 ml
C) 80-100 ml
D) 40-80 ml
E) 100-150 ml

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 64 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 97, 98

225) Onurğa beyin mayesinin fiziki xassələri hansılardır?

A) Xüsusi çəkisi və sitozun təyini
B) Bilirubinin, xloridlərin təyini
C) Rəngi, şəffaflığı, xüsusi çəkisinin təyini
D) Rənginin, xolesterinin təyini
E) Şəffaflığın və sitoqrammanın təyini

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 65

226) Onurğa beyin mayesi (O.B.M.) müayinəsində Pandi reaktivinin tərkibi?

A) 10 q karbol turşusu, 1 l distillə suyu
B) 100 q karbol turşusu, 1 l distillə suyu
C) 85 q ammonium sulfat, 100 l distillə suyu
D) 100 q sulfosalisil, 1 l distillə suyu
E) 85 q ammonium sulfat, 100 ml distillə suyu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 67

227) Nonne-Apelt sınağında istifadə olunan reaktiv hansıdır?

A) Doymuş ammonium oksalat məhlulu
B) Doymuş natrii xlor məhlulu
C) Doymuş ammonium sulfat məhlulu
D) Doymuş karbol turşusu məhlulu
E) Doymuş ammonium sitrat məhlulu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 67

snsk.az-dən icazəsiz istifadə üçün

228) Fuks-Rozental kamerasının həcmi nə qədərdir?

A) 2,5 mm3
B) 0,9 mm3
C) 1,2 mm3
D) 3,2 mm3
E) 4 mm3

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 69-70

229) Normada onurğa beyni mayesinin fiziki xassəsi neçə olmalıdır?

A) Sarı , bulanlıq xüsusi çəkisi-1,010-1,015
B) Rəngsiz, bulanlıq, xüsusi çəkisi-1,005-1,006, turş
C) Qonur, bulanlıq, xüsusi çəkisi-1,003-1,004, qələvi
D) Rəngsiz, şəffaf, reaksiyası zəif qələvi, xüsusi çəkisi - 1,006-1,007
E) Sarı-şəffaf, xüsusi çəkisi-1,010-1,017

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 65, 66 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 98, 99

230) Onurğa beyin mayesində (OBM) zülalın artmasına nə səbəb olmur?

A) Beyin mədəciklərində eksudatın toplanması
B) Onuğa beyin mayesinin durğunluğu
C) Onurğa beyin mayesində(OBM) sitozun normada olması
D) Onurğa beyin mayesinin sıxılması
E) Beyində şiş hüceyrələrinin parçalanması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 66

231) Uşaqlarda normada onurğa beyni mayesində sitoz nə qədərdir?

A) 25x106/l
B) 50x106/l
C) 500x106/l
D) 30x106/l
E) 7-10x106/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 66 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 100

232) Onurğa beyni mayesində qlobulin reaksiyası hansı üsullarla aparılır?

A) Fuse, Lanq
B) Haynes –Akimov, Rozin

ursk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Nonne-Apelt, Pandi
D) Sitozun təyini
E) Leqal, Lestrad

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 67 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 124, 125

233) Sitoliz nədir?

A) Hüceyrənin parçalanmasıdır
B) Hüceyrənin bazofil boyanmasıdır
C) Hüceyrənin sayılmasıdır
D) Trombositlərin aqqregasiyasıdır
E) Eritrositlərin aqqlütinasiyasıdır

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 Səh 153

234) Onurğa beyni mayesində sitoz nədir?

A) Eritrositlərin sayılması
B) Formalı elementlərrrin diferensiyasiyası
C) Vahid həcmdə hüceyrə elementlərinin sayının təyini
D) Lekoformulanın təyini
E) Sitoqrammanın təyini

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 66 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 100

235) Onurğa beyni mayesində formalı elementlər götürüldükdən nə qədər keçdikdən sonra sayılır?

A) 2 saat keçdikdən sonra
B) 1 sutkadan sonra
C) 1 saat keçdikdən sonra
D) 2-3 saat keçdikdən sonra
E) Alınan kimi sayılmalıdır

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 100

236) Onurğa beyni mayesində (OBM) leykositləri kamerada saydıqda reaktivlə mayenin nisbəti necə olmalıdır?

A) 1 dam. reaktiv 1 dam. OBM
B) 1 mil. reaktiv 10 dam. OBM
C) 1 dam. reaktiv 10 dam. OBM

Sırf az öyrənişsiz istifadə üçün

D) 1dam. reaktiv 15 dam. OBM
E) 10 dam. reaktiv 20 dam. OBM

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 69 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 120

237) Normada onurğa beyin mayesində (O.B.M.) zülalın miqdarı nə qədər olur?

A) 0,4-0,5 q/l
B) 0,6-0,7 q/l
C) 0,15-0,3 q/l
D) 0,7-0,8 q/l
E) 0,5-0,6 q/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 66 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 120

238) Onurğa beyin mayesində (O.B.M.) normada şəkər nə qədərdir?

A) 5,0-6,0 mmol/l
B) 4,1-5,9 mmol/l
C) 1,5-1,6 mmol/l
D) 1,0-2,0 mmol/l
E) 2,8-3,9 mmol/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 66 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 120

239) Onurğa beyin mayesində (O.B.M.) normada xloridlər nə qədərdir?

A) 230-250 mmol/l
B) 195-215 mmol/l
C) 220-230 mmol/l
D) 60-90 mmol/l
E) 240-260 mmol/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 66 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 120

240) Transsudatda zülal nə qədər olur?

A) 55-60 q/l

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 50-55 q/l
C) 5-25 q/l
D) 35-45 q/l
E) 30-80 q/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 111

241) Eksudatın xüsusi çəkisi nə qədərdir?

A) 1,006-1,008
B) 1,010-1,012
C) 1,005-1,009
D) 1,010-1,011
E) 1,018-1,022

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121

242) Aspirasiya nədir?

A) Fiziki-kimyəvi proseslərin gedişatını dayandıran maddədir
B) Hüceyrələrin müxtəlif boyanmasıdır
C) Müxtəlif hissəciklərin bir-birinə yapışması və qruplaşmasıdır
D) Boşluğun və ya patoloji ocağın möhtəviyyatının sorulmasıdır
E) Hüceyrələrin bir-birinə yapışıb çökməsidir

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 150

243) Eksudat hansı xarakterli ola bilər?

A) Seroz, hemorragik, çürümüş
B) Selikli, selikli-irinli
C) Selikli-irinli, çürümüş
D) Selikli-irinli-qanlı
E) Hemorragik, bulanıq, qatı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121

244) Eksudatlar hansı rənglərdə ola bilər?

A) Qara, qırmızı, mavi
B) Göy, mavi, sarı
C) Sarı, qonur, çəhrayı, ağ
D) Mavi, qəhvəyi, qara
E) Ağ, qara, göy

simkaz ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121

245) Aşağıdakılardan hansılar süzülmüş mayelərin fiziki xassələrinə aiddir?

A) Zülalın və hüceyrə elementlərinin təyini
B) Rivalt sınağı, xarakteri
C) Xarakteri, rəngi, xüsusi çəkisi
D) Qoxusu, zülülın təyini
E) Rəngi, hüceyrə elementlərinin sayılması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 120-121

246) İltihabi proses nəticəsində seroz boşluqlara toplanan maye necə adlanır?

A) Eksudat
B) Qovuqçuğa toplanan maye
C) Süzülmüş maye
D) Transudat
E) İfraz olunan maye

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 120 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 109

247) Polinuklear hüceyrə hansıdır?

A) Bir neçə nüvəsi olan hüceyrə
B) Bir nüvəsi olan hüceyrə
C) Nüvəsi boyanmayan hüceyrə
D) Nüvəsiz hüceyrə
E) Qələvi boyaq qəbul edən hüceyrə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 152

248) Transsudat hansı xarakterli olur?

A) Yalnız irinli
B) Yalnız çürümüş
C) Yalnız seroz
D) Yalnız qanlı
E) Yalnız heliozlu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121

249) Transudat hansı rəngdə olur?

snskaz ödənişsiz istifadə üçün

A) Qırmızı, qonur
B) Qonur, yaşıl
C) Çəhrayı, qırmızı
D) Sarı, qızılı sarı
E) Ağ, sarı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121

250) Transudatın xüsusi çəkisi nə qədərdir?

A) 1,018-1,022
B) 1,018-1,020
C) 1,006-1,012
D) 1,020-1,025
E) 1,025-1,030

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121

251) Rivalt sınağında hansı reaktivdən istifadə olunur?

A) Sulfosalisil turşusu
B) Xlorid turşusu
C) Qatı sirkə turşusu
D) Sulfat turşusu
E) Nitrat turşusu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 124

252) Eksudatda zülal nə qədər olur?

A) 90-95 q/l
B) 45-50 q/l
C) 15-20 q/l
D) 10-15 q/l
E) 30-80 q/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 111

253) Eksudatın hüceyrəvi elementləri hansılardır?

A) Limfosit, mezotel hüceyrə
B) Makrofaq, limfosit
C) Leykosit, plazmatik hüceyrə, poliblast, makrofaq
D) Mezotel hüceyrə, makrofaq

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Şiş hüceyrə, eozinofil

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 121

254) Transudatın hüceyrəvi elementləri hansılardır?

A) Neytrofil, makrofaq
B) Limfosit, mezotel hüceyrə
C) Poıiblast, plazmatik
D) Makrofaqlar, poliblastlar
E) Plazmatik, poliblast

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 123 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 113, 114

255) Eksudat və transsudatı diferensasiya edən sınaq hansıdır?

A) Lanq, Fuşe
B) Haynes, Lanq
C) Rozin, Lanq
D) Rivalt, Luker
E) Rozin, Qram

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 124

256) Bəlğəmin tərkibi nədən aslıdır?

A) Dərman preparatlarının qəbulundan
B) Qida qəbulundan
C) Nəfəs almadan
D) Tənəffüs yollarındakı patoloji prosesdən
E) Ağ ciyərin hava tutumundan

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 125 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 81, 82

257) Hansı xəstəlikdə yalnız selikli bəlğəm ifraz olunur?

A) Ağciyər absesində, bronxitdə
B) Ağciyərin qanqrenasında, vərəmdə
C) Bronxitdə, ağciyər vərəmində
D) Bronxoektozda, bronxitdə
E) Kəskin bronxit, bronxial astma

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 26

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

258) Bəlğəmdə atipik hüceyrələrə hansı xəstəlikdə təsadüf olunur?

A) Traxeitdə, krupoz pnevmoniyada
B) Bronx və ağciyərin şişində
C) Ağciyər vərəmində, bronxitdə
D) Pnevmoniyada, bronxial astmada
E) Kəskin bronxitdə, bronxo pnevmoniyada

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 130 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 101

259) Qanlı bəlğəm hansı xəstəliklərdə olur?

A) Farengitdə
B) Kəskin bronxitdə
C) Bronxial asmada
D) Ağciyər vərəmində
E) Traxeitdə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 125, 126 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 82, 83

260) Bəlğəm hansı xəstəlikdə 3 təbəqəyə bölünür?

A) Xroniki bronxitdə
B) Pnevmoniyada
C) Bronxoektaziyada
D) Kəskin bronxitdə
E) Bronxial asmada

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 126 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 83

261) Bəlğəmin sarı-yaşılımtıl olmasına nə təsir edir?

A) Kurşman spiralı
B) Toz eritrosit
C) Leykosit-irin
D) Eritrosit-qan
E) Selik-epitel

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 126 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 83

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

262) Çürümüş qoxulu bəlğəm hansı xəstəlikdə olur?

A) Traxeitdə
B) Pnevmoniyada
C) Bronxitdə
D) Ağciyərin qanqrenasında
E) Plevritdə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 126 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 83

263) Bronxial astma xəstəliyində hansı elementlərin olması xarakterikdir?

A) Silindirik epitel, yastı epitel, leykosit
B) Kurşman spiralı, elastiki bifler
C) Sarko-Leyden kristalları, makrofaqlar
D) Kurşman spiralı, eozinofil, Sarko-leyden kristalı
E) Hematoidin kristalı, Neytrofil

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 130 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 89

264) Hansı ardıcılıqla bəlğəm Sil-Nelsen üzrə boyanır?

A) Yaxma üzərinə Silin karbolfuksini tökülür, yuyulur, metilen göyü tökülür
B) Yaxma üzərinə metilen abısı, karbol fuksin tökülür və yuyulur
C) Yaxma fiksə edilir, metilen abısı tökülür, rəngsizləşir və fuksinlə boyanır
D) Yaxma fiksə edilir, Silin karbolfuksin tökülür, rəngsizləşir, metilin abısı ilə boyanır
E) Yaxma üzərinə süzgək kağızı qoyulur, metilin abısı tökülür

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 134 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 115, 116

265) Bəlğəmdə Erlix tetradası hansı elementlərdən təşkil olunub?

A) Kirəcləşmiş elastiki liflərdən, xolesterin kristalından, vərəm çöplərindən, detritdən
B) Slindirik epiteli, leykosit, eritrosit, xolisterin kristalı
C) Şiş hüceyrələri, alveol makrofaqları, hemotoidin kristalı
D) Epitel hüceyrəsi, vərəm çöpləri, Şarko-Leyden kristalı, göbələk
E) Hemotoidin kristalı, xolesterin, detrit, epitel hüceyrəsi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 129 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 88

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

266) Bəlğəmdə vərəm çöpləri hansı üsulla aşkar edilir?

A) Qram üzrə boyanmış preparatın mikroskopiyasında
B) Sil-Nilsen üsulu ilə boyanmış preparatın mikroskopiyasında
C) Romanovski üzrə boyanmış yaxmanın müayinəsi
D) Nativ preparatın mikroskopiyasında
E) Yaxmanın sitoloji müayinəsində

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 134 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 122

267) Bəlğəm kimyəvi üsulla necə zərərsizləşdirilir?

A) Kanalizasiyaya tökmək
B) 0,5 saat müddətində xlorlu əhəngdə saxlamaq
C) 2 saat 3% xloromin məhlulunda saxlamaq
D) 1 saat müddətində sodalı suda saxlamaq
E) 4 saat müddətində ammonium xlorid və xloramin töküb saxlamaq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 132 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 91

268) Hemosidrinin təyini üçün istifadə olunan reaktivlər hansılardır?

A) 2%-li metilen göyü, 1%-li H_2SO_4
B) Sudan III, 0,1n NaCl
C) 5%-li kalium ferrosianid, 2%-li HCl
D) 1% kalium ferrosianid, 1% H_2SO_4
E) Spirt,1%-li metilen abısı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 133

269) Hansı halda bəlğəmdə hemosidrin reaksiyası müsbət olur?

A) Xroniki bronxitdə
B) Səs tellərinin iltihabında
C) Bronxların sıxılmasında
D) Kiçik qan dövranı-ağ ciyər durğunluğunda
E) Bronxial astma tutmalarında

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 127 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 93

270) Sil-Nilsen üzrə boyamada hansı reaktivlərdən istifadə olunur?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Karbol turşusu, HCl, H2SO4
B) Əsasi fuksin, karbol, HCl, metilen göyü
C) Gension violet, spirt, brilliant yaşıl
D) Fuksin, spirt, kristal violet
E) Metilen göyü, karbol turşusu, HNO3

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 134 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 94 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 122-123

271) Sil-Nilsen üzrə boyamada vərəm mikobakteriyaları necə görünür?

A) Oval, qrup yığımında – yaşıl
B) Azca əyilmiş, incə çubuq şəkilli– qırmızı
C) Uzunsov, kobud şəkilli – bənövşəyi
D) Girdə, çubuq şəkilli – göy
E) Diplokokk şəkilli-yaşıl

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 134 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 94

272) Bəlğəmdə Klepsiel çöpləri Qram üzrə boyanmada necə görünür?

A) Yoğun, kapsulasız – göy
B) Kapsula ilə əhatə olunmuş, yoğun çəhrayi rəngli
C) Əyilmiş, kofe şəkilli – sarı
D) İncə, nazik – qara
E) Kokşəkilli - göy rəngdə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984

273) Mozayka şəkilli mitsellər hansı göbələk üçün xarakterikdir?

A) Kandidalar
B) Epidermofiton
C) Mikrospor
D) Trixofiton
E) Penisilioz

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 137

274) Dəri-göbələk xəstəliyində preparat hazırladıqda ən çox nə üçün qələvidən istifadə olunur və qızdırılır?

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Eritrositləri parçalamaq üçün
B) Piqmentləri rəngsizləşdirmək üçün
C) Epitelləri parçalamaq üçün
D) Leykositləri parçalamaq üçün
E) Boyağı rəngsizləşdirmək üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 136 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 147, 148

275) Cinsiyyət orqanları ifrazatının müayinəsi hansı məqsəd üçün aparılır?

A) Sidik ifrazat xəstəliklərinin aşkarı
B) Dəri xəstəliklərinin aşkarı
C) Hormonoloji sitodiaqnostika, zöhrəvi xəstəliklərin aşkarı
D) Sistem xəstəliklərinin aşkarı
E) Hormonoloji xəstəliklərin aşkarı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 139 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 131

276) Yumurtalıqların funksional vəziyyətini öyrənmək üçün uşaqlıq yolu ifrazatı necə götürülməlidir?

A) Uşaqlıq yolundan pambıq tamponla
B) Uşaqlıqdan-katetr ilə
C) Uşaqlıq yolundan steril tənziflə
D) Uşaqlıq boynundan pinsetlə
E) Uşaqlıq yolunun yan arxa tağından folkman qaşığı ilə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 139 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 132

277) Sitoloji müayinədə (yumurtalığın funksional vəziyyəti) hansı boyama üsulundan istifadə olunur?

A) Metilen abısı ilə
B) Papanheyim üsulu
C) Romanovski boyağı
D) Noxt üsulu
E) Monoxrom, polixrom boyamadan

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 139 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 132

Ensk öz öyrənişsiz istifadə üçün

278) Qadınlarda qonoreya zamanı müayinə material haradan götürülür?

A) Uretradan, sidik kisəsindən
B) Vaginadan, dəridən.
C) Düz bağırsaqdan, barmaqdan
D) Sidik kisəsindən
E) Uretradan, vaginadan, servikal kanaldan

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 143 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 136, 137

279) Qonoreyanı aşkar etmək üçün hansı müasir üsuldan istifadə olunur?

A) Eozin və metilen abısı ilə boyanma
B) Metilen abısı ilə boyanma
C) Romanovski üsulu ilə boyanma
D) İFA – immunfermentanaliz, kart-test
E) Qram üsulu ilə boyanma

Ədəbiyyat: В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 136, 137

280) Qonokokkun quruluşu necədir?

A) Spiral şəkillidir
B) Çöp şəkillidir
C) Diplokokklardır, arasında yarıq görünür
D) Tək-tək kokklardır
E) Tay şəkillidir

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 144 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 138

281) Trixomonadın hərəkətli forması hansı preparatda aşkar edilir?

A) Yaxmada mikroskopda
B) Boyaqlı preparatda mikroskopda
C) Makroskopik müayinədə
D) Fiksə edilmiş preparatda mikroskopda
E) Mikroskopla nativ preparatda

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 144 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 138-139

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

282) Trixomonadın quruluşu necədir?

A) Kok şəkilli
B) Uzunsov, kirpikli
C) Yumru, qamçısız
D) Dördbucaqlı, qamçısız
E) Armudvari, 4 ədəd qamçısı var

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 153 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 139

283) Siflis xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

A) Solğun triponema
B) Trixomonad
C) Spiroxeta
D) Virus
E) Xlamidiya

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 145 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 140, 141

284) Solğun spiroxet hansı quruluşdadır?

A) Spiral şəkilli, buruqsuz
B) Diplokokk şəkilli
C) Spiral şəkilli, 8-14 buruqlu
D) Spiral şəkilli, 15-20 buruqlu
E) Çöp şəkilli, buruqsuz

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 əh 145 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 140, 141

285) Siflisin törədicisi Romanovski üzrə boyanmış preparatda hansı rəngdə olur?

A) Al qırmızı
B) Palıdı(qəhvəyi)
C) Göy
D) Çəhrayı
E) Qara

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 146 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 141

snskaz.edənişsiz istifadə üçün

286) Siflisin diaqnostikasında hansı təkmilləşdirilmiş üsuldan istifadə olunur?

A) Neqativ üsuldan
B) Boyaqlı preparatlardan
C) Nativ preparatdan
D) Pozitiv üsuldan
E) Kompleks seroloji reaksiyalardan

Ədəbiyyat: В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 142

287) Siflisin diaqnostikasında müayinə materialı hansılardır?

A) Toxuma mayesi, qan, O.B.M.
B) Dəridən götürülmüş material
C) Sidik, boşluq mayesi
D) Limfa mayesi, bəlğəm
E) Sidik, qan

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 145 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 140

288) Siflislə yoluxmanın qarşısını almaq, təxirə salınmaz dezinfeksiya üçün hansı maddədən istifadə olunur?

A) Xlorlu əhəng, HCl
B) Civə xlorid, fenol
C) Xloramin, NaCl
D) Spirt, distillə su
E) NaCl, spirt

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 145 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 140

289) Yumşaq şankrn törədicisi hansı üsulla aşkar edilir?

A) Eozinlə
B) Romonovski
C) Metilen abısı ilə
D) Qram
E) Monoxom boyanma

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 146 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 142

snsq.az ödənişsiz istifadə üçün

290) Yumşaq şankr törədicisi - Dukreya-Petersen streptobasilləri hansı üsulla boyanır?

A) Maya-Qrunvald
B) Qram üzrə
C) Sil-Nelsen üzrə
D) Brilliant-krezilin boyağı
E) Turş eozinlə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 146 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 142

291) Sağlam uşaqlıq yolu selikli qişasında hansı hüceyrələr olmalıdır?

A) Trixomonad, epitel, çoxlu leykositlər
B) Dederleyn çöpləri az-az, çoxlu leykositlər
C) Stafilokokk, streptokokk, çoxlu epitellər
D) Yastı epitel, çoxlu Dederleyn çöpləri, tək-tək leykosit
E) Qonokokk, Dederleyn çöpləri

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 146 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 142, 143

292) Uşaqlıq yolunun neçə təmizlik dərəcəsi var?

A) 3
B) 6
C) 4
D) 5
E) 1

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh səh 147 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 142, 143

293) Uşaqlıq yolunun sanitarı hansıdır?

A) Kox çöpü
B) Epiteli hüceyrələri
C) Dederleyin çubuğu
D) Stafilokokk
E) Qram mənfi çöplər

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 146, 147. В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим

sinaq az ödənissiz istifadə üçün

занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 142-143

294) Normada eykulyantın pH nə qədərdir?

A) 6,0-6,5
B) 4,5-5,0
C) 7,2-7,6
D) 3,0-5,0
E) 2,0-3,5

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 147 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва «Медицина» 1989 səh 158

295) Eykulyantın fiziki xassələrinə hansılar aiddir?

A) Miqdarı, mikroskopik müayinəsi
B) Spermaqramması, qatılığı
C) Rəngi, morfoloji quruluşu
D) Miqdarı, rəngi, konsistensiyası
E) Kimyəvi müayinəsi, şəffaflığı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 147

296) Alınmış eykulyantın normada sıyıqlaşma müddəti nə qədərdir?

A) 30 dəqiqə
B) 3 saat
C) 1 saat
D) 4 saat
E) 1 dəqiqə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 147 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 143

297) Normada spermanın fiziki xassələri necədir?

A) 6-7 ml, sarı, şəffaf maye
B) 10-12 ml, cəhrayı, bulanlıq maye
C) 0-1 ml, sarı, şəffaf
D) 3-4 ml, azca sarımtıl, bulanlıq özlülü
E) 1-2 ml, ağımtıl, şəffaf, yapışqanlı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 147 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 143, 144

298) Normal spermatozoid hansı ölçüdə olur?

A) 67-72 mkm
B) 58-68 mkm
C) 100 mkm
D) 10-12 mkm
E) 40-50 mkm

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 147 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 144

299) Normal spermatozoid hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Yalnız baş
B) Baş, quyruq
C) Baş, boyun
D) Baş, boyun, quruq
E) Boyun, quyruq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 147 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 144

300) Normal spermatozoidlərin neçə %-i hərəkətli olmalıdır?

A) 15-20%
B) 50-60%
C) 30-50%
D) 80-90%
E) 20-30%

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 149 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 146

301) 5 %-li eozin məhlulu ilə boyandıqda, ölü və diri spermatozoidlər hansı rəngə bayanır?

A) Ölü rəngsiz, diri qırmızı
B) Ölü rəngsiz, diri göy
C) Ölü qırmızı, diri rəngsiz
D) Ölü göy, diri qırmızı
E) Diri qırmızı, ölü göy

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 149 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 146

302) Normada spermada nə qədər spermatozoid olmalıdır?

A) 20-30x106/l
B) 5-10x109/l
C) 100-150x109/l
D) 50-60x109/l
E) 10-15x109/l

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 148 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 145

303) Spermatozoidləri Qoryayev kamerasında saydıqda istifadə olunan reaktivlər hansılardır?

A) HCl, xloramin
B) dəmir xlorid, spirt
C) H2SO4, 20%-li neytral formalin
D) KCl, xlorlu sirkə turşusu
E) Na2CO3, 40%-li neytral formalin

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 148, 149 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 145, 146

304) Spermatozoidlərin sayılması hansı kamerada aparılır?

A) Qoryayev kamerasında
B) Dofel kamerasında
C) Tom kamerasında
D) Rozental kamerasında
E) Fuks-Rozental kamerasında

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 148 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 145, 146

305) Xlamidioz infeksiyasını hansı üsulla daha keyfiyətli aşkar etmək olar?

A) Kardiolipid antigeni ilə
B) Ultra səs müayinəsi ilə
C) Vasselman reaksiyası ilə

sirkəz ödənissiz istifadə üçün

D) Biokimyəvi müayinə ilə
E) İmmunferment, immunoflöresent üsulla

Ədəbiyyat: В.И.Козлова, А.Ф.Пихнер. Вирусные, хламидные и микоплазменные заболевания гениталий. «Филин» 1997 səh 316 Б.И.Зудин .Кожные и венерические болезни. Москва « Медицина» 1990 səh 155, 156

306) PZR- polimiraz zəngirvari reaksiya ilə nəyi aşkar etmək olar?

A) Virusla yoluxmanı, qüsurlu genləri
B) Antigenləri
C) Anti cismləri
D) Formalı elementləri
E) Karbohidratları

Ədəbiyyat: A.M. Əfəndiyev, F.Q. İslamzadə, A.N. Qarayev, A.Ə. Eyyubova . Bioloji kimyadan laboratoriya məşqələləri. Bakı .Təbib. 2008 səh 35-36

307) Sali hemometr pipeti hansı tutuma malikdir?

A) 0,2 ml
B) 0,04 ml
C) 0,4 ml
D) 0,02 ml
E) 0,05 ml

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 82

308) Kliniki analiz üçün hansı qan götürülür?

A) Səhər yeməyindən sonra
B) Nahardan sonra
C) Günün ikinci yarısı
D) Ac qarnına
E) Axşam yeməyindən sonra

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 82 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 129

309) Pançenkov cihazı hansı hissələrdən ibarətdir (E.Ç.S)?

A) Əşya şüşəsi və saat şüşəsi
B) Mikropipet və əşya şüşəsi
C) Pançenkov ştativi və sınaq şüşəsi
D) Aqqlütinasiya sınaq şüşəsi və pipet
E) Pançenkov ştativi və kapilyar borusu

sask.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 87-88

310) Qoryayev kamerasında eritrositləri saymaq üçün hansı həcmdə qan götürülür?

A) 0,02 ml
B) 0,3 ml
C) 0,4 ml
D) 0,2 ml
E) 4 ml

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 84

311) E.Ç.S(eritrositlərin çökmə sürəti)-nin nəticəsi hansı müddətdən sonra qeyd edilir?

A) 20 dəq
B) 25 dəq
C) 60 dəq
D) 15 dəq
E) 80 dəq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 87-88

312) Zəif boyaq qəbul edən eritrositlər necə adlanırlar?

A) Normaxrom
B) Oksofil
C) Polixromatofil
D) Hipoxrom
E) Hiperxrom

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 103

313) Nə vaxt qanda hədəfəbənzər eritrositlər olur?

A) Kəskin posthemorragik anemiyada
B) Aplastik anemiyada
C) Dəmir çatışmazlığında
D) Talassemiyada
E) B12 vitamin çatışmazlığı anemiyasında

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 103

snskaz ödənissiz istifadə üçün

314) Sidiyin Zimnitski müayinəsində xəstəyə neçə qab verilir?

A) 10
B) 5
C) 3
D) 7
E) 8

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13-14

315) Sidiyin xüsusi çəkisinin aşağı olması necə adlanır?

A) Anuriya
B) İzostenuriya
C) Hipostenuriya
D) Dizuriya
E) Hiperstenuriya

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 13-14

316) Şarko-Leyden kristalları nəyin hesabına əmələ gəlir?

A) Eritrositlərin parçalanması
B) Hemoqlobinin parçalanması
C) Trombositlərin aqqreqasiyası
D) Trombositlərin parçalanması
E) Eozinofillərin parçalanması

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 128-129

317) Qan yaxması metil spirtində neçə dəqiqə fiksə olunur?

A) 1 dəq
B) 3 dəq
C) 30 dəq
D) 2 dəq
E) 35 dəq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 89

318) Qan yaxması etil spirtində neçə dəqiqə fiksə olunur?

A) 12 dəq
B) 2 dəq
C) 20 dəq
D) 3 dəq

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 30 dəq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 89

319) Qan yaxmasının boyanması zamanı Romanovski boyağından işçi məhlul hazırladıqda nə ilə durulaşdırılır?

A) Spirtlə
B) Qliserinlə
C) Distillə suyu ilə
D) Xloroformla
E) Efirlə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 89

320) Qan yaxmasında leykositlər neçə hüceyrəyədək sayılır?

A) 50
B) 30
C) 150
D) 100
E) 10

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 89

321) Trombositlər Qoryayev kamerasında neçə böyük kvadratda sayılır?

A) 30
B) 100
C) 25
D) 20
E) 50

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 91

322) Kapilyar laxtalanma müddətinin təyinində lazım olan ləvazimatlar hansılardır.

A) 5 ml pipet, saat
B) Kapilyar boru, saniyə ölçən
C) Sali pipeti, qum saatı
D) Saniyə ölçən, sınaq şüşəsi
E) Kapilyar boru, sınaq şüşəsi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 110

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

323) Trombositlərin Qoryayev kamerasında sayılması zamanı hansı reaktivdən istifadə edilir?

A) 1% natrium xlorid
B) 1% ammonium oksalat
C) Hayema reaktivi
D) 3% buzlu sirkə turşusu
E) 10% natrium xlorid

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 91

324) Trombositləri Qoryayev kamerasında saydıqda nə qədər reaktiv götürülür?

A) 6 ml
B) 5 ml
C) 2 ml
D) 4 ml
E) 1 ml

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 91

325) Qoryayev kamerasında trombositlərin sayılması üçün nə qədər qan götürülür?

A) 0,04 ml
B) 1,0 ml
C) 0,02 ml
D) 0,2 ml
E) 0, 4 ml

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 91

326) Trombositlərin hesablanması zamanı Qoryayev kamerasında sayılmış trombosit praktik olaraq hansı rəqəmə vurulur?

A) 100
B) 50
C) 20
D) 2000
E) 200

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 91

327) Qanda hemoqlobinin təyini zamanı (Sali və ya FEK üsulu) qan nə qədər götürülür?

A) 0,2 ml

Ensiklaz ödənişsiz istifadə üçün

B) 0,1 ml
C) 0,02 ml
D) 0,4 ml
E) 0,04 ml

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 82

328) Qan qruplarının standart zərdabla təyini zamanı hansı görünüş AB0 (IV) qrup olduğunu göstərir?

A) αβ (I) müsbət, β (II) və α (III) zərdabla aqqlütinasiya mənfidir
B) αβ (I), β (II) zərdabla aqqlütinasiya müsbət, α (III) mənfidir
C) αβ (I), β (II) və α (III) qrup zərdabla aqqlütinasiya müsbətdir
D) αβ (I) mənfi, β (II) və α (III) zərdabla aqqlütinasiya müsbətdir
E) αβ (I), β (II) və α (III) qrup zərdabla aqqlütinasiya mənfidir

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 112-114

329) Limbek və Riber üsulu ilə eritrositlərin osmotik davamlılığının təyinatı hansı reaktivdən istifadə olunur?

A) Na sitratın hipotonik məhlulundan
B) 0,1 n natrium hidroksid məhlulundan
C) 0,1 n hidrogen xlorid məhlulundan
D) NaCl hipertonik məhlulundan
E) NaCl hipotonik məhlulundan

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 93-95

330) Sidikdə zülalı təyin etdikdə sidiyin reaksiyası necə olmalıdır?

A) Kəskin qələvi
B) Amfoter
C) Neytral
D) Zəif turş
E) Qələvi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 15 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 11

331) Sidikdə zülalı tətin etdikdə sidik necə olmalıdır?

A) Tam bulanlıq
B) Şəffaf
C) Qanlı

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Selikli
E) Bulanlıq

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 15-16 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 11-12

332) Sidikdə keyfiyyətcə zülal təyin edildikdə neçə sınaq şüşəsi götürülür?

A) 4
B) 5
C) 2
D) 6
E) 3

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 16 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 12

333) 100 ml 20%-li sulfosalisil turşusunu hazırlamaq üçün neçə qram reaktiv götürülür?

A) 40 qr
B) 25 qr
C) 20 qr
D) 45 qr
E) 30 qr

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 16 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 11

334) Althauzen üsulu ilə sidikdə şəkər miqdarca təyin edildikdə neçə ml sidik götürülür?

A) 6,5 ml
B) 4 ml
C) 6 ml
D) 5 ml
E) 5,5 ml

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 21 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 14

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

335) Laborant uçucu maddələrlə işlədikdə müayinə harada aparılmalıdır?

A) Adi şkafda
B) “A” şkafında
C) Adi masa üzərində
D) Sorucu şkafda
E) “B” şkafında

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 5 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 10-11

336) İşlənmiş turşunu nə ilə neytrallaşdırdıqdan sonra əlüzyuyana tökmək olar?

A) Qələvi ilə qarışdırdıqdan sonra
B) Efirlə qarışdırdıqdan sonra
C) Su ilə durulaşdırdıqdan sonra
D) Digər turşu ilə qarışdırdıqdan sonra
E) Formalinlə qarışdırdıqdan sonra

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 5 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 10-11

337) Sidiyin müayinəsinə hansılar aiddir?

A) Fiziki
B) Bakterioloji
C) Bütün sadalananlar düzdür
D) Mikroskopik
E) Kimyəvi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 10-11 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 4

338) Normada təzə ifraz olunmuş sidiyin rəngi necə olur?

A) Qonur-qəhvəyi
B) Qırmızı-sarı
C) Al qırmızı
D) Sarı-samanı
E) Göy-yaşıl

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 12 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 7

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

339) Sidiyin rəngini laborant necə təyin edir?

A) Adi gözlə işıqda baxmaqla
B) Efir damızdırmaqla
C) Qaranlıqda baxmaqla
D) Qələvi tökməklə
E) Su əlavə etməklə

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 12 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 7

340) Sidikdə oksalat duzları olduqda sidik necə şəffaflaşdırırlır?

A) Bakterial filtrindən keçirməklə
B) Süzgəc kağızı ilə süzməklə
C) Efir damızdırmaqla
D) Xlorid turşusu damızdırmaqla
E) Sirkə turşusu damızdırmaqla

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 12

341) Sidiyi 5 dəfə durulaşdırmaq üçün neçə ml sidik və su götürülür?

A) 3 ml sidik, 2 ml su
B) 2 ml sidik, 2 ml su
C) 4 ml sidik, 1 ml su
D) 1 ml sidik, 10 ml su
E) 1 ml sidik, 4 ml su

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 17 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 11

342) Sidikdə zülalın təyinində durulaşma hansı vaxta qədər aparılır?

A) həlqə 2 dəqiqədən gec alınsın
B) həlqə 4 dəqiqədən gec alınsın
C) həlqə 6 dəqiqədən gec alınsın
D) həlqə 7 dəqiqədən gec alınsın
E) həlqə 5 dəqiqədən gec alınsın

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 18

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

343) Rozun sınağını aparmaq üçün neçə %-li yod məhlulundan istifadə olunur?

A) 4%
B) 3,5%
C) 1%
D) 3%
E) 2%

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 25

344) Sidikdə bilirubin olarsa, Rozin sınağı ilə təyin olunduqda hansı rəng həlqə alınır?

A) Yaşıl
B) Qırmızı
C) Göy
D) Boz
E) Çəhrayı

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 24

Bölmə 2. Zülalların kimyası

345) İzotop üsulu ilə hansı proses öyrənilir?

A) Aralıq mübadilə
B) Maddələrin balansı
C) Ayrı-ayrı maddələrin mübadiləsi
D) Enerji mübadiləsi
E) Hidroliz

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.15

346) Maddələrin qarışığını ayırmaq üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Toxuma kəsiklərinin müayinəsi
B) Elektroforez
C) Elektron mikroskopiya
D) Nüvəli maqnit rezonans
E) Yandırılma

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.20

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

347) Maddənin quruluşunun öyrənilməsində istifadə olunan üsul hansıdır?

A) Yandırılma
B) Elektroforez
C) Nüvəli maqnit rezonans
D) İzotop
E) Ultrasentrifuqalaşdırma

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.21

348) Hüceyrə səviyyəsində mübadilə proseslərini öyrənmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

A) İzotop
B) Spektral
C) Homogenizasiya
D) Angiostomiya
E) Elektroforez

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.17

349) Angiostomiya üsulunun köməyi ilə mübadilə prosesləri hansı səviyyədə öyrənilir?

A) Ayrıca maddə
B) Hüceyrə
C) Bütün orqanizm
D) Ayrıca orqan
E) Toxuma

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.17

350) Zülallar orqanizmdə hansı funksiyanı yerinə yetirmirlər?

A) Qoruyucu
B) Energetik
C) Katalitik
D) Ehtiyata toplanmaq
E) Nəqliyyat

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.178-179

351) İnsan orqanizminin bədən kütləsinin 1/5 hissəsini (20%) təşkil edən maddələr hansılardır?

A) Mineral elementlər

tesk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Vitaminlər
C) Su
D) Lipidlər
E) Zülallar

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.23

352) Orqanizmdə oksigen (O2) və karbon (CO2) qazlarını daşıyan zülallar hansılardır?

A) Lipoproteidlər
B) Hemoqlobin
C) Transferrin
D) Albuminlər
E) Retinol

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.24

353) İrsilik funksiyasını yerinə yetirən zülallar hansılardır?

A) Metalloproteidlər
B) Fosfoproteidlər
C) Nukleoproteidlər
D) Xromoproteidlər
E) Qlikoproteidlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.25

354) Osmotik təzyiqin hissəsi olan onkotik təzyiqi yaradan maddələr hansılardır?

A) Su
B) Anionlar
C) Zülallar
D) Vitaminlər, Hormonlar
E) Kationlar

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.25

355) Zülalın tərkibindəki əsas kimyəvi elementlərdən hansı element miqdarca öz sabitliyi ilə fərqlənir?

A) Hidrogen
B) Oksigen
C) Azot
D) Kükürd
E) Karbon

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.25-26

356) Zülalın tərkibinə neçə müxtəlif aminturşu daxildir?

A) 20
B) 200
C) 51
D) 60
E) 9

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.26

357) Monoaminomonokarbon aminturşularının sulu məhlulları hansı reaksiyanı verir?

A) Turş
B) Zəif turş
C) Neytral
D) Zəif qələvi
E) Qələvi

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.27

358) Tsiklik aminturşuların tərkibi atsiklik aminturşuların tərkibindən nə ilə fərqlənir?

A) NH2 qruplarının olması ilə
B) COOH qruplarının olması ilə
C) CH2 qruplarının olması ilə
D) Aromatik nüvənin olması ilə
E) Radikalların olması ilə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.26-2

359) Zülallarda aminturşular bir-biri ilə hansı rabitə vasitəsilə birləşirlər?

A) Disulfid
B) Hidrogen
C) Peptid
D) Kovalent
E) İon

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.31

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

360) Aşağıdakı peptidlərdən hansıları saya əzələlərin yiğılmasını stimulə edir?

A) Oksitosin
B) Enkefalin
C) Qlutation
D) Bradikinin
E) Vazopressin

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.33

361) Aşağıdakı peptidlərdən hansıları qan təzyiqini və böyrəklərdə suyun reabsorbsiyasını artırır?

A) Bradikinin
B) Oksitosin
C) Vazopressin
D) Enkefalin
E) Qlutation

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.33

362) Aşağıdakı peptidlərdən hansılarının təsiri ağrıkəsici kimi narkotiklərin təsirini xatırladır?

A) Vazopressin
B) Enkefalin
C) Bradikinin
D) Oksitosin
E) Qlutation

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.33

363) Zülalların əsas funksiyalarının yerinə yetirilməsini hansı struktur quruluş təmin edir?

A) Birincili
B) Dördüncülü
C) İkincili
D) Üçüncülü
E) Hamısı birlikdə

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.35

364) Aşağıdakı xassələrdən hansıları zülallara xas deyil?

A) Şişginlik qabiliyyəti

ensk az ödənişsiz istifadə üçün

B) Optiki aktivlik
C) Suda həll olmamaq
D) Elektrik sahəsində hərəkətlik
E) Yüksək molekul çəkisi

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.37

365) Bir sıra xəstəliklərə diaqnoz qoymaq məqsədilə zülalların hansı xassəsindən istifadə olunur?

A) Adsorbsiya
B) Amfoterlik
C) Denaturasiya
D) Kolloidlik
E) Hidrofillik

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.40

366) Zülalın hidrat təbəqəsi hansı funksiyanı daşıyır?

A) Qanın PH-ın tənzimində iştirak edir
B) Zülal molekullarını yapışmaqdan və çöküntüyə düşməkdən qoruyur
C) Bufer məhlulların əsasını təşkil edir
D) Zülalların fraksiyalara ayrılmasında iştirak edir
E) Zülal üzərində bəzi maddələrin adsorbsiyasında iştirak edir

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.41

367) Zülalların sulu məhlullarının davamlılığı hansı amillərlə təmin edilir?

A) Hidrat təbəqənin qalınlığı ilə
B) Yalnız müsbət yükün olması ilə
C) Elektrik yükünün və hidrat təbəqənin olması ilə
D) Yalnız mənfi yükün olması ilə
E) Elektrik yükünün və hidrat təbəqənin olmaması ilə

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.41

368) Ağır metallarla zəhərlənmələr zamanı müalicə zülalın hansı xassəsinə əsaslanır?

A) Denaturasiya
B) Kolloidlik
C) Şişginlik
D) Hidrofillik
E) Amfoterlik

sinaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.42

369) “Süni böyrək” apparatının (cihazının) fəaliyyətinin əsasında hansı proses durur?

A) Adsorbsiya
B) Denaturasiya
C) Dönməz çökmə
D) Dializ
E) Dönər çökmə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.43

370) Sadə zülalları necə adlandırırlar?

A) Prostaqlandin
B) Proteid
C) Progestron
D) Pirimidin
E) Protein

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.44

371) Mürəkkəb zülalları necə adlandırırlar?

A) Pirimidin
B) Progestron
C) Protein
D) Proteid
E) Prostaqlandin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.44

372) Sadə zülallara aid olmayanlar hansılardır?

A) Qlikoproteidlər
B) Albuminlər
C) Histonlar
D) Qlobulinlər
E) Protaminlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.44

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

373) Mürəkkəb zülallara aid olmayanlar hansılardır?

A) Histonlar
B) Xromoproteidlər
C) Lipoproteidlər
D) Nukleoproteidlər
E) Fosfoproteidlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.44-48

374) Xromoproteidlərə aid olmayan zülallar hansılardır?

A) Xlorofill
B) Katalaza
C) Mioqlobin
D) Hemoqlobin
E) Kazeinogen

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.45

375) Nuklein turşularına hansılar aiddir?

A) RNT, DNT
B) AlAT, AsAT
C) AMF, ADF
D) PP, C
E) LDQ, KK

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.50-51

376) DNT turşusunun tərkibində hansı maddə aşkar olunmayıb?

A) Timin
B) Riboza
C) Adenin
D) Quanin
E) Sitozin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.54

377) DNT turşusunun bioloji rolu nədən ibarətdir?

A) Aktivləşmiş aminturşuları zülalın sintez yerinə daşıyır
B) Genetik informasiyanı köçürdür
C) Genetik informasiyanı qoruyur
D) Ribosomların əsas komponentini təşkil edir

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Spesifik zülalın sintezi üçün matrisa (qəlib) rolunu oynayır

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.58-59

378) RNT turşusu hansı funksiyanı daşımır?

A) Aktivləşmiş aminturşuların daşınması
B) Genetik informasiyanın köçürdülməsi
C) Genetik informasiyanın qorunması
D) Heterogen nüvə RNT-si rolunu
E) Ribosomların əsas komponenti rolunu

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.58, 61

379) Nukleoproteidlər nədir?

A) Nukleozid ilə fosfat turşusunun birləşməsi
B) Zülal ilə nuklein turşularının birləşməsi
C) Mononukleotidlərin ardıcıl birləşməsi
D) Azot əsası ilə dezoksiribozanın birləşməsi
E) Azot əsası ilə ribozanın birləşməsi

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.45

380) Karbohidratlara aid olmayan funksiya hansıdır?

A) Tənzimedici
B) Energetik
C) Qoruyucu
D) Plastik
E) İrsilik

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.63-64

381) İnsan orqanizmi üçün karbohidratlara sutkalıq tələbat nə qədərdir?

A) 200 q
B) 100 q
C) 450 q
D) 25 q
E) 350 q

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.64

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

382) Monosaxaridlərin nümayəndələri olmayanlar hansıdır?

A) Fruktoza
B) Saxaroza
C) Qalaktoza
D) Riboza
E) Qlükoza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.66

383) Mübadilə proseslərində aşağıdakılardan hansılar iştirak edirlər?

A) Heteropolisaxaridlər
B) Homopolisaxaridlər
C) Disaxaridlər
D) Sərbəst monosaxaridlər
E) Monosaxaridlərin fosforla efirləri

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.68

384) Disaxaridlərin nümayəndələri hansılardır?

A) Dezoksiriboza
B) Riboza
C) Trioza
D) Maltoza
E) Eritroza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.68-69

385) Polisaxaridlərə aid olmayanlar hansılardır?

A) Dioksiaseton
B) Nişasta
C) Sellüloza
D) Heparin
E) Qlikogen

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.65-69-72

386) Hansı proseslərdə sellüloza iştirak etmir?

A) Bağırsağın motorikasını aktivləşdirmək
B) Mədənin motorikasını aktivləşdirmək
C) Həzm şirələrinin hasilini stimullaşdırmaq
D) Əzələlərdə toplanmaq

sirsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Toxluq hissi yaratmaq

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.70

387) Hüceyrəarası maddənin əsas tərkib hissəsi nədir?

A) Heparin
B) Sial turşuları
C) Neyramin turşusu
D) Xondroitinsulfatlar
E) Gialuron turşusu

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.72

388) Nişasta hansı karbohidratlardan ibarətdir?

A) Saxaroza
B) Qlükoza
C) Laktoza
D) Fruktoza
E) Eritroza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.70

389) Karbohidratların əsas funksiyası hansıdır?

A) İstilik tənzimedici
B) Daşıyıcı
C) İrsilik
D) Enerji
E) Katalitik

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.63

390) Karbohidratların tərkibinə daxil olan element hansıdır?

A) Mis
B) Fosfor
C) Dəmir
D) Azot
E) Oksigen

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.64

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

391) Aldehidspirtlərə aid olan hansıdır?

A) Eritroza
B) Riboza
C) Laktoza
D) Fruktoza
E) Qlükoza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.65

392) 1 q karbohidratın tam parçalanması zamanı əmələ gələn enerjinin miqdarı nə qədər olur?

A) 38,9 kC
B) 17,15 kC
C) 36,3 kC
D) 21,13 kC
E) 10,2 kC

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.63

393) Monosaxaridlərin xüsusiyyəti hansıdır?

A) Kristallik maddədir
B) Yüksəkmolekullu karbohidratdır
C) Kolloid məhlul əmələ gətirir
D) Suda həll olmur
E) Hidrofil birləşmədir

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.65

394) Orqanizmin əsas enerji mənbəyi hansı maddədir?

A) Saxaroza
B) Maltoza
C) Qlükoza
D) Laktoza
E) Qalaktoza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.66

395) Aşağıdakılardan hansı karbohidratlar metalları onların oksidlərindən reduksiya etmək qabiliyyətinə malikdir?

A) Eritroza
B) Maltoza

ursk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Riboza
D) Laktoza
E) Saxaroza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.66

396) Polisaxaridlər hansı xassəyə malikdirlər?

A) Asanlıqla oksidləşən maddələrdir
B) Şirin dada malik məhlullardır
C) Kristallik maddələrdir
D) Kolloid məhlullardır
E) Amfoter məhlullardır

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.69

397) Heparinin əmələ gəldiyi orqan hansıdır?

A) Böyrəklər
B) Qaraciyər
C) Dalaq
D) Mədə
E) Mədəaltı vəzi

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.72

398) Sidikdə pentozaları aşkar etmək üçün hansı keyfiyyət reaksiyasından və yaxud sınaqdan istifadə olunur?

A) Bial sınağı
B) Fol reaksiyası
C) Adamkeviç reaksiyası
D) Akrolein sınağı
E) Salkovski reaksiyası

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.251

399) Ekspress üsulu ilə sidikdə şəkəri təyin etdikdə hansı rəng şəkərin olmamasını göstərir?

A) Darçınlı-qırmızı
B) Göy
C) İntensiv qırmızı
D) Sarı-yaşıl
E) Yaşıl

sns.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1983 стр.252

400) Qlükozaya aid olmayan xüsusiyyət hansıdır?

A) Osmotik təzyiqin saxlanılmasında iştirak edir
B) Bitki və heyvanların əsas karbohidratıdır
C) Ketonspirtdir
D) Oliqosaxaridlərin və polisaxaridlərin əsasını təşkil edir
E) Əsas enerji mənbəyidir

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.66

401) Lipidləri xarakterizə edən xüsusiyyətlər hansılardır?

A) Yapışqan məhlullar əmələ gətirirlər
B) Asanlıqla reduksiya olunurlar
C) Hidrofil birləşmələrdir
D) Suda pis həll olurlar
E) Kolloid məhlullar əmələ gətirirlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.66

402) Protoplazmatik lipidlər necə xarakterizə edilir?

A) Həyat boyu eyni səviyyədə qalır
B) Bədən kütləsinin 30%-ni təşkil edir
C) Orqanizmdə olan bütün lipidlərin 50%-ni təşkil edir
D) Orqanizmdə ehtiyat şəklində yığılır
E) Müxtəlif amillərdən asılı olaraq dəyişir

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.73

403) Orqanizmdə olan lipidlərin bioloji əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) İstiliyin tənzimində iştirak edirlər
B) Qan qruplarının spesifikliyini təmin edirlər
C) Mədə və bağırsağın motorukasını fəallaşdırır
D) Orqanizmdə gedən kimyəvi reaksiyaları katalizə edirlər
E) Anticismlərin əmələ gəlməsində iştirak edirlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.74

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

404) 1 q yağın oksidləşməsi zamanı nə qədər enerji ayrılır?

A) 38,9 kC
B) 25,12 kC
C) 17,15 kC
D) 30 kC
E) 50,12 kC

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.74

405) Sadə lipidlərin tərkibində hansı maddələr vardır?

A) ali yağ turşuları və spirtlər
B) ali yağ turşuları, spirtlər və monosaxaridlər
C) ali yağ turşuları, spirtlər və fosfat turşusu
D) ali yağ turşuları, spirtlər və azot əsasları
E) ali yağ turşuları, spirtlər və sulfat turşusu

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.78

406) Sadə lipidlərə hansılar aiddir?

A) Qliserofosfatidlər
B) Qlikolipidlər
C) Sfinqofosfatidlər
D) Lipoproteidlər
E) Yağlı turşular

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.75, 77

407) Xolesterinin yerinə yetirmədiyi funksiya hansıdır?

A) Protrombini fəallaşdırır
B) Öd turşularının sintezində iştirak edir
C) Eritrositlərin hemolizə qarşı davamlılığını artırır
D) Steroid hormonların sintezində iştirak edir
E) Hüceyrə membranlarının tərkibinə daxildir

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.77

408) Mürəkkəb lipidlərə hansılar aiddir?

A) Yağlı turşular
B) Triasilqliserinlər
C) Yağlı aldehidlər
D) Fosfolipidlər

sırf az ödənişsiz istifadə üçün

E) Mumlar

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.78

409) Aşağıdakılardan hansının tərkibində daha çox lipid var?

A) Sinir toxumasında
B) Birləşdirici toxumada
C) Beyində
D) Piy toxumasında
E) Əzələlərdə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.74

410) Orqanizmi 25-30% enerji ilə təmin edən maddələr hansılardır?

A) Zülallar
B) Vitaminlər
C) Karbohidratlar
D) Mineral maddələr
E) Lipidlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.74

411) Beyin toxumasının və sinir liflərinin tərkibinə çoxlu miqdarda nə daxildir?

A) Triasilqliserinlər
B) Lipoproteidlər
C) Mioqlobinlər
D) Serebrozidlər
E) Xondroitinsulfatlar

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.80

412) Mürəkkəb lipidlərin tərkibinə aşağıdakılardan hansılar daxildir?

A) Disaxaridlər
B) Gialuron turşusu
C) Nitrat turşusu
D) Xondroitinsulfatlar
E) Monosaxaridlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.78

snskaz ödənişsiz istifadə üçün

413) Fosfolipidlərin orqanizm üçün olan əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) Küllü miqdarda sinir toxumasının tərkibində olmasından
B) Qanın laxtalanmasına mane olmasından
C) Bakteriya toksinlərinin zərərsizləşdiriləməsindən
D) Əzələ toxumasının tənəffüs piqmenti olmasından
E) Bioloji filtr rolunu oynamasından

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.78

414) Qlikolipidlərin orqanizm üçün hansı əhəmiyyəti vardır?

A) Yağ turşularını qanda daşımaq
B) Beyinin elektrik oyanıqlığını bərpa etmək
C) Eritrositlərin hemolizə qarşı davamlılığını artırmaq
D) Sinir impulslarının keçiriciliyini təmin etmək
E) Saçları və dərini suyun təsirindən qorumaq

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.79-80

415) Lipoproteidlərin orqanizm üçün hansı əhəmiyyəti vardır?

A) Eritrositlərin hemolizə qarşı davamlılığını artırırlar
B) Bakteriya toksinlərini zərərsizləşdirirlər
C) Sinir liflərinin tərkibinə daxildirlər
D) Zülalın biosintezində iştirak edirlər
E) Qanla lipidləri daşıyırlar

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.80

416) Akrolein sınağı vasitəsilə nəyi aşkar etmək olar?

A) Qlikolipidləri
B) Qliserofosfolipidləri
C) Lipoproteidləri
D) Xolesterini
E) Sfinqofosfatidləri

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.254

417) Lesitin hansı lipid qrupuna aiddir?

A) Sfinqofosfatidlərə
B) Qliserofosfatidlərə
C) Qlikolipidlərə
D) Lipoproteidlərə

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sterinlərə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.78

418) Xolesterini aşkar etmək üçün hansı keyfiyyət reaksiyasından istifadə olunur?

A) Salkovski
B) Bial
C) Nilander
D) Ninhidrin
E) Trommer

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.255

419) Orqanizmdə lipidlərin əsas emulqatorları hansı maddələrdir?

A) Öd turşularının duzları
B) Natrium bikarbonat
C) Öd piqmentləri
D) Kalium hidroksid
E) Natrium xlorid

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.154

420) Hansı xüsusiyyət xolesterini xarakterizə edir?

A) Beyin hüceyrələrini izolə etmək qabiliyyətinə malikdir
B) Protrombini aktivləşdirir
C) Yarpaqları sudan və mikroblardan qoruyur
D) Üzvi həll edicilərlə pis həll olur
E) Suda həll olur

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.77

421) Kimyəvi təbiətinə görə vitaminlər hansı birləşmələrə aiddir?

A) Yüksəkmolekullu üzvi birləşmələrə
B) Üzvi turşulara
C) Qeyri-üzvi birləşmələrə
D) Aldehidlərə
E) Aşağımolekullu üzvi birləşmələrə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.81

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

422) Vitamin mənbəyi hesab olunmayanlar hansılardır?

A) Süni preparatlar
B) Mineral turşular
C) Bağırsaq mikroflorası
D) Provitaminlər
E) Bitki və heyvan mənşəli məhsullar

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.81-82

423) Suda həll olan vitaminlərə aşağıdakılardan hansılar aid deyil?

A) A (retinol)
B) PP (nikotin turşusu)
C) B1 (tiamin)
D) B6 (piridoksol)
E) C (askorbin turşusu)

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.85-86

424) Yağda həll olan vitaminlərə aşağıdakılardan hansılar aid deyil?

A) B2 (riboflavin)
B) A (retinol)
C) D (kalsiferol)
D) E (tokoferol)
E) K (filloxinon)

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.86-87

425) Orqanizmdə tam vitamin çatışmazlığı necə adlanır?

A) Hipervitaminoz
B) Hipertireoz
C) Avitaminoz
D) Hipovitaminoz
E) Hipotireoz

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.83

426) Nə üçün suda həll olan vitaminlər orqanizmə hər gün daxil olmalıdır?

A) Orqanizmdə sintez olunmadığına və ya az miqdarda əmələ gəldiyinə görə
B) “Kaslın daxili amili” ilə birləşməməsinə görə
C) Öd turşularının çatışmamazlığına görə
D) Qidanın tərkibində az miqdarda olduğuna görə

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Bağırsaqda zəif sorulmalarına görə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.81

427) Hansı proseslər A vitamininin bioloji təsiri üçün xarakterik deyil?

A) Zülalların və lipidlərin mübadiləsi
B) Epitelial toxumanın buynuzlaşmasının qarşısının alınması
C) Membranların keçiriciliyinin tənzimi
D) Qanın laxtalanması
E) Oksidləşmə prosesləri

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.87

428) Xəstəliklərdən hansı A vitamininin hipovitaminozu ilə bağlı deyil?

A) Toyuq korluğu
B) Pellaqra
C) Bronxitlər
D) Kseroftalmiya
E) Nefritlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.86-87

429) PP vitamininin çatışmazlığı hansı xəstəliyə səbəb olur?

A) Pellaqra
B) Polinevrit
C) Kseroftalmiya
D) Raxit
E) Bəd xassəli anemiya

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.85

430) Fermentlər nədir?

A) Aktivatorlardır
B) Substratdır
C) Bioloji katalizatorlardır
D) Sekretlərdir
E) İngibitorlardır

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.89

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

431) Fermentlərin bioloji əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) Daxili mühitin sabitliyini tənzimləməsindən
B) Biokimyəvi reaksiyaların sürətini zəiflətməsindən
C) Orqanizmin əsas tərkib hissəsi olmasından
D) Biokimyəvi reaksiyaların sürətini artırmasından
E) Osmotik təzyiqin sabit saxlanılmasından

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.89

432) Mədəaltı vəzin 1,6 q amilazası sutka ərzində nə qədər nişasta hidroliz edir?

A) 75 kq
B) 175 kq
C) 17 kq
D) 100 kq
E) 105 kq

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.95

433) Fermentlər hansı temperaturda inaktivləşir?

A) 70°-80°
B) 55°-65°
C) 35°-45°
D) 15°-25°
E) 25°-35°

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.102

434) Fermentativ reaksiyaların sürətini artıran amil hansıdır?

A) Aktivatorlar
B) İngibitorlar
C) Apofermentlər
D) Enzimlər
E) Kofermentlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.103

435) Qeyri-üzvi katalizatorlara xas olan parametr göstəricisi hansıdır?

A) Normal atmosfer təzyiqi
B) Yüksək molekullu polimer olduğu
C) Yüksək spesifiklik
D) Yüksək temperatur optimumu (1000C və çox)

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Reaksiya zamanı strukturun dəyişməsi

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.94

436) Üzvi katalizatorlara xas olan parametr göstəricisi hansıdır?

A) Aşağı spesiflik
B) Yüksək spesifiklik
C) Aşağı molekullu birləşmələrin olması
D) Reaksiya zamanı strukturun dəyişilməməsi
E) Temperatur optimumnun yüksək olması

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.94

437) 2 q pepsin 2 saat ərzində nə qədər denaturatlaşmış yumurta zülalını parçalaya bilər?

A) 200 kq
B) 30 kq
C) 100 kq
D) 25 kq
E) 175 kq

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.95

438) Ağız suyunun amilazası üçün hansı substrat spesifikdir?

A) Qlikogen
B) Saxaroza
C) Qlükoza
D) Laktoza
E) Nişasta

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.95

439) Ağız suyunun tərkibində hansı ferment var?

A) Amilaza
B) Saxaraza
C) Fosforilaza
D) Laktaza
E) Sellülaza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.134

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

440) Koferment rolunda aşağıdakılardan hansı maddələr ola bilər?

A) Zülallar
B) Lipidlər
C) Karbohidratların törəmələri
D) Hormonlar
E) Vitaminlərin aktivləşmiş formaları

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.99

441) Fermentin apoferment hissəsini hansı maddələr təşkil edir?

A) Nukleozidtrifosfatlar
B) Hormonlar
C) Vitaminlər
D) Mineral maddələr
E) Aminturşular

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.99

442) Hidrolazalar sinfinə aşağıdakılardan hansılar aid deyil?

A) Amilaza
B) Pepsin
C) Saxaraza
D) Tripsin
E) Laktatdehidrogenaza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.107

443) Miokardın infarktında əsasən hansı fermentlərin aktivliyi artır?

A) AsAT, KK və LDG (Aspartataminotransferazanın, kreatinkinazanın, laktakdehidrogenazanın)
B) Turş fosfatazanın
C) Qələvi fosfatazanın
D) Alfa-amilazanın
E) AlAT, LDG (Alaninaminotransferazanın, laktatdehidrogenazanın) aldolazanın

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.110

444) Qaraciyər xəstəlikləri zamanı əsasən hansı fermentlərin aktivliyi artır?

A) Qələvi fosfatazanın və maltazanın
B) Alfa-amilazanın və laktazanın
C) AlAT-ın, aldolazanın, LDG-nin, sorbitoldehidrogenazanın

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

D) Turş fosfatazanın və saxarazanın
E) KK, AsAT və LDG-nin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.110

445) Mədəaltı vəzin xəstəlikləri zamanı hansı fermentin aktivliyi təyin edilir?

A) Fosforilazanın
B) Maltazanın
C) Saxarazanın
D) Laktazanın
E) Alfa-amilazanın

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.110

446) Fermentlərin aktivliyini təyin etdikdə hansı qandan istifadə edilir?

A) Hemolizli qandan
B) Uzun müddət saxlanılmış qan serumundan
C) Hemolizə uğramayan qandan
D) Qan laxtasından
E) Qan laxtası ilə qarışmış serumdan

Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров, Б.Ф.Коровкин, В.В.Меньшиков. Биохимические исследования в клинике. «Медицина», 1981 стр.45

447) Kimyəvi təbiətinə görə fermentlər hansı birləşmələrə aiddir?

A) Vitaminlərə
B) Zülallara
C) Hormonlara
D) Lipidlərə
E) Karbohidratlara

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.97

448) Fermentlər reaksiyaların sürətini neçə dəfə artırırlar?

A) 1015-1018 dəfə
B) 10 dəfə
C) 108-1011 dəfə
D) 5 dəfə
E) 102-106 dəfə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.94

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

449) Hansı ferment güclü turş mühitdə yüksək aktivliyə malikdir?

A) Pepsin
B) Tripsin
C) Ximotripsin
D) Amilaza
E) Qastriksin

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.103, 179

450) Qidanın əvəzolunmayan amillərinə hansılar aid deyil?

A) Su
B) Vitaminlərin çox hissəsi
C) Doymamış yağ turşuları
D) Mineral elementlər
E) Doymuş yağ turşuları

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.115

451) Orqanizmdə maddələrin son məhsullara qədər parçalanması prosesinə nə deyilir?

A) Anevrizm
B) Metabolizm
C) Astiqmatizm
D) Katabolizm
E) Anabolizm

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.114

452) Orqanizmdə son məhsullardan spesifik maddələrin sintez prosesinə nə deyilir?

A) Anevrizm
B) Anabolizm
C) Astiqmatizm
D) Metabolizm
E) Katabolizm

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.114

453) Hansı maddələr makroergik adlanır?

A) Efir rabitəsi olanlar
B) Peptid rabitəsi olanlar
C) Fosfat rabitəsi olanlar

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Hidrogen rabitəsi olanlar
E) İon rabitəsi olanlar

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.117-118

454) Makroerqik birləşmələrə aid olmayanlar hansılardır?

A) Nukleozid trifosfatlar (QTF, UTF, TTF, STF)
B) Adenozintrifosfat turşusu (ATF)
C) Fosfoyenolpiroüzüm turşusu
D) Kreatinfosfat
E) Adenozinmonofosfat turşusu

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.117-118

455) Hansı proseslərdə ATF-in enerjisindən istifadə olunmur?

A) Sintez proseslərində
B) İonların membranlardan aktiv daşınmasında
C) Əzələlərin açılmasında
D) Beyin fəaliyyətində
E) Əzələlərin yığılmasında

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.118-119

456) Karbohidratların intensiv parçalanması harada gedir?

A) Nazik bağırsaqda
B) Ağız boşluğunda
C) Qaraciyərdə
D) Mədədə
E) Yoğun bağırsaqda

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.134

457) Mədə-bağırsaq traktında karbohidratlar hansı fermentlərin təsirindən parçalanırlar?

A) Lipaza və qastriksin
B) Dipentidaza və tripeptidaza
C) Aminopepridaza və karboksipeptidaza
D) Pepsin və qastriksin
E) Amilaza və maltaza

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.134

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

458) Mədə-bağırsaq traktında karbohidratların parçalanması nəticəsində hansı maddələr alınır?

A) Dipeptidlər və tripeptidlər
B) Yağ turşuları, qliserin və xolesterin
C) Yağ turşuları, azot əsası və qliserin
D) Fruktoza və aminturşular
E) Qlükoza, fruktoza, qalaktoza

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.134

459) Hüceyrələrdə karbohidratların parçalanması nədən başlayır?

A) Fruktozadan, qlükozadan və qalaktozadan
B) Nişastadan və qlükozadan
C) Qlikogendən və qalaktozadan
D) Sellülozadan və fruktozadan
E) Qlükozadan və qlikogendən

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.136

460) Anaerob parçalanma yolu əsasən hansı toxuma üçün xarakterikdir?

A) Eritrositlər üçün
B) Əzələ toxuması üçün
C) Ürək üçün
D) Beyin toxuması üçün
E) Cinsi vəzlər üçün

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.138

461) Qanda qlükozanın azalmasına hansı hormonlar səbəb olur?

A) Adrenalin
B) Qlükaqon
C) Kortizon
D) Aldosteron
E) İnsulin

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.143

462) Karbohidrat mübadiləsini xarakterizə edən əlamətlərə hansılar aiddir?

A) Hipoqlikemiya və hipoproteinemiya
B) Ketonemiya, ketonuriya və lipuriya
C) Hiperqlikemiya, hipoqlikemiya, qlükozuriya

tusk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Lipuriya və qlükozuriya
E) Qlükozuriya və hiperproteinemiya

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.146-147

463) Hipoqlikemiya hansı hallarda yarana bilər?

A) Müxtəlif emosiyalar zamanı
B) İnsulinə əks olan hormonların artıq miqdarda hasili zamanı
C) Çoxlu karbohidrat tərkibli qidanın qəbulu zamanı
D) Toksikozlar zamanı
E) Orqanizmə artıq miqdarda insulin yeritdikdə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.148

464) İnsulyar hiperqlikemiyanın səbəbləri aşağıdakılardan hansılardır?

A) Alimentar və neyrogen səbəblər
B) Toksikozlar
C) Travmalar
D) Daxili sekresiya vəzilərinin xəstəlikləri
E) Langerhans adacıqlarının betta-hüceyrələrinin hipofunksiyası

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.146-147

465) Şəkərli diabet xəstəliyinin əsas simptomlarına hansılar aiddir?

A) Qlükozuriya və lipuriya
B) Hiperqlikemiya, qlükozuriya, ketonemiya
C) Lipuriya və asetonuriya
D) Hipoqlikemiya və hipoproteinemiya
E) Ketonemiya və anuriya

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.148

466) Karbohidrat mübadiləsinin qanda əsas göstəricisi hansıdır?

A) Qlükoza
B) Qlikogen
C) Fruktoza
D) Qalaktoza
E) Piroüzüm turşusu

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.142-143

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

467) Hansı mühit göstəricisində (pH) ağız suyunun amilazası daha fəaldır?

A) pH = 6,8 – 7,2
B) pH = 2,0 – 3,5
C) pH = 4,5 – 5,0
D) pH = 1,0 – 1,5
E) pH = 5,0 – 6,0

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.134

468) Karbohidrat olmayan komponentlərdən qlükozanın sintez prosesi necə adlanır?

A) Qlikoliz
B) Qlikogenoliz
C) Hemoliz
D) Hidroliz
E) Qlükoneogenez

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.134, 139, 140

469) Sellülozanın parçalanması harada gedir?

A) Ağız boşluğunda
B) Yoğun bağırsaqda
C) Nazik bağırsaqda
D) Qaraciyərdə
E) Mədədə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.134

470) Qanda qlükozanın norma daxilindəki miqdarı hansıdır?

A) 12,40 mmol/l
B) 10,25 mmol/l
C) 2,20 mmol/l
D) 6,80 mmol/l
E) 5,50 mmol/l

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.136

471) Qanda ümumi şəkərin norma daxilindəki miqdarı hansıdır?

A) 12,0 mmol/l
B) 3,0 mmol/l
C) 9,6 mmol/l
D) 6,0 mmol/l

sok.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 3,8 mmol/l

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.136; В.Г.Колб Клиническая биохимия «Беларусь», 1976 стр.124

472) Qanda xalis qlükozanı təyin edən üsullara aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Yaffe
B) Hagedorn - İensen
C) Timol sınağı
D) Veltman
E) Ortotoluidin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.266, 268, 288, 297-298

473) Bu maddələr arasında karbohidrat mübadiləsinə aid olmayan hansıdır?

A) Xolesterin
B) Sial turşuları
C) Piroüzüm turşusu
D) Laktat
E) Qlükoza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.71-72; 68-69

474) Lipidlərin həzmi daha aktiv harada gedir?

A) Nazik bağırsaqda
B) Yoğun bağırsaqda
C) Mədədə
D) Qaraciyərdə
E) Ağız boşluğunda

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.154-155

475) Mədə-bağırsaq traktındakı fermentlərdən hansı lipolitik fermentlərə aiddir?

A) Pepsin
B) Sellülaza
C) Ximozin
D) Xolesteraza
E) Aminopeptidaza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.134, 154, 181

snskaz ödənişsiz istifadə üçün

476) Lipolitik fermentlərin maksimal fəallığı hansı mühitdə baş verir?

A) Güclü qələvi
B) Güclü turş
C) Zəif turş
D) Zəif qələvi
E) Neytral

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.154

477) Triasilqliserinlərin hidrolizində hansı fermentlər iştirak edir?

A) Lipaza
B) Aldolaza
C) Fosforilaza
D) Fosfolipaza
E) Xolesteraza

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.154

478) Emulqatorlar nədir?

A) Lipid hissəciklərinin bir-birinə yapışmasına mane olan maddələr
B) Lipidlərin həll olmasında iştirak edən maddələr
C) Lipidlərin sintezini gücləndirən maddələr
D) Lipidlərin çökməsində iştirak edən maddələr
E) Lipidlərin orqanizmdə toplanmasına səbəb olan maddələr

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.154

479) Lipidlərin həzmi zamanı əmələ gəlmiş suda həll olan məhsullar hansılardır?

A) Doymuş yağ turşuları
B) Doymamış yağ turşuları
C) Qliserin
D) Xilomikronlar
E) Xolesterin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.156

480) Hüceyrələrdə lipidlərin parçalanma prosesi necə adlanır?

A) Lipogenez
B) Lipoliz
C) Qlikogenoliz
D) Hidroliz

Sırf az ödənişsiz istifadə üçün

E) Qlikoliz

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.162

481) Fosfolipidlərin həzmində iştirak etməyən fermentlər hansılardır?

A) Fosfolipaza D
B) Fosfolipaza B
C) Fosforilaza
D) Fosfolipaza A
E) Fosfolipaza C

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.156

482) Endogen xolesterinin sintezi harada gedir?

A) Piylikdə
B) Qaraciyərdə
C) Yoğun bağırsaqda
D) Dalaqda
E) Nazik bağırsaqda

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.167-168

483) Xolesterin mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədar olan xəstəlik hansıdır?

A) Ateroskleroz
B) Pankreatit
C) Podaqra
D) Qaraciyərin piy distrofiyası
E) Piylənmə

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.172

484) Hansı hallarda lipuriya müşahidə olunmur?

A) Nefrozlarda
B) Piyin miqdarı sidikdə 2 mq/l-ə qədər olduqda
C) Şəkərli diabetin ağır halında
D) Mədəaltı vəzin şişlərində
E) Ağciyər vərəmində

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.171, 172

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

485) Yağ turşuları, xolesterin hansı maddələr vasitəsilə bağırsağın selikli qişasına sorulur?

A) Cüt öd turşuları
B) Xilomikronlar
C) Yüksək qatılıqlı lipoproteidlər
D) Xolesterin efirləri
E) Aşağı qatılıqlı lipoproteidlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.156

486) Hansı səbəb piylənmə üçün xarakterik deyil?

A) Enerji mübadiləsinin pozulması
B) Hipofizin hipofunksiyası
C) Hiperdinamiya
D) İrsi faktorlar
E) Cinsi hormonların hipofunksiyası

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.174

487) Qaraciyərin piy distrofiyası nə ilə xarakterizə olunur?

A) Triasilqliserinlərin toplanması ilə
B) Xolesterinin toplanması ilə
C) Metioninin artıq miqdarı ilə
D) Fosfolipidlərin güclü sintezi ilə
E) Xolinin artıq miqdarı ilə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.175

488) Qan serumunda fosfolipidlərin təyini hansı maddələrin miqdarının təyininə əsaslanır?

A) Yağ turşularının
B) Metioninin
C) Lipoid fosforun
D) Qliserinin
E) Xolinin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.273

489) Lipoproteidlər qrupuna aid olmayan birləşmələr hansılardır?

A) Xilomikronlar
B) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Fosfoproteidlər
D) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər
E) Daha aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.80

490) Aşağısıxlıqlı lipoproteidlər hansı funksiyanı yerinə yetirirlər?

A) Xolesterini orqanlara daşıyırlar
B) Hüceyrələrdən xolesterinin artıq miqdarını xaric edirlər
C) Fosfolipidlərin sintezini gücləndirirlər
D) Lipidləri əvvəl limfaya, sonra qana keçirirlər
E) Triasilqliserinlərin sintezini gücləndirirlər

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.80

491) Zülalların həzmi harada daha aktiv gedir?

A) Nazik bağırsaqda
B) Mədədə
C) Ağız boşluğunda
D) Qaraciyərdə
E) Yoğun bağırsaqda

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.181

492) Mədədə zülallar hansı fermentlərin təsirindən parçalanırlar?

A) Pepsinin
B) Tripsinin
C) Dipeptidazaların
D) Lipazanın
E) Aminopeptidazaların

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.180-181

493) Nazik bağırsaqda zülalların parçalanmasını katalizə edən fermentlərə hansılar aiddir?

A) Ximotripsin
B) Ximozin
C) Rennin
D) Laktaza
E) Amilaza

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.181

494) Yoğun bağırsaqda zülalların çürüməsi zamanı əmələ gələn zəhərli maddə hansıdır?

A) Rennin
B) Prolin
C) Qlutamin
D) Lizin
E) Kadaverin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.183

495) Albuminlər hansı maddələrin zərərsizləşməsində və daşınmasında iştirak edirlər?

A) Krezolun
B) Bilirubinin
C) Skatolun
D) Fenolun
E) Kadaverinin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.192-193

496) Albuminlərin əsas əmələ gəlməsi harada baş verir?

A) Yoğun bağırsaqda
B) Əzələlərdə
C) Nazik bağırsaqda
D) Qaraciyərdə
E) Dalaqda

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.193

497) Anticismlər hansı fraksiyanın tərkibinə daxildir?

A) Alfa2 - qlobulin
B) Alfa1 - qlobulin
C) Betta - qlobulin
D) Albumin
E) Qamma (γ) - qlobulin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.194

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

498) Seruloplazmin zülalı hansı xassəyə malikdir?

A) Retinolu daşımaq
B) Dəmiri birləşdirib qanla daşımaq
C) Hemoqlobulinlə birləşmək
D) Tiroksini daşımaq
E) Misi birləşdirib qanla daşımaq

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.193

499) Ammonyakın zərərsizləşmə yolunu göstərin.

A) Dezaminləşmə
B) Betta-oksidləşmə
C) Karbamidin sintezi
D) Yenidən aminləşmə
E) Dekarboksizləşmə

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 səh.190

500) Zülal mübadiləsinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün hansı maddələrin miqdarını təyin edirlər?

A) Betta-lipoproteidlərin
B) Sial turşularının
C) Süd turşusunun
D) Zülal fraksiyalarının
E) Piroüzüm turşusunun

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.192

501) Qanda və sidikdə kreatininin təyini hansı rəngli reaksiyanın köməyi ilə aparılır?

A) Rappoport-Eyxhorn
B) Yaffe
C) Diasetilmonooksim
D) Asetilaseton
E) Ortotoluidin

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.288

502) Azotemiya nəyə deyilir?

A) Qanda azotun artmasına
B) Qanda aminturşuların artmasına
C) Qanda zülalın azalmasına

tursk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Qanda qalıq azotunun artmasına
E) Qanda zülalın artmasına

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.197

503) Purin azot əsaslarının son məhsullarına hansılar aiddir?

A) Karbon qazı
B) Sidik cövhəri
C) İndikan
D) Ammonyak
E) Sidik turşusu

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.203

504) Nukleoproteid mübadiləsinin pozulmasına hansılar aiddir?

A) Mexaniki sarılıq
B) Hemoqlobinpatiya
C) Hipourikemiya
D) Podaqra
E) Porfiriyalar

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.208

505) Bilirubinin albuminlə birləşməsi necə adlanır?

A) Bilirubin-qlükuronid
B) Bilirubin-diqlükuronid
C) Urobilin
D) Birləşmiş bilirubin
E) Sərbəst bilirubin

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.206

506) Birləşmiş bilirubin nəyə deyilir?

A) Bilirubinin sterkobilin ilə birləşməsinə
B) Bilirubinin verdoqlibinlə birləşməsinə
C) Bilirubinin biliverdinlə birləşməsinə
D) Bilirubinin qlükuron turşusu ilə birləşməsinə
E) Bilirubinin albuminlə birləşməsinə

Ədəbiyyat: M.B.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.206

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

507) Mexaniki sarılığın səbəbləri hansılardır?

A) Uyğun gəlməyən qanın köçürülməsi
B) Ödün 12-barmaq bağırsağa axımının pozulması
C) Qaraciyər sirrozu
D) Eritrositlərin yüksək hemolizi
E) Toksikozlar

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.209

508) Parenximatoz sarılığın səbəbləri hansılardır?

A) Uyğun gəlməyən qanın köçürülməsi
B) Öd yollarının tutulması
C) Qaraciyər hüceyrələrinin zədələnməsi
D) Hemoqlobinpatiyalar
E) Yanıqlar

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.209

509) Hormonların bioloji əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) Həzm proseslərinə iştirakından
B) Müxtəlif proseslərə tənzimedici təsirdən
C) Vitaminlərə təsirindən
D) Orqanizmdə ehtiyata toplanmasından
E) Genetik informasiyanın ötürməsindən

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.127

510) Hormonların təsiri nə ilə xarakterizə olunur?

A) Yerli təsiri ilə
B) Yüksək seçicilik və spesifikliyi ilə
C) Aşağı spesifikliyi ilə
D) Eyni təsir mexanizmi ilə
E) Aşağı bioloji aktivliyi

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.127; 1983 стр.114

511) Hormonlar arasında hansı vəzin hormonları mərkəzi yer tutur?

A) Hipofiz
B) Böyrəküstü
C) Qalxanabənzər
D) Epifiz

tipik.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Mədəaltı

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1983 стр.114, 125

512) Cinsi hormonlara aid olmayanlar hansılardır?

A) Estradiol
B) Timozin
C) Estriol
D) Androsteron
E) Testosteron

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.132

513) Hansı parçalanma məhsulları bütün mübadilə proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsini yaradır?

A) Sidik tuşusu
B) Su, CO_2, NH_3
C) Aminturşular
D) Monosaxaridlər
E) Süd turşusu

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.218

514) Hansı proses qaraciyərdə karbohidrat mübadiləsinə aiddir?

A) Qlükoneogenez
B) Xolesterinin sintezi
C) Keton cisimciklərinin əmələ gəlməsi
D) Plazma fosfolipidlərinin əmələ gəlməsi
E) Öd turşularının sintezi

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.225

515) Aşağıdakılardan hansı qaraciyərin zülal mübadiləsindəki iştirakını göstərmir?

A) Fibrinogenin, protrombinin sintezi
B) Xolesterinin sintezi
C) Zülalların dezaminləşməsi, yenidən aminləşməsi
D) Antitoksiki rolu
E) Sidik cövhərinin sintezi

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.223-224

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

516) Aşağıdakılardan hansı qaraciyərin karbohidrat mübadiləsindəki iştirakını göstərmir?

A) Qlükoneogenz
B) Qlikogenin sinrezi və parçalanması
C) Qanda insulinin tənzimlənməsi
D) Karbamidin sintezi
E) Monosaxaridlərin qarşılıqlı çevrilməsi

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.224-225

517) Homeostaz nə deməkdir?

A) Orqanizmin daxili mühitinin sabitliyidir
B) Qan laxtasının lizisə uğramasıdır
C) Qan laxtasının yığılmasıdır
D) Qan laxtasının əmələ gəlməsidir
E) Fizioloji proseslərin cəmi deməkdir

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.227. А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.187-188

518) Hiponatriumemiya hansı hallarda müşahidə olunur?

A) Böyrək büzüşməsində
B) Hüceyrələrin yüksək parçalanmasında
C) Aldosteronun hipersekresiyası zamanı
D) Qusma, ishal zamanı
E) Eritrositlərin hemolizi zamanı

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.237. А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.282

519) Su insan orqanizminin kütləsinin neçə hissəsini təşkil edir?

A) 1/5
B) 4/5
C) 2/3
D) 2/5
E) 1/3

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.228

520) Hansı toxumada suyun miqdarı nisbətən azdır?

A) Qaraciyər

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qan
C) Sinir
D) Birləşdirici
E) Əzələ

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.228-229

521) Makroelementlər hansılardır?

A) Zn, J2, Co
B) Ca, P, Na
C) Fe, Mg, Cu
D) Mg, J2, Fe
E) J2, Zn, Cu

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.230-231

522) Mikroelementlər hansılardır?

A) Fe, J2
B) Ca, P
C) K, Cl
D) Na, Cl
E) Na, K

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.230-231

523) İnsan orqanizmində kobaltın əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) Mioqlobulinin tərkibinə daxildir
B) Qanın əmələ gəlməsində iştirak edir
C) Bağırsaqda sorulma prosesini yaxşılaşdırır
D) İmmunoloji davamlılığı yüksəldir
E) Karbohidrat mübadiləsində iştirak edir

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.231

524) pH neçə olduqda mühit qələvi sayılır?

A) 6,8 olduqda
B) 7-14-ə qədər olduqda
C) 5,5-6,5-ə qədər olduqda
D) 1,5-5-ə qədər olduqda
E) 3,5-4,5-ə qədər olduqda

ensiklopedik.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.234

525) Qanın pH-ı normada neçə olmalıdır?

A) 7,36 – 7,40
B) 7,5 – 8,0
C) 6,5 – 7,0
D) 8,0 – 8,5
E) 5,50 – 6,5

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.234-235

526) Su-duz mübadiləsini tənzim edən hormonlar hansılardır?

A) Qlükokortikoidlər, mineralokortikoidlər
B) Vazopressin, aldosteron
C) Androgen, estrogen
D) Adrenalin, noradrenalin
E) İnsulin, qlükaqon

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.236

527) Maqnezium insan orqanizmində hansı rolu oynayır?

A) Eritrositlərin tərkibinə daxildir
B) Əzələ zülallarının sintezində iştirak edir
C) Cinsi inkişafa təsir göstərir
D) Sinir-əzələ oyanıqlığını tənzimləyir
E) Hormonların tərkibinə daxildir

Ədəbiyyat: М.В.Ермолаев, Л.П.Ильичева. Биологическая химия. «Медицина», 1989 стр.231

528) Qanın laxtalanmasında neçə plazma amili iştirak edir?

A) 10
B) 8
C) 3
D) 9
E) 13

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.184

snsk.az abonəçisiz istifadə üçün

529) Hansı plazma amili laxtalanmanın bütün keçid dövrlərində iştirak edir?

A) Fibrinogen
B) Protrombin
C) Prokonvertin
D) Prouer-Stüart amili
E) Ca ionları

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.183

530) Trombositar amil olan serotonin qanın laxtalanmasında hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Trombinin əmələ gəlməsini sürətləndirir
B) Damardaraldıcı və damar divarlarının keçiricilik qabiliyyətini azaldır
C) Fibrinogenin fibrinə çevrilməsini sürətləndirir
D) Toxuma tromboplastininin təsirini aktivləşdirir
E) Qanın trombokinazasını əmələ gətirir

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.183

531) Heparin qanın laxtalanmasında nə kimi rol oynayır?

A) Trombinin əmələ gəlməsini sürətləndirir
B) Fibrinogenin fibrinə çevrilməsini sürətləndirir
C) Trombokinazanın əmələ gəlməsində iştirak edir
D) Qan laxtasının yığılmasında iştirak edir
E) Trombinin əmələ gəlməsini inaktivləşdirir

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.187

532) Retraksiya prosesi nəticəsində nə baş verir?

A) Qan damarlarının reflektor sıxılması baş verir
B) Damar divarının keçiricilik qabiliyyəti zəifləyir
C) Əmələ gəlmiş qan laxtası yığılır
D) Trombositlər aqreqatlar əmələ gətirir
E) Qan laxtası həll olur

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.187

Bölmə 3. Mikrobiologiya və mikrobioloji texnika

sunk.az ödənişsiz istifadə üçün

533) Bunlardan hansı mikroskopun optik hissəsinə aiddir?

A) Makrovint
B) Əşya stolu
C) Güzgü
D) Mikrovint
E) Tubus

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 10-13

534) Mikroskopun mexaniki hissəsinə nə aiddir?

A) Obyektiv
B) Kondensorun linzası
C) Güzgü
D) Okulyar
E) Tubus

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair"Bakı. 1998. Səh. 10-13

535) Mikroskopun böyüdücü sistemi nədən ibarətdir?

A) Tubus
B) Okulyar
C) Mikrovint
D) Diafraqma
E) Makrovint

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı.1998. Səh. 10-13

536) İndikatorlu qidalı mühitlərdən nə üçün istifadə olunur?

A) Materialın göndərilməsində
B) Kulturanın saxlanmasında
C) Mikroorqanizmin növünün identifikasiyasında
D) Təmiz kulturanın alınmasında
E) Təmiz kulturanın toplanmasında

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 67,83

537) E.Cenner hansı xəstəliyə qarşı peyvənd üsulunu kəşf etmişdir?

A) Vəba
B) Qara yara
C) Taun
D) Quduzluq

Sırf az ödənişsiz istifadə üçün

E) Çiçək

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 356-357

538) Bu xəstəliklərdən hansının törədicisini R.Kox kəşf etmişdir?

A) Taun
B) Göy öskürək
C) Quduzluq
D) Difteriya
E) Vərəm

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 7-8

539) Aşağıdakılardan hansı şarabənzər formadadır?

A) Sarsınlər
B) Vibrionlar
C) Diplobakteriyalar
D) Basillər
E) Spirillər

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 14-15

540) Vibrionların quruluş forması necədir?

A) Kokşəkilli
B) Bir ucu qalınlaşmış
C) Vergülvari
D) Çöpvari
E) Sancaqşəkilli

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 15-16

541) Bakteriya hüceyrəsində sporun vəzifəsi nədir?

A) İfrazat üzvüdür
B) Çoxalma xarakteri daşıyır
C) Hərəkət üzvüdür
D) Həzm prosesində iştirak edir
E) Uzun müddət mikrobu müdafiə edir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 19-20

542) Tənəffüsünə görə mikroorqanizmlər hansı qruplara ayrılır?

A) Aftotroflar
B) Hemotroflar
C) Heterotroflar

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

D) Fototroflar
E) Aeroblar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 34

543) Bunlardan hansı qida maddələrinin mənimsənilməsi prosesidir?

A) Simbioz
B) Metabioz
C) Assimliyasiya
D) Dissimilyasiya
E) Antaqonizm

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 31-32

544) Göbələklərdə sporlar hansı vəzifəni daşıyır?

A) Çoxalma
B) Qorunma
C) Tənəffüs
D) Bölünmə
E) Qidalanma

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 25-28

545) Bir spordan neçə bakteriya hüceyrəsi əmələ gəlir?

A) Bir
B) İki
C) Yeddi
D) Dörd
E) Altı

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 19-20

546) Göstərilən qruplardan hansılarına göbələklər aiddir?

A) Spiroxetlər
B) İbtidailər
C) Ali bitkilər
D) Viruslar
E) İbtidai bitkilər

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 368-369

547) Mikroorqanizmlər arasında əlaqə forması hansıdır?

A) Antaqonizm
B) Polimorfizm

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Metabolizm
D) Katabolizm
E) Anabolizm

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 90-91

548) Bakteriya hüceyrəsində nüvənin hansı funksiyası var?

A) Tənəffüs prosesində iştirak edir
B) İrsi məlumatları saxlayır
C) Həzm prosesində iştirak edir
D) Müdafiə edir
E) Hüceyrəyə forma verir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 18

549) Qram mənfi bakeriyalar nə rəngdə olur?

A) Bənövşəyi rəng
B) Göy rəng
C) Qırmızı moruğu rəng
D) Qəhvəyi rəng
E) Qızılı rəng

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 31-32

550) Qram mənfi bakteriyalar hansı boyaqla rənglənir?

A) Lyuqol məhlulu ilə
B) Metilen abısı ilə
C) Vezuvinlə
D) Fuksinlə
E) Gensian violetlə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 30-32

551) Qram müsbət bakteriyalar nə rəngdə olur?

A) Qızılı rəng
B) Qəhvəyi rəng
C) Qırmızı moruğu
D) Bənövşəyi rəng
E) Göy rəng

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 30-32

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

552) Qram müsbət bakteriyalar hansı boyaqla rənglənir?

A) Gensian violetlə
B) Neyser abısı ilə
C) Lyuqol məhlulu ilə
D) Fuksinlə
E) Metilen göyü ilə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov,S.Zeynalova,İ.Əhmədova,A.Bayramov "Tibbi mikrobiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair" Bakı.1998. . Səh. 30-32

553) Kapsulanı aşkar etmək üçün ən çox hansı boyama üsulundan istifadə olunur?

A) Romanovski-Gimza
B) Ojeşko
C) Sil-Nilsen
D) Burri-Hins
E) Qram

Ədəbiyyat: H.İbrahimov,S.Zeynalova,İ.Əhmədova,A.Bayramov "Tibbi mikrobiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. . Səh. 36-37

554) Turşuya davamlı bakteriyalar hansı üsulla boyanır?

A) Sil-Nilsen
B) Ojeşko
C) Burri-Hins
D) Romanovski-Gimza
E) Qram

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 35-36

555) Əksər bakteriyalar üçün hansı diferensial-diaqnostik boyama üsulundan istifadə edilir?

A) Qram
B) Burri-Hins
C) Ojeşko
D) Sil-Nilsen
E) Romanovski-Qimza

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı .1998. Səh. 30-32

556) Bakteriyaların hərəkətliliyini təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

A) Asılan damla
B) Kağız disklər
C) Seroloji

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Driqalski
E) Appelman

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 39-40

557) Pasterizasiya hansı temperaturda necə müddətə aparılır?

A) 100° C-də; 60 dəqiqə
B) 56-58°C-də; 1 gün
C) 30° C-də; 20 dəqiqə
D) 65-70° C-də; 1 saa
E) 60° C-də; 5 dəqiqə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 56

558) Təzyiq altında buxarla sterilizasiya hansı aparatda aparılır?

A) Krotov aparatında
B) Paster peçində
C) Avtoklavda
D) Anaerostatda
E) Termostatda

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 57-59

559) Qabların sterilizasiyası hansı aparatda aparılır?

A) Krotov aparatında
B) Paster peçində
C) Termostatda
D) Avtoklavda
E) Anaerostatda

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 54

560) Bakteriyaların sporlu formalarının məhv edilməsi hansı aparatda aparılır?

A) Avtoklavda 1,5 atmosfer təzyiqində
B) Paster peçində
C) Kox aparatında
D) Zeyts süzgəcində
E) Termostatda

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 57-59

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

561) Seroloji reaksiya nədir?

A) Selektiv mühitdə mikroorqanizmin böyüməsi
B) Faqositoz
C) Bakteriya hüceyrəsində cinsi mübadilə
D) Antigenlə anticismin qarşılıqlı təsiri
E) Bakteriofaqın təsiri ilə bakteriyanın lizisi

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 132

562) Komplementin birləşmə reaksiyasında müsbət nəticə hansıdır?

A) Çətir şəklində çökmə
B) İki mayenin sərhədində halqa
C) Düymə şəklində çökmə
D) Laka oxşar qan (hemoliz)
E) Eritrositlərin çökməsi (hemolizin dayanması)

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı .1998. Səh. 153-154

563) Mikroorqanizmlərin antibiotiklərə həssaslığını təyin etmək üçün hansı üsul tətbiq edilir?

A) Appelman
B) Kağız disklər
C) Qratsiya
D) Seroloji
E) Driqalski

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 104-107

564) Aqqlütinasiya reaksiyasında müsbət nəticə hansıdır?

A) Laka oxşar qan
B) Bulanıq halqanın alınması
C) Eritrositlərin çökməsi
D) Çöküntünün əmələ gəlməsi
E) Çöküntünün düymə şəklində alınması

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı .1998. Səh. 132-133

565) Bu xüsusiyyətlərdən hansı antigenə məxsusdur?

A) Toksigenlik
B) Spesifiklik
C) Daxil olduğu orqanizm üçün yad olmaq

Sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Patogenlik
E) Virulentlik

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 123-124

566) Anticisim nədir?

A) Lipopolisaxariddir
B) Mineral maddədir
C) Zülaldır
D) Yağdır
E) Karbohidratdır

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 128

567) Diferensial-diaqnostik qidalı mühitlərdən nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Bakteriyaların diri halda öyrənilməsində
B) Antibiotiklərin həssaslığının təyinində
C) Faqotipin təyinində
D) Müayinə materialının göndərilməsində
E) Təmiz kulturanın alınmasında

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 71-73

568) Sınaq şüşəsində mikroblu duru materialdan maye qidalı mühitə əkin nə ilə aparılır?

A) İynə ilə
B) Tamponla
C) Kolli qələmi ilə
D) Steril pipetka ilə
E) Şpatellə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 77

569) Çəp aqarda əkin nə ilə aparılır?

A) İynə ilə
B) Pipetka ilə
C) İlgəklə
D) Şpatellə
E) Tamponla

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı .1998. Səh. 75

sınaq üz ödənissiz istifadə üçün

570) Düz aqarda əkin nə ilə aparılır?

A) Şpatellə
B) İynələmə yolu ilə
C) Pipetka ilə
D) İlgəklə
E) Tamponla

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı .1998. Səh. 76

571) Yaşadığı mühitdən asılı olaraq bakteriya hüceyrəsinin ölçüsünün və formasının dəyişməsinə nə deyilir?

A) Metobolizim
B) Polimorfizm
C) Simbioz
D) Antaqonizm
E) Metobioz

Ədəbiyyat: Ф.К Черкес, Л.Б.Богоявленская, Н.А.Бельская . « Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 38

572) S-formalı koloniyaların xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Xırda, ulduz şəklində
B) Xırda, uzun, çöp şəklində
C) Hamar, dairəvi, parlaq
D) Girintili, çıxıntılı, selikli
E) Bulanıq, qabarıq

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı .1998. Səh. 81

573) Orta hərarəti sevən mikroblar necə adlanır?

A) Termofil
B) Psixrofil
C) Maksimal
D) Steril
E) Mezofil

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya". Bakı.1995. Səh. 87

574) İsti sevən mikroblar necə adlanır?

A) Steril
B) Psixrofil
C) Mezofil
D) Termofil

tfsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Minimal

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 87

575) Soyuq sevən mikroblar necə adlanır?

A) Mezofil
B) Optimal
C) Steril
D) Termofil
E) Psixrofil

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 87

576) Virulentlik nədir?

A) Törədicinin yayılmasına orqanizmin müdafiə reaksiyasıdır
B) Mikrobun həssaslığıdır
C) Mikrobun patogenlik dərəcəsidir
D) İnsanda xəstəlik yaratmaq qabiliyyətidir
E) Zəif adamlarda xəstəlik törətmədir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 93

577) Anatoksinlər nədən hazırlanır?

A) Donor qanından
B) İmmunoqlobulinlərdən
C) Antitoksik serumlardan
D) Mikrob toksinindən
E) Mikroblardan

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 160

578) Bunlardan hansı immunitetin spesifik amillərinə aiddir?

A) Lizosim
B) Dəri örtüyü
C) Faqositoz
D) İmmunoqlobulinlər
E) Komplement

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 130

579) Lizosim maddəsi harada müşahidə olunur?

A) Tər vəzisində
B) Zərdabda
C) Göz yaşında

Təsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Leykositlərin tərkibində
E) Toksinlərin tərkibində

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 115

580) Qeyri spesifik müdafiənin hüceyrə amilinə nə aiddir?

A) Faqositoz
B) Lizosim
C) Selikli qişalar
D) İmmunoqlobulinlər
E) Dəri

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 116

581) Qalın qan damlası necə fiksasiya olunur?

A) Alov üzərində
B) Asetonda
C) Sülfat turşusu ilə
D) Romanovski-Gimza boyağı ilə
E) Fiksasiyasız havada tozdan qorunma

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 309

582) Hansı xəstəliklərdə qeyri steril immunitet müşahidə olunur?

A) Vərəm
B) Taun
C) Qrip
D) Qızılça
E) Vəba

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 113-114

583) Vaksin vurmaqla immunitetin hansı növünü yaratmaq olar?

A) Süni fəal
B) Təbii (növ)
C) Süni passiv
D) Təbii qazanılmış
E) Qeyri-steril immunitet

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 112

584) Virulentliyi zəiflədilmiş mikroblardan hazırlanmış vaksinlər necə adlanır?

A) Diri

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

B) Ölü
C) Kimyəvi
D) Autovaksin
E) Anatoksin

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 159

585) Mikrobun ekzotoksinini formalin və isti ilə zərərsizləşdirməklə hansı vaksin növü alınıb?

A) Polivaksin
B) Kimyəvi
C) Autovaksin
D) Anatoksin
E) Diri

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 160

586) Stafilokoklar yaxmada necə yerləşir?

A) Topa halında
B) Tək-tək
C) Cüt-cüt
D) Qısa zəncir
E) Zəncirvari

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 171

587) Stafilokok infeksiyalarının müayinəsi üçün götürülən irin hansı mühitə əkilir?

A) Yumurta-sarısı duz aqarı
B) Kozein kömür aqarı
C) Leffler
D) Ressel mühiti
E) Klauberq

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 175

588) Düz aqarda əkin nə məqsədlə aparılır?

A) Aerob bakteriyaları əkmək üçün
B) Təmiz mikrob əldə etmək
C) Morfoloji xüsusiyyətləri öyrənmək üçün
D) Jelatini nə formada əritdiyini müşahidə etmək
E) Bakteriyaların antibiotiklərə həssaslığını öyrənmək üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 76

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

589) Stafilokok infeksiyaları zamanı müayinə üçün nə götürülür?

A) Su
B) Onurğa beyni mayesi
C) Plevra mayesi
D) Burun-udlaqdan selik
E) İrin

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 174

590) Kokların hansı növünü ayırmaq üçün plazmokoaqulyasiya reaksiyası qoyulur?

A) Qonokok
B) Stafilokok
C) Pnevmokok
D) Streptokok
E) Meninqokok

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 173

591) Morfoloji quruluşuna görə streptokoklar nə formadadır?

A) Şara bənzərdir
B) Lanset şəkilli diplokokdur
C) Paxlaya oxşar diplokokdur
D) Sarsindir
E) Tetrakokdur

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 176

592) Streptokoklar yaxmada necə yerləşir?

A) Cüt-cüt
B) Topa halında
C) Şam alovuna bənzər
D) Üzüm salxımı formasında
E) Qısa və uzun zəncir formasında

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 176

593) Streptokok infeksiyası zamanı müayinə ücün nə götürülür?

A) Mədənin yuyuntu suyu
B) Onurğa beyni mayesi
C) Bəlğəm
D) Burundan ifrazat
E) Qan

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 176

594) Streptokoklar hansı xəstəlikləri törədir?

A) Meningit
B) Süzənək
C) Dizenteriya
D) Blennoreya
E) Skarlatina

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 179

595) Streptokokları yetişdirmək üçün hansı qidalı mühit lazımdır?

A) Kazein-kömür aqarı
B) Klauberq mühiti
C) Duzlu aqar
D) Yumurta sarısı duz aqarı
E) Qanlı aqar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 177

596) Morfoloji qurluşuna görə pnevmokoklar nə formadadır?

A) Şara bənzər
B) Tetrakok
C) Paxla şəkilli kok
D) Lanset şəkilli diplokok
E) Sarsin

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 183

597) Pnevmokoklar yaxmada necə görünür?

A) Uzun zəncir formasında
B) Lansetşəkilli diplokok formasında
C) Üzüm salxımı formasında
D) Tək-tək
E) Topa halında

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 175

598) Pnevmokok infeksiyası zamanı müayinə üçün hansı material götürülür?

A) Bəlğəm
B) Qusuntu kütləsi
C) Onurğa beyni mayesi

sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sidik
E) Mədənin yuyuntu suyu

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 177

599) Pnevmokoklar hansı xəstəlikləri törədir?

A) Skarlatina
B) Blennoreya
C) Krupoz pnevmoniya
D) Süzənək
E) Dizenteriya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 185

600) Pnevmokokları yetişdirmək üçün hansı qidalı mühitlərdən istifadə olunur?

A) Ətli peptonlu aqar
B) Serumlu aqar
C) Ətli peptonlu bulyon
D) Duzlu aqar
E) Yumurta sarısı duz aqarı

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 184

601) Meninqokokların morfoloji quruluşu necədir?

A) Mikrokokdur
B) Şara bənzərdir
C) Sarsindir
D) Paxla şəkilli, cüt-cüt yerləşən koklardır
E) Lanset şəkilli diplokoklardır

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 187

602) Meninqokok infeksiyasında xəstəliyin mənbəyi nədir?

A) Birələr
B) Xəstə heyvanlar
C) Ağcaqanadlar
D) Xəstə adamlar
E) Gənələr

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 189

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

603) Meninqokoklar yaxmada necə yerləşir?

A) Topa-topa
B) Üzüm salxımı formasında
C) Paxlaya oxşar diplokok halında
D) Tək-tək
E) Qısa zəncir halında

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 190

604) Meninqokok infeksiyası zamanı müayinə ücün hansı material götürülür?

A) Bəlğəm
B) Qusuntu kütləsi
C) Sidik
D) Onurğa beyni mayesi
E) Mədənin yuyuntu suyu

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 190

605) Meninqokoklar hansı xəstəlikləri törədir?

A) Revmatizm
B) Qızıl yel
C) Pnevmoniya
D) Skarlatina
E) Epidemik serebrospinal meningit

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 189

606) Meninqokokları yetişdirmək üçün hansı qidalı mühitlərdən istifadə olunur?

A) Leffler mühiti
B) Kazein-kömür aqarı
C) Klanberq mühiti
D) Qanlı aqar
E) Serumlu aqar

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 178

607) Qonokokların morfoloji quruluşu necədir?

A) Kofe dənəsinə oxşar diplokokdur
B) Lansetşəkilli diplokokdur
C) Sarsindir
D) Şarabənzər
E) Zəncir əmələ gətirən kokdur
Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 191

smskaz ödənişsiz istifadə üçün

608) Qonokoklar yaxmada necə yerləşir?

A) Zəncir formasında
B) Tək-tək
C) Diplokok formasında
D) Üzüm salxımı formasında
E) Lansetşəklində

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 180

609) Qonokok infeksiyası zamanı müayinə üçün hansı material götürülür?

A) Qusuntu
B) Sidik
C) Mədənin yuyuntu suyu
D) Uretradan gələn möhtəviyyat
E) Onurğa beyni mayesi

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 180

610) Qonokoklar hansı xəstəliyi törədir?

A) Süzənək
B) Skarlatina
C) Meningit
D) Pnevmoniya
E) Qızıl yel

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 193

611) Bağırsaq çöpləri hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Xırda, oval çöplərdir
B) Hər iki ucu sancaqşəkilli, əyilmiş çöplərdir
C) Hərəkətsiz çöplərdir
D) Ucları kəsilmiş və ya əyilmiş bakteriyalardır
E) Çöpşəkilli bakteriyalardır

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 197

612) Bu xəstəliklərdən hansı bağırsaq infeksiyalarına aiddir?

A) Göyöskürək
B) Meningit
C) Tulyaremiya
D) Difteriya
E) Kolienterit

Sırf az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 197

613) Bağırsaq çöpünü tədqiq etmək üçün hansı müayinə materialı götürülür?

A) Əsnəkdən selik
B) Yaradan götürülmüş möhtəviyyat
C) İrin
D) Bəlğəm
E) Nəcis

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 183

614) Endo mühitində bağırsaq çöpü nə rəngdə koloniyalar əmələ gətirir?

A) Bənövşəyi
B) Qırmızı
C) Qara
D) Sarı
E) Rəngsiz

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 183

615) Bağırsaq infeksiyaları törədicilərini yetişdirmək üçün hansı qidalı mühitdən istifadə olunur?

A) Duzlu bulyon
B) Mak-Koy
C) Endo
D) Leffler
E) Klauberq

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 183

616) Levin mühitində bağırsaq çöpü koloniyası nə rəngdədir?

A) Sarı
B) Göy bənövşəyi
C) Qara
D) Moruğu
E) Rəngsiz

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 200

617) Bağırsaq çöpünün müayinəsi üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

A) Seroloji

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Mikroskopik
C) Bakterioloji
D) Allergik
E) Bioloji

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 184

618) Salmonellalar hansı xəstəliyin törədiciləridir?

A) Qarın yatalağı
B) Göyöskürək
C) Tetanus
D) Botulizm
E) Kandidozlar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 200

619) Salmonellalar hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Xırda, ucları dairələnmiş çöplərdir
B) Hər iki ucu sancaqşəkilli çöplərdir
C) Təbil çubuğuna oxşar çöplərdir
D) Ucları kəsilmiş çöplərdir
E) Hərəkətsiz çöplərdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 202

620) Qarın yatalağına şübhə olduqda qan hansı mühitə əkilir?

A) Ətli peptonlu bulyon
B) Öd bulyonu
C) Peptonlu su
D) Kazeinli bulyon
E) Şəkərli bulyon

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 185

621) Salmonelloza şübhə olduqda nəcis hansı mühitə əkilir?

A) Şəkərli bulyona
B) Peptonlu suya
C) Selenitli mühitə
D) Ətli-peptonlu bulyona
E) Kozeinli bulyona

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 207

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

622) Qarın yatalağının seroloji diaqnozunda hansı reaksiya tətbiq olunur?

A) Presipitasiya
B) Vidal
C) Xeddelson
D) Vasserman
E) Rayt

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 187

623) Endo mühitində qarın yatalağı koloniyaları nə rəngdə olur?

A) Rəngsiz şəffaf, parlaq
B) Qara
C) Yaşıl
D) Moruğu
E) Bənövşəyi

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва.1987. Səh. 289

624) Dizenteriya bakteriyalarının morfoloji quruluşu necədir?

A) Təbil çubuğuna oxşar
B) Kiçik hərəkətli
C) Oval formasındadır
D) Hər iki ucu sancaqşəkilli
E) Ucları dairələnmiş hərəkətsiz çöplərdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya". Bakı.1995. Səh. 213

625) Ploskiryev mühitində dizenteriya koloniyaları nə rəngdə olur?

A) Rəngsiz şəffaf
B) Moruğu
C) Qara
D) Yaşıl
E) Bənövşəyi

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı.1998. Səh. 192

626) Dizenteriya zamanı müayinə ücün hansı material götürülür?

A) İrin
B) Sidik
C) Qusuntu kütləsi
D) Qan
E) Nəcis

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 192

627) Dizenteriya törədiciləri hansı qidalı mühitdə yetişdirilir?

A) Süd duz aqarı
B) Ploskiryev
C) Duzlu aqar
D) Vismut- sulfit aqarı
E) Klauberq

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 192

628) Xüsusi təhlükəli infeksiyalara nələr aiddir?

A) Göy öskürək
B) Qrip
C) Vəba
D) Difteriya
E) Meningit

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 217

629) Vəba törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Oval formada
B) Hər iki ucu sancaqşəkilli
C) Təbil çubuğuna oxşar
D) Vergül förmasında əyilmiş çöpdür
E) Ucları dairələnmiş hərəkətsiz

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 218

630) Vəba ilə yoluxma yolları hansılardır?

A) Hava
B) Torpaq
C) Həşaratlar
D) Alimentar
E) Təmas-məişət

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 219

631) Vəba vibrionu üçün elektiv mühit hansıdır?

A) Vismut sulfit aqar
B) Peptonlu su
C) Selenitli bulyon

ensk az odanışsız istifadə üçün

D) Duzlu bulyon
E) Ploskiryev

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 195

632) Vəba vibrionunu yetişdirmək üçün qidalı mühitin pH neçə olmalıdır?

A) 6,5-7,1
B) 7,0-7,2
C) 5,6-6,5
D) 8,9
E) 7,2-7,6

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва.1987. Səh. 320

633) Vəba zamanı müayinə ücün hansı material götürülür?

A) Qan
B) Əsnəkdən selik
C) Sidik
D) İrin
E) Nəcis

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı.1998. Səh. 194

634) Xüsusi təhlükəli infeksiyalar qrupuna nələr aiddir?

A) Taun
B) Meningit
C) Qrip
D) Göy öskürək
E) Difteriya

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 318

635) Taun törədicisini kim kəşf etmişdir?

A) Neyser
B) Salmon
C) Eşerix
D) İersen və Kitazato
E) Kox

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 240

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

636) Taun törədicisi hansı cinsə aiddir?

A) Şiqella
B) İersinya
C) Mikobakteriya
D) Klostridiya
E) Korinebakteriya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 240

637) Tulyaremiya törədicisi hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Oval formalı çöp
B) Ucları dairələnmiş
C) Təbil çubuğuna oxşar
D) Kiçik kokabənzər bakteriya
E) Ucları sancaq şəkilli

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 252

638) Tulyaremiya xəstəliyinin keçiricisi nədir?

A) Xırda buynuzlu mallar
B) Bitlər
C) İnsanlar
D) Gəmiricilər
E) İtlər

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 253

639) Preparat nəyə deyilir?

A) Rənglənmiş yaxmaya
B) Qandn hazırlanmış yaxmaya
C) Fiksasiya olunmuş yaxmaya
D) İrindən hazırlanmış yaxmaya
E) Basma yaxmaya

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская «Микробиология» «Медицина» Москва .1987. Səh. 47

640) Qara yara törədicisi hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Ucları dairələnmiş
B) Kiçik kokabənzər
C) Oval formalı
D) İri, ucları əyilmiş və ya kəsilmiş
E) Təbil çubuğuna oxşar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 256

sınaq üçün istifadə üçün

641) Hansı bakteriyalara klostridiumlar deyilir?

A) Spiralvarilərə
B) Sarsinlərə
C) Spor əmələ gətirən aerob bakteriyalara
D) Spor əmələ gətirməyən mikroorqanizmlərə
E) Spor əmələ gətirən anaerob bakteriyalara

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya". Bakı.1995. Səh. 15

642) Qara yarada infeksiya mənbəyi nədir?

A) Bitlər
B) Xəstə heyvanlar
C) Milçəklər
D) Xəstə insanlar
E) Gənələr

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya". Bakı.1995. Səh. 258

643) Qarayara xəstəliyinin diaqnozu hansı reaksiyaya əsasən qoyulur?

A) Vasserman
B) Askoli
C) Xeddelson
D) Vidal
E) Rayt

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 260

644) Qara yara çöplərinə xas koloniya hansıdır?

A) Hamar
B) Qırışlı, şir başına oxşar
C) Şeh damlasına oxşar
D) Dalğavari
E) Parlaq, civə damcısına oxşar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya". Bakı.1995. Səh. 256

645) Xüsusi təhlükəli infeksiyalara aid xəstəlik hansıdır?

A) Difteriya
B) Brüselyöz
C) Göy öskürək
D) Vərəm
E) Qazlı qanqrena

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987 Səh. 318

646) Brüselyoz törədicisi hansı morfoloji quruluşa malikdir?

A) Sancaq şəkillidir
B) Xırda, kokabənzər bakteriyalardır
C) Ucları kəsilmiş
D) Ucları dairələnmişdir
E) Təbil çubuğuna oxşar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya". Bakı.1995. Səh. 248

647) Brüselyozda infeksiya mənbəyi nədir?

A) Gəmiricilər
B) Pişiklər
C) İri və xırda buynuzlu mallar
D) İnsan
E) Milçəklər

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya".Bakı.1995. Səh. 249

648) Brüselyozun diaqnozunda hansı reaksiya qoyulur?

A) Rayt
B) Pirke
C) Vasserman
D) Vidal
E) Askoli

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov,S.Q. Orucov, A.B. Şükürov, K.İ. Əhmədova, L.H. İsmayılova. "Mikrobiologiya və mikrobioloji müayinə üsulları. Bakı .2003. Səh. 282

649) Brüselyoz zamanı hansı sınaqlar qoyulur?

A) Pizu
B) Şik
C) Dik
D) Bürne
E) Mantu

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 205

650) Brüselyoz törədiciləri hansı qidalı mühitlərdə inkişaf edir?

A) Endo mühiti
B) Ətli peptonlu aqar

Elnsk az ödənişsiz istifadə üçün

C) Qliserinli kartoflu aqar
D) Jelatinli mühit
E) Ploskiryev mühiti

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair”Baki 1998. Səh. 202

651) Brüselyozda müayinə ücün hansı material götürülür?

A) Qusuntu kütləsi
B) İrin
C) Qan
D) Bəlğəm
E) Onurğa beyni mayesi

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 202

652) Göyöskürək törədicisi hansı cinsə daxildir?

A) Klostridiya
B) Korinebakteriya
C) Şigella
D) Bordetella
E) Mikobakteriya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 261

653) Göyöskürək törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Oval formalı kiçik çöplərdir
B) Xırda, kokabənzərdir
C) Təbil çubuğuna oxşardır
D) Sancaqşəkillidir
E) Ucları kəsilmişdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”.Bakı.1995. Səh. 261

654) Göyöskürək zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

A) Birələr
B) Xəstə adam
C) Ağcaqanadlar
D) İri buynuzlu mal
E) Gəmiricilər

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı. 1995. Səh. 262

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

655) Göyöskürək zamanı müayinə ücün hansı material götürülür?

A) Onurğa beyni mayesi
B) Qusuntu kütləsi
C) Qan
D) İrin
E) Burun-udlağın selikli qişasından möhtəviyyat

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 361

656) Göyöskürəklə qeyri həqiqi göyöskürəyi ayırmaq üçün hansı sınaq qoyulur?

A) Mantu
B) Şik
C) Bürne
D) Tirozin
E) Askoli

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 364

657) Göyöskürək törədiciləri əkilmiş qidalı mühitə penisillin nə məqsədlə əlavə olunur?

A) Qida komponenti kimi
B) Mühitin pH-nı dəyişmək üçün
C) Qidalı mühitə bərklik vermək üçün
D) Kənar mikrofloranın böyüməsini saxlamaq üçün
E) Quraqlıqdan qorunmaq üçün

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. « Микробиология» «Медицина» Москва .1987. Səh. 362

658) Kozein kömür aqarında bitmiş göyöskürək kolonuyaları nə formadadır?

A) Civə damcısı kimi
B) Kiçik,ortası bərk
C) Şir başına oxşar
D) Quru qırışıq
E) Böyük yastı

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 358

659) Difteriya törədicisi hansı cinsə aiddir?

A) Korinebakterium
B) Şigella
C) Klostridiya

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Mikobakteriya
E) Bordetella

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 290

660) Difteriya törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Bir qədər əyilmiş,nazik çöplərdör
B) Ovaldır
C) Xırda, kokabənzərdir
D) Sancaq şəkillidir
E) Ucları kəsilmişdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 290

661) Difteriya törədicilərini yetişdirmək üçün hansı qidalı mühitlərdən istifadə olunur?

A) Endo
B) Ploskiriyev
C) Kazein kömür aqarı
D) Klauberq
E) Qanlı aqar

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 366

662) Difteriyada infeksiya mənbəyi nədir?

A) Gəmiricilər
B) Xəstə adamlar, bakteriya daşıyıcıları
C) Pişiklər
D) İtlər
E) İri buynuzlu mallar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 293

663) Vərəm törədicisi hansı cinsə aiddir?

A) Mikobakteriya
B) Bordetella
C) Klostridiya
D) Salmonella
E) Korinebakteriya

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 298

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

664) Vərəm törədicisi hansı morfoloji xüsusiyyətə malikdir?

A) Düz, nazik çöplərdir
B) Təbil çubuğuna oxşardır
C) Ucları dairələnmişdir
D) Koklardır
E) Ucları kəsilmişdir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya" Bakı. 1995. Səh. 299

665) Vərəm törədicisini aşkar etmək üçün yaxmalar hansı boyama üsulu ilə boyanır?

A) Ojeşko
B) Romonovski-Gimza
C) Bürri
D) Sil-Nilsen
E) Qram

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 35

666) İnsanların vərəmlə yoluxmasını müəyyən etmək üçün hansı sınaq qoyulur?

A) Şik
B) Pizu
C) Mantu
D) Dik
E) Bürne

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 225

667) Patogen anaerobların klostridium cinsinə hansı törədicilər aiddir?

A) Vərəm
B) Tetanus
C) Tulyaremiya
D) Difteriya
E) Taun

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya" Bakı.1995. Səh. 274

668) Tetanus çöpü hansı formadadır?

A) Streptobasil
B) Təbil çubuğu
C) Düz, nazik çöp `
D) Sancaqşəkilli
E) Sporu mərkəzdə yerləşən çöp

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”Bakı.1995. Səh. 275

669) Tənəffüsünə görə tetanus törədiciləri hansı qrupa aiddir?

A) Fakultativ anaerob
B) Obliqat aerob
C) Aerob
D) Anaerob
E) Obliqat anaerob

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 275

670) Obliqat anaeroblara hansı törədicilər aiddir?

A) Tetanus klostridiumu
B) Dizenteriya törədicisi
C) Qarın yatalağı
D) Göyöskürək
E) Vəba

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı. 1995. Səh. 275

671) Patogen anaerobların klostiridium cinsinə hansı törədicilər aiddir?

A) Vərəm
B) Qazlı qanqrena
C) Difteriya
D) Tulyaremiya
E) Taun

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 278

672) Qazlı qanqrena törədicisi hansı formadadır?

A) Təbil çubuğu
B) Sancaqşəkilli
C) Düz, nazik çöplərdir
D) İri, polimorf çöplərdir
E) Streptobatsil

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 278

673) Qazlı qanqrena törədiciləri qidalı mühitdə necə koloniyalar əmələ gətirir?

A) Civə damcısı kimi
B) Böyük yastı
C) Sütunlu aqarın dərinliyində mərciyəbənzər diskşəkilli
D) Şir başına oxşar
E) Xırda buzcuqlar kimi

sok.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 282

674) Aşağıdakı törədicilərdən hansılar spor əmələ gətirir?

A) Bağırsaq çöpü
B) Vəba
C) Botulizm
D) Şigellalar
E) Salmonellalar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 285

675) Botulizm törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Sancaqşəkilli
B) Streptobatsil
C) Təbil çubuğu
D) Ucları girdə, polimorf çöplərdir
E) Düz, nazik çöplər

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 285

676) Obliqat anaeroblara hansı törədicilər aiddir?

A) Qarın yatalağı
B) Vəba
C) Göyöskürək
D) Dizenteriya
E) Botulizm

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı .1995. Səh. 285

677) Patogen spiroxetlərə hansı törədicilər aiddir?

A) Sifilis törədicisi
B) Qarın yatalağı
C) Vəba
D) Dizenteriya
E) Botulizm

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 311

678) Sifilis törədicisinə nə üçün solğun spiroxeta deyilir?

A) Romonovski-Gimza üsulu ilə göy-bənövşəyi boyandığına görə
B) Qram üsulu ilə solğun boyandığına görə
C) Romanovski-Gimza üsulu ilə solğun boyandığına görə
D) Qram üsulu ilə çəhrayı rəngə boyandığına görə
E) Metilen abısı ilə göy rəngə boyandığına görə

sirsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 312

679) Sifilisin seroloji müayinəsində hansı reaksiya tətbiq edilir?

A) Vasserman
B) Pirket
C) Rayt
D) Xeddelson
E) Vidal

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 235

680) Qayıdan yatalaq törədicisi hansı cinsə aiddir?

A) Treponema
B) Klostridiya
C) Mikobakteriya
D) Salmonella
E) Borrellia

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı. 1995. Səh. 314

681) Rikketsiyaların morfoloji quruluşu necədir?

A) Nazik, düz çöplərdir
B) Polimorf, kokşəkilli mikroblardır
C) Bir qədər əyilmiş çöplərdir
D) Qıvrım spiralşəkillidir
E) Sancaqşəkillidir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı .1995. Səh. 319

682) Virusları hansı mühitlərdə yetişdirirlər?

A) Qanlı aqarda
B) Toxuma kulturasında
C) Serumlu mühitdə
D) Şəkərli bulyonda
E) ƏPA

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı. 1995. Səh. 258

683) Suyun qiymətləndirilməsinin sanitar göstəricisi nədir?

A) Bağırsaq çöpü
B) Protey
C) Meninqokok
D) Stafilokok

sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Difteriya çöpü

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская . «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 476

684) Bu antigenlərdən hansı biri hüceyrənin qamçısı ilə əlaqədardır?

A) H-antigen
B) K- antigen
C) O- antigen
D) Vi- antigen
E) Protektiv antigen

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya"Bakı .1995. Səh. 124

685) Aşağıdakilardan hansı ərzaq məhsullarının sanitar göstərici mikrobudur?

A) Difteriya çöpü
B) Qonokok
C) Sarsin
D) Meninqokok
E) Bağırsaq çöpü

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. « Микробиология» «Медицина» Москва .1987. Səh. 492

686) Əllərin yuyuntu suyunun sanitar bakterioloji müayinəsində nəyi aşkar etmək olar?

A) Qonokok
B) Qızılı stafilokok
C) Difteriya çöpü
D) Meninqokok
E) Pnevmokok

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. « Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 500

687) Patogen ibtidailərə aşağıdakı törədicilərdən hansılar aiddir?

A) Spiroxet
B) Mikobakteriya
C) Qrip
D) Malyariya plazmodisi
E) Vəba

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya". Bakı. 1995. Səh. 403

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

688) Malyariya plazmodisinin cinsi inkişaf dövrü harada gedir?

A) Havada
B) İnsan orqanizmində
C) Suda
D) Dişi ağcaqanadın bədənində
E) Quşlarda

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı. 1995. Səh. 403

689) Malyariya zamanı qandan hazırlanmış qalın damla hansı üsulla boyanır?

A) Romanovski-Gimza
B) Sil-Nilsen
C) Burri
D) Qram
E) Ojeşko

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 309

690) Malyariya zamanı müayinə ücün hansı material götürülür?

A) Qan
B) Əsnəkdən selik
C) Qusuntu kütləsi
D) İrin
E) Sidik

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 309

691) Leyşmaniyalar hansı xəstəlikləri törədir?

A) Lyamblioz
B) Dermatomikoz
C) Qarayara
D) Qara azar (visseral leyşmanioz)
E) Trixomonoz

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 393

692) Toksoplazmozda infeksiya mənbəyi nədir?

A) Ağcaqanadlar
B) Pişiklər
C) Bitlər
D) Birələr
E) Gənələr

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı .1995. Səh. 402

693) Toksoplazmoz törədicisinin morfoloji quruluşu necədir?

A) Oval ucları burulmuş
B) Ulduz forması
C) Oval ucları şiş
D) Aypara və ya portağal dilimi şəklində
E) Uzun çöp

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 400

694) Bu xüsusiyyətlərdən hansı anticismə aiddir?

A) Toksigenlik
B) Spesifiklik
C) Virulentlik
D) Patogenlik
E) Antigen qıcıqlandırması nəticəsində yaranma

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı .1995. Səh. 128

695) Patogen göbələklər insanlarda hansı xəstəlikləri törədir?

A) Leyşmanioz
B) Lyambliyoz
C) Brüselloz
D) Trixofitiya
E) Toksoplazmoz

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı. 1995. Səh. 378

696) Təmiz kultura nədir?

A) Bərk qidalı mühitdə mikrobların əmələ gətirdiyi populyasiyadır
B) Qidalı mühitdə becərilən mikroorqanizmlərdir
C) Yalnız bir növ mikrob olan kulturadır
D) Bir mikrob hüceyrəsindən inkişaf edən mikrob populyasiyasıdır
E) Bir və ya bir neçə mənbələrdən alınmış eyni növlü mikrob kulturasıdır

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı. 1995. Səh. 12

697) Dermatomikoz zamanı müayinə üçün hansı material götürülür?

A) Qan
B) Bəlğəm
C) Qusuntu
D) Zədələnmiş dırnaq qırıntıları

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) İrin

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair”Bakı. 1998. Səh. 292

698) Qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu virusların hansı fəsiləsinə aiddir?

A) Retroviruslar
B) Rabdoviruslar
C) Herpes viruslar
D) Papoviruslar
E) Adenoviruslar

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 364

699) Əkin zamanı nə üçün aseptik şərait yaradılır?

A) Mikrobları saxlamaq üçün
B) Qidalı mühitin səthinə havadan əlavə mikrobların düşməməsi üçün
C) Mikrobların böyüməsini zəiflətmək üçün
D) Mikrobları məhv etmək üçün
E) Mikrobların yetişməsini sürətləndirmək üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 76

700) Havanın sanitar bakterioloji müayinəsi hansı üsulla aparılır?

A) Bioloji
B) Brodil
C) Sedimentasiya
D) Membran filtirlər üsulu
E) Faqotipaj üsulu

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская Микробиология «Медицина» Москва 1987. Səh. 485

701) Nazik qan yaxması necə fiksasiya olunur?

A) Asetonla
B) Turşu buxarı ilə
C) Formalinlə
D) Alov üzərində
E) 96%-li etil spirtində

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı .1995. Səh. 309

snskaz ödənissiz istifadə üçün

702) Qaynatmaqla sterilizasiya hansı aparatda aparılır?

A) Sterilizatorda
B) Paster peçində
C) Kox aparatında
D) Avtoklavda
E) Şamberlan süzgəcində

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 55

703) Hansı bakteriyalara basillər deyilir?

A) Spor əmələ gətirən anaerob bakteriyalara
B) Spiralvarilərə
C) Spor əmələ gətirən aerob bakteriyalara
D) Spor əmələ gətirməyən mikroorqanizmlərə
E) Sarsinlərə

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov "Tibbi mikrobiologiya". Bakı .1995. Səh. 15

704) Seroloji müayinə aparmaq üçün venadan nə qədər qan götürülür?

A) 0,3ml
B) 0,5ml
C) 1ml
D) 2-3ml
E) 5ml

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 25

705) Bakterioloji müayinə üçün venadan nə qədər qan götürülür?

A) 3ml
B) 2ml
C) 4ml
D) 1ml
E) 5-10ml

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 25

706) Pambıq-tənzif tıxacların və tamponların sterilizasiyası hansı aparatda aparılır?

A) Termostatda
B) Aftoklavda 1 atm təzyiqdə 20 dəqiqə
C) Avtoklavda 0,5 atm təzyiqdə 15 dəqiqə
D) Qızdırıcı şkafda
E) Su hamamında

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская Микробиология «Медицина» Москва 1987. Səh. 76

707) Mikrob koloniyası nədir?

A) Bir mikrob hüceyrəsindən inkişaf edən mikrob populyasiyasıdır
B) Qidalı mühitdə hər hansı bir növə mənsub mikrobun yığılmasıdır
C) Qidalı mühitdə becərilən mikroorqanizmlərdir
D) Bir neçə mənbədən alınmış eyni növlü mikrob kulturasıdır
E) Qidalı mühit səthində eyni növlü mikrobun bir yerə yığılmış formasıdır (populyasiyası)

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 81

708) Bakterioloji müayinə üçün götürülən müayinə materialı götürülən andan laboratoriyaya hansı müddətdə çatdırılmalıdır?

A) 5 saat
B) 2 saat
C) 3 saat
D) 1 saat
E) 4 saat

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 25

709) Yaxmalar nə üçün fiksasiya edilir?

A) Mikrobları qurutmaq üçün
B) Asılan damla hazırlamaq üçün
C) Mikrobları diri halda öyrənmək üçün
D) Basma yaxma hazırlamaq üçün
E) Yuma və rəngləmə zamanı mikrob axıb getməsin

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 21

710) İmmunpreparatlar harada saxlanılır?

A) Termostatda
B) Soyuducuda
C) Ayrıca, xüsusi yerdə
D) Qaranlıq yerdə
E) Quru yerdə

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 164

snskazdanişsz istifadə üçün

711) “Mirvari boyunbağı” testinin qoyuluşunda hansı antibiotikdən istifadə edilir?

A) Streptomisin
B) Ampisillin
C) Bisillin
D) Tetrasiklin
E) Penisillin

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 201

712) Bakteriyaların proteolitik xassələrinin təyini üçün hansı qidalı mühitdən istifadə edilir?

A) Saburo mühiti
B) Ətli peptonlu bulyon
C) Öd bulyonu
D) Kozein kömür aqarı
E) Peptonlu su

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 71

713) Maye qidalı mühitləri bərkitmək üçün ona nə əlavə edilir?

A) Aqar-aqar
B) Öd
C) Pepton
D) Şəkər
E) Qan

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 65

714) Mikroorqanizmlərin morfologiyasını öyrənmək üçün hansı müayinə üsulu tətbiq edilir?

A) Mikroskopik
B) Allergik
C) Mikrobioloji
D) Bioloji
E) Seroloji

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 8

715) Qaynatmaqla sterilizasiya zamanı nə üçün distillə suyundan istifadə edilir?

A) Qaynatmanı zəiflətmək üçün
B) Vegetativ mikrobları məhv etmək üçün

tnsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Qaynatmanı sürətləndirmək üçün
D) Suyun codluğunu aradan qaldırmaq üçün
E) Sporları məhv etmək üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 55

716) Alovda qızdırmaqla nəyi sterilizasiya etmək olar?

A) İlgəklər
B) Kolba
C) Sınaq şüşəsi
D) Petri fincanı
E) Şprislər

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 52

717) Fasiləli sterilizasiya nə məqsədlə aparılır?

A) Rezindən hazırlanmış ləvazimatı sterilizasiya etmək üçün
B) Dərman maddələrini sterilizasiya etmək üçün
C) Virusları məhv etmək üçün
D) Qidalı mühitləri sterilizasiya etmək üçün
E) Sporları məhv etmək üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 59

718) Serodiaqnostika nədir?

A) İmmunqlobulinlərin təyini
B) Xəstənin serumunda anticismin təyini
C) Bakteriyanın təmiz kulturasında antigenin təyini
D) Müayinə materialında antigenin təyini
E) Qan qrupunu təyini

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 132

719) Difteriyalı xəstə şəxsin əsnəyindən müayinə materialı nə ilə götürülür?

A) Şüşə çubuqla
B) Alüminium çubuqla
C) Paslanmayan metal məftillə
D) Taxta çubuqla
E) İynə ilə

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская Микробиология «Медицина» Москва 1987. Səh. 371

sınaq üçün istifadə üçün

720) Laborattoriya heyvanları üzərində aparılan təcrübələri öyrənmək üçün hansı üsul tətbiq edilir?

A) Seroloji
B) Bakterioloji
C) Dəri allergik
D) Mikroskopik
E) Bioloji və ya eksperimental üsul

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 9

721) Qanlı aqarda pnevmokok koloniyalarının xarakterik xüsusiyyətləri necədir ?

A) Yaşıllaşmış zona
B) Sarı piqmentli
C) Hemoliz zona
D) Hemolizsiz zona
E) Selikli zona

Ədəbiyyat: L.B.Borisovun redaktəsi ilə “Mikrobiologiyadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik”. Bakı “Maarif” nəşriyyatı 1984. Səh. 163

722) Autovaksinlər nə deməkdir?

A) Xəstədən alınan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob
B) Bir sıra bakteriyaların kimyəvi parçalanma məhsulları
C) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikrobların suspenziyası
D) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi
E) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikrobların ştamı

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 166

723) Aşağıdakılardan hansı O-antigenə aiddir?

A) Lipopolisaxariddir
B) Karbohidratdır
C) Termostabildir, lipopolisaxariddir
D) Termostabildir, zülaldır
E) Termolabildir

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская Микробиология «Медицина» Москва 1987. Səh. 190

724) Yaxmalar –izlər nədən hazırlanır?

A) Qandan
B) Qida məhsullarından
C) Nəcisdən

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Bəlğəmdən
E) Sidiydən

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 20

725) Nikiforov qarışığı ilə aparılan fiksasiya hansı növə aiddir?

A) Morfoloji
B) Bioloji
C) Fiziki
D) Texniki
E) Kimyəvi

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 21

726) Vezuvin hansı rəngli boyaqlara aiddir?

A) Qırmızı
B) Yaşıl
C) Göy
D) Sarı qəhvəyi
E) Qara

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 22

727) Qidalı mühitlərin sterilizasiyası üçün ən geniş yayılan hansı üsuldan istifadə edilir?

A) Quru siti
B) Qızdırmaq
C) Avtoklavlaşdırma
D) Pasterizə etmək
E) Qaynatma

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 67

728) Təmiz mikrob kulturasının əldə edilməsinin ən geniş yayılan üsulu hansıdır ?

A) Driqalski
B) Qratsiya
C) Asılan damla
D) Kağız disklər
E) Appelman

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 80

sask.az ödənişsiz istifadə üçün

729) İçərisində əkin olan Petri kasası nə üçün termostatda tərsinə çevrilib qoyulur?

A) Təmiz kultura almaq üçün
B) Mikrobun yetişməsini sürətləndirmək üçün
C) Əmələ gələn kondensasiya suyunun bitəcək koloniyaların üzərinə tökülməsinin qarşısını almaq üçün
D) Bakteriyaları diri halda öyrənmək üçün
E) Mikrobları məhv etmək üçün

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 81

730) Mikrobların tinktorial xüsusiyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Mikrobların rəng məhlullarına münasibəti
B) Mikrobun identifikasiyası
C) Xarici mühitə davamlılığı
D) Qaynatmağa münasibəti
E) Temperatura münasibəti

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 23

731) Süzmə yolu ilə nəyi sterilizə etmək olar?

A) Südü
B) Meyvə şirələrini
C) Bərk qidalı mühitləri
D) Şprisləri
E) Maye halında olan qidalı mühitləri

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 59

732) Bu mühitlərdən hansı sadə qidalı mühitlərə aiddir ?

A) Qliserinli kartoflu aqar
B) Kozein kömür aqarı
C) Ətli-peptonlu aqar
D) Rappoport mühiti
E) Levin mühiti

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. "Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair" Bakı. 1998. Səh. 65

733) Bu mühitlərdən hansı mürəkkəb qidalı mühitlərə aiddir ?

A) Ətli peptonlu aqar
B) Qliserinli kartoflu aqar
C) Ətli-peptonlu jelatin

sunk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Ətli-peptonlu bulyon
E) Peptonlu aqar

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 65

734) Seroloji reaksiyalar xəstəliyin neçənci günündə qoyulur?

A) Xəstəliyin 2-ci həftəsində
B) Xəstəliyin 3-cü həftəsində
C) Xəstəliyin 1-2-ci günündə
D) Xəstəliyin 1-5-ci günündə
E) Xəstəliyin 5-ci həftəsində

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 132

735) Mikroorqanizlər üçün optimal pH hansıdır?

A) 7.8-8.0
B) 7.2-7.4
C) 9.1-10
D) 8.1-9.0
E) 6.8-7.8

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская Микробиология «Медицина» Москва 1987. Səh. 95

736) Yaxmaların qurudulması harada aparılır?

A) Otaq temperaturunda havada
B) Günəş şüası altında
C) Kox aparatında
D) Paster peçində
E) Avtoklavda

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 20

737) Şüşə qabları sterilizasiyaya necə hazırlayırlar?

A) Silinir
B) Yuyulur, silinir
C) Qurudulur
D) Qaynadılır, qurudulur
E) Yuyulur, qurudulur, kağıza bükülür

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 54

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

738) Kəskin süzənəyin diaqnozunda hansı müayinə üsulundan istifadə edilir?

A) Mikrobioloji
B) Bioloji
C) Allergik
D) Mikroskopik
E) Seroloji

Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 180

739) Morfoloji quruluşuna görə stafilokoklar nə formadadır?

A) Paxlaya oxşar diplokokdur
B) Tetrakokdur
C) Lanset şəkilli diplokokdur
D) Üzüm salxımına bənzərdir
E) Sarsindir

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya”. Bakı.1995. Səh. 171

740) Difteriyanın profilaktikasında immunlaşdırma üçün hansı vaksindən istifadə olunur?

A) Elbert-Qaysk diri vaksini
B) BCJ
C) AGDT
D) Autovaksin
E) Serumlu preparat

Ədəbiyyat: H.H.İbrahimov “Tibbi mikrobiologiya” Bakı.1995. Səh. 295

741) Vərəmin spesifik profilaktikasında hansı vaksındən istifadə edilir?

A) BCJ
B) Poliomielit vaksini
C) Autovaksin
D) Elbert-Qaysk
E) AGDT

Ədəbiyyat: Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А.Бельская. «Микробиология» «Медицина» Москва. 1987. Səh. 380

742) Bakterial ilgəklər necə sterilizasiya olunur?

A) Termostatda saxlanmaqla
B) Buxarla
C) Quru isti ilə
D) Spirt və ya qaz lampası alovunda
E) Qaynatmaqla

Sitik az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 52

743) Pipetkaların yuxarı ucuna nə üçün pambıq taxılır?

A) Material ağıza daxil olmasın
B) Pipetka steril qalsın
C) Təkrar istifadə etmək olsun
D) Pipetkanın içindəki material qurumasın
E) Pipetka sınmasın

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 54

744) Romanovski – Gimza boyağının tərkibi nədən ibarətdir?

A) Qliserin
B) Spirt
C) Metilen göyü
D) Azur, eozin və metilen göyü
E) Gensian violet

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: L.B.Borisovun redaktəsi ilə “Mikrobiologiyadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik”. 1984. “Maarif” nəşriyyatı. Səh. 42

745) Nikiforov məhlulunun tərkibi nədən ibarətdir?

A) Əsası fuksin
B) Kalium yod
C) Qliserin
D) Etil spirti ilə efirin bərabər miqdarda qarışığı
E) Distillə suyu

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 21

746) Sinev kağızından hansı boyama üsulunda istifadə edilir?

A) Neysser
B) Hins-Burri
C) Qram
D) Sil-Nilsen
E) Ojeşko

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 32

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

747) Sinev üsulunda filtr kağızına hansı boyaq hopdurulur?

A) Pfeyffer fuksini
B) Lüqol məhlulu
C) Gensian-violet
D) Metilen göyü
E) Spirt

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 32

748) Anaerob bakteriyaları hansı cihazlarda yetişdirmək olar?

A) Soyuducuda
B) Kox aparatında
C) Paster peçində
D) Avtoklavda
E) Stasionar anaerostatda

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 87

749) Anaerob bakteriyaları becərmək üçün anaerob şərait necə yaradılır?

A) Mühit olduğu kimi qalır
B) Mühitə qan əlavə olunur
C) Qidalı mühitin daxilindən oksigen çıxarılmalıdır
D) Qidalı mühitə vitaminlər əlavə olunur
E) Qidalı mühitə oksigen əlavə olunmalıdır

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.İbrahimov, S. Zeynalova, İ.Əhmədov, A. Bayramov. “Tibbi mikrobiologiyadan tərcübə məşğələlərinə dair” Bakı. 1998. Səh. 86

Bölmə 4.Histologiya, histolojı texnikanın və patolojı sitologiyanın əsasları.

750) Canlı orqanizmin ən xırda vahidi nədir?

A) Tonofibrillər
B) Miofibrillər
C) Hüceyrə
D) Liflər
E) Toxuma

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 12-13 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 9-10

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

751) Hüceyrənin əsas hissələri hansılardır?

A) Vokuolalar, ribosom, mitoxondrialar
B) Plastidlər, sitoplazma, nüvəcik
C) Qlaf, nüvə, sitoplazma
D) Nüvə, lizasom, piqment
E) Piqment, vokuolalar

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 12 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 9

752) Hüceyrənin qlafı neçə qatdan ibarətdir?

A) 2 qatdan
B) 3 qatdan
C) 5 qatdan
D) 1 qatdan
E) 4 qatdan

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 28-29 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 16

753) Hüceyrənin qlafının hansı qatı lipidlərdən təşkil olunub?

A) Xarici və daxili
B) Orta
C) Xariçi
D) Daxili
E) Selikli

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 28-29 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 16-17

754) Hüceyrə qlafının neçə qatı zülallardan təşkil olunub?

A) Orta və daxili qat
B) Daxili və xarici
C) Daxili özlikli qat
D) Orta əzələ qatı
E) Xarici, orta qatı

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 28-29 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 16

755) Sitoplazmanın neçə faizini su təşkil edir?

A) 100
B) 70
C) 60
D) 80

Sınaq az olanışsız istifadə üçün

E) 90

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 17-18 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 10-11

756) Üzvi maddələr sitoplazmanın neçə faizini təşkil edir?

A) 15%
B) 20%
C) 7%
D) 5%
E) 10%

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 17 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 11, 23

757) Hüceyrənin neçə faizini qeyri üzvi maddələr təşkil edir?

A) 3%
B) 8%
C) 6%
D) 15%
E) 10%

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 17 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 11, 23

758) Sitoplazma hansı halda olur?

A) Yumşaq, sərt
B) Bərk, sərt
C) Yarım maye, kolloid
D) Maye, yumşaq
E) Bərk, kolloid

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 26-27 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 17

759) Nüvəsiz hüceyrə hansıdır?

A) Eritrosit
B) Plazmosit
C) Trombosit
D) Histosit
E) Leykosit

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 12-13

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

760) Hüceyrədə nüvənin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) Çoxalma
B) Qidalanma
C) Qıcıqlanma
D) İfrazat
E) Tənəffüs

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 28-29

761) Nüvənin tərkibində olan hansı maddələr boyağı yaxşı qəbul edir?

A) Zülallar
B) Xromatin
C) Karioplazma
D) Yağlar
E) Karbohidratlar

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 49-50 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 28

762) DNT hüceyrənin hansı hissəsində yerləşir?

A) Sitoplazmada
B) Qlafda
C) Lizosomda
D) Ribosomda
E) Nüvədə

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 49-50 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 29

763) RNT hüceyrənin hansı strukturunda yerləşir?

A) Nüvəcikdə
B) Sitoplazmada
C) Nüvədə
D) Lizosomda
E) Mitoxondridə

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 27-28 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 20

764) Orqanizmində neçə növ toxuma vardır?

A) 7
B) 4
C) 6
D) 8

sitk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 21

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 40-41

765) Maddələri bir mühitdən digər mühitə keçirən toxuma hansıdır?

A) Sinir
B) Qan
C) Epitel
D) Birləşdirici
E) Əzələ

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 41

766) Regenerasiya prosesi hansı toxuma növündə daha fəaldır?

A) Epitel
B) Əzələ
C) Sinir
D) Sümük
E) Birləşdirici

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 42-43

767) Hansı toxuma hüceyrələrində tonofibrillər vardır?

A) Sinir toxumasında
B) Qığırdaqda
C) Epitel toxumasında
D) Əzələ toxumasında
E) Birləşdirici toxumada

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh139-141 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 47

768) Hansı üzvlərin epitel hüceyrələrində kirpikciklər yerləşir?

A) Həzm yollarında
B) Böyrəklərdə
C) Tənəffüs yollarında
D) Dalaqda
E) Qara ciyərdə

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 50 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 52-53

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

769) Təkqatlı yastı epitel hüceyrələri necə adlanır?

A) Endoteli
B) Mezoderma
C) Endoderma
D) Mezoteli
E) Mezenxim

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 47 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 51-52

770) Hansı toxuma daxili mühit toxuması adlanır ?

A) Epitel
B) Əzələ
C) Qığırdaq
D) Sinir
E) Birləşdirici

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 162-163 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 52-53

771) Kövşək birləşdirici toxumanın ara maddəsini hansı liflər təşkil edir?
1. Kollagen
2. Fibrin
3. Elastiki
4. Ossein
5. Xondrin
6. Retikulyar

A) 1,3,5
B) 1,3,6
C) 2,3,4
D) 4,5,6
E) 1,2,4

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 61-63 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 62-63

772) Qan damarlarını hansı birləşdirici toxuma əhatə edir?

A) Sümük-qığırdaq
B) Kövşək
C) Sərt lifli
D) Sümük
E) Qığırdaq

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 53 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 62

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

773) Hamiləlikdə qidanın həzm prosesində hansı hüceyrələrin sayı artır?

A) Plazmatik hüceyrələr
B) Tosqun hüceyrələr
C) Piqment hüceyrələri
D) Makrofaq hüceyrələri
E) Piy hüceyrələri

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 64-65 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 65

774) Traxeyanın, bronxların qişasını hansı birləşdirici toxuma təşkil edir?

A) Kövşək
B) Kövşək və qığırdaq
C) Sərt
D) Qığırdaq
E) Sümük

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 226-227 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 68-70

775) Qanın plazmasındakı hansı maddələr qanın laxtalanmasında iştirak etmir?

A) Albuminlər
B) Trombokinaza
C) Qlobulinlər
D) Fibrinogen
E) Azot qalığı

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 166-167 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 55

776) Normal halda qanda neçə eritrosit olmalıdır?

A) 8,5-9,5 x 1012
B) 7,5-9,5 x 1012
C) 6,5-7,5 x 1012
D) 4,5-5,5 x 1012
E) 3,5-4,5 x 1012

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 55

777) Eritrositlərə qırmızı rəng verən nədir?

A) Albumin
B) Qlobulin
C) Fibronogen
D) Fibrin

sik.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Hemoqlobin

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 167-172 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 55

778) Qanda leykositlərin miqdarı nə qədərdir?

A) 4,5 x
B) 7-9 x
C) 5-7 x
D) 6-8 x
E) 5-6 x

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 57 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 78-79

779) Hansı qan hüceyrəsində əlavə cinsi xromatin toplanır?

A) Monositlərdə
B) Neytrofildə
C) Eritrositlərdə
D) Bazofildə
E) Leykositlərdə

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 58 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 79-80

780) Qan lövhəcikləri hansı elementlərdir?

A) Monositlər
B) Eritrositlər
C) Trombositlər
D) Limfositlər
E) Leykositlər

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 60-61 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 81-82

781) Qanın hansı hüceyrəsi bir-birinə yapışmaq qabiliyyətinə malikdir?

A) Limfosit
B) Leykosit
C) Bazofil
D) Trombosit
E) Monosit

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 60-61 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 81-82

sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

782) Vərəm xəstəlikləri zamanı qanda hansı qan hüceyrələrinin sayı artır?

A) Neyrofil
B) Bazofil
C) Monosit
D) Eozonofil
E) Limfosit

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 59-60 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 81

783) Bronxial astma xəstəliyi zamanı hansı qan hüceyrələrin sayı artır?

A) Limfosit
B) Neyrofil
C) Monosit
D) Eozonofil
E) Leykosit

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 176-178 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 58-59

784) Hialin qığırdağı insan orqanizmində harada yerləşir?

A) Fərəqələrdə
B) Sümüklərin üstündə
C) Qida borusunda
D) Oynaq başında, qabırğaların ucunda
E) Qaraciyərdə

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 237-238 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 70

785) Elastiki qığırdaq harada yerləşir?

A) Oynaqlarda
B) Qida borusunda
C) Sümük üstülüyündə
D) Qulaq seyvanında, qırtlaqda
E) Onurğa sütünündə

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 238-239 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 71

786) Hansı hüceyrələr sümük toxumasını qidalandırır?

A) Osteoblastlar
B) Osteosit və osteblastlar
C) Osteoblastlar və osteklastlar
D) Osteoklastlar

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Osteositlər

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 242-243 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 72 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995

787) Hansı xüsusi strukturların hesabına əzələ toxuması yığılır?

A) Miositlərin
B) Tonofibrillə
C) Miofibrillərin
D) Tonofibrilər və miositlərin
E) Neyrofibrillərin

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 259-260 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 75-78

788) Aşağıdakılardan hansının hesabına daxili üzvlərin hərəkəti baş verir?

A) Ürək əzələsi
B) Miositlər
C) Tonofibrillər
D) Eninə-zolaqlı əzələ
E) Saya əzələ

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 253-254 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 75-76

789) Əzələ toxumasının hansı xüsusiləşmiş növü bəbəyin genəlib-daralmasında iştirak edir?

A) Ürək əzələsi
B) Saya və ürək əzələsi
C) Mioepitel
D) Eninə-zolaqlı əzələ
E) Saya əzələ

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 252 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 75

790) Hansı əzələdə tünd və açıq disklər var?

A) Eninə-zolaqlı əzələdə
B) Mioepitel hüceyrələri
C) Ürək əzələsi
D) Ürək əzələsi, mioepitel hüceyrələri
E) Saya əzələdə

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 257-25 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 76-79

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

791) Tünd disklərdə hansı zülaldan ibarətdir?

A) Lipidlər
B) Aktin
C) Pepsin, lipidlər
D) Pepsin
E) Miozin

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 260-265 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 76-77

792) Nazik disklər hansı zülaldan ibarətdir?

A) Miozin
B) Pepsin
C) Qlobulin
D) Aktin
E) Albumin

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 265-266 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 76-79

793) Əzələlərdə enerji mənbəyi kimi, hansı orqanoid fəaliyət göstərir?

A) Fermentlər
B) Sarkosomlar (mitoxondrilər)
C) Ribosomlar
D) Lizosomlar
E) Piqmementlər

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 256-265 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 78

794) Aktin miozinlə nə zaman birləşir?

A) Əzələ açıldıqda
B) Əzələ tam yığıldıqda
C) Durğunluqda
D) İstirahət zamanı
E) Acıldıqda və istirahət zamanı

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 265-267 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 78-79

795) Anastomoz hansı əzələlərdə mövcuddur?

A) Mioepitel hüceyrələrində
B) Saya və ürək əzələsində
C) Eninə-zolaqlı əzələdə
D) Ürək əzələsində

sok.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Saya əzələdə

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 257 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 80

796) Sinir toxuması hansı komponentlərdən ibarətdir?

A) Sinir düyünlərdən və sinirlərdən
B) Limflərdən
C) Liflərdən və sinirlərdən
D) Sinirlərdən
E) Sinir hüceyrələrdən, neyroqliyadan

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 80-81 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 102-103

797) Sinir toxumasının hansı komponenti qıcıqlanır və sinir impulslarını keçirir?

A) Neyrositlər
B) Neyroqliya
C) Sinir lifləri
D) Sinirlər və liflər
E) Sinirlər

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 80 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 102-103

798) Sinir toxumasının hansı komponenti dayaq, trofiki, sekretor və qoruyucu funksiyaları yerinə yetirir?

A) Neyrositlər
B) Neyroqliya
C) Neyrofibrilyar
D) Sinir ucları
E) Sinir duyünləri

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 268 O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 80-81 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 104-105

799) Dendritlə neyrit birləşəndə neyrosit necə adlanır?

A) Bipolyar
B) Multipolyar
C) Biopolyar və unipolyar
D) Yalançı unipolyar
E) Unipolyar

Ədəbiyyat: O.B.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 81 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 102

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

800) Neyroqliyanın hansı növündə kirpikcikli hüceyrələr var?

A) Mikroqliya və astroqliya
B) Oliqodentdroqliya
C) Mikroqliya
D) Ependemqliya
E) Astroqliya

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 85 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 104-105

801) Neyroqliyanın hansı növü trofiki funksiyaya malikdir?

A) Mikroqliya
B) Astroqliya
C) Oliqodentroqliya
D) Ependimqliya
E) Mikroqliya və astroqliya

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 85 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 106

802) Miokardın hüceyrələri necə adlanır?

A) Makrofaqlar
B) Miositlər
C) Fibroblastlar
D) Astrositlər
E) Histositlər

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 95 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 174-175

803) Damarların divarı neçə qatdan təşkil olunub?

A) Orta və xarici qatdan
B) Daxili və orta qatdan
C) Orta qatdan
D) Daxili, xarici qatdan
E) Daxili, orta, xarici qatdan

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 95-96 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 164-169

804) Əsasən hansı qanyaradıcı üzvlərdə eritrositlər, qranulositlər və trombositlər yaranır?

A) Sümük iliyində
B) Limfa düyünlərində
C) Qara ciyərdə

Sırf az ödənişsiz istifadə üçün

D) Timus vəzində
E) Dalaqda

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 98-99 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 198-199

805) Aşağıda göstərilən qanyaradıcı orqanlardan hansı əsas üzv hesab olunur?

A) Sümük iliyi
B) Timus vəzi
C) Dalaq və timus vəzi
D) Dalaq
E) Limfatik düyünlər

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 98-99 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 198-199

806) Hansı toxuma növü qanyarıdıcı üzvləri təşkil edir?

A) Lifli birləşdirici toxuma
B) Epitel toxuması
C) Retikulyar toxuması
D) Kövşək birləşdirici toxuma
E) Əsil birləşdirici toxuma

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 229-230 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 98-99 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 198

807) Hansı halda sümük iliyindən qana nüvəli eritrositlər daxil olur?

A) Qocalma proseslərində
B) Regenerasiya prosesində
C) Patoloji proseslərdə
D) Boy artımında
E) Fizioloji proseslərdə

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 171 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 101-102

808) Hansı qanyaradıcı üzvü bioloji filtir adlandırırlar?

A) Timus vəzini
B) Limfatik düyünləri
C) Dalağı
D) Dalaq və timus vəzi
E) Sümük iliyini

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 104-105

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

809) Dalağın əsas funksiyası nədən ibarətdir?

A) Qan hüceyrələrini toplamaq (depo)
B) Qan hüceyrələrini qorumaq
C) Qan hüceyrələrini udmaq
D) Qan hüceyrələrini parçalamaq
E) Qan hüceyrələrini yaratmaq

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 104-105

810) Orqanizmdə hansı vəzi ən iri vəzidir və orqan kimi fəaliyyət göstərir?

A) Hipofiz
B) Çənəaltı
C) Mədəaltı
D) Dilaltı
E) Qaraciyər

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 114

811) Hansı endokrin vəzi beyin və qabiq qatlarından təşkil olunub?

A) Hipofiz vəzi
B) Qalxanabənzər vəzi
C) Qalxanabənzər ətraf vəzi
D) Epifiz vəzi
E) Böyrəküstü vəzi

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 118

812) Mədəaltı vəzinin hansı hüceyrəsi vəzidəki bütün hüceyrələrin 70 % -ni təşkil edir və insulin hormonu hasil edir?

A) PP-hüceyrələr
B) A-hüceyrələr
C) D-hüceyrələr
D) A və D-hüceyrələr
E) B-hüceyrələr

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 122 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 253-254

813) Mədəaltı vəzinin hansı hüceyrəsi bütün hüceyrələrin 22 % təşkil edir və qlukaqon hormnu hasil edir?

A) D-hüceyrələr
B) B-hüceyrələr

sinak.az odənissiz istifadə üçün

C) A-hüceyrələr
D) PP-hüceyrələr
E) PP və D hüceyrələr

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 122 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 253-254

814) Mədəaltı vəzinin hansı hüceyrəsi digər hüceyrələrin 8 %-ni təşkil edir və samostatin hormonu hasil edir?

A) D-hüceyrələr
B) B və A-hüceyrələr
C) A-hüceyrələr
D) PP-hüceyrələr
E) B-hüceyrələr

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 122

815) Böyrək nefronlarını hansı toxuma təşkil edir?

A) Epitel toxuması
B) Sinir toxuması
C) Sümük toxuması
D) Əzələ toxuması
E) Birləşdirici toxuma

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 124

816) Hansı epitel növü sidik kisəsi və sidik axarlarının epitelini təşkil edir?

A) Çoxqatlı buynuz
B) Təkqatlı
C) Çoxsıralı
D) Keçid
E) Təksıralı

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 150-151 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 127

817) Hansı toxuma toxumluğu əhatə edir?

A) Birləşdirici toxuma
B) Sinir toxuması
C) Epitel toxuması
D) Əzələ toxuması
E) Sümük toxuması

ensk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 134

818) Yumurtalığı hansı toxuma növü təşkil edir?

A) Epitel və birləşdirici toxuma
B) Sinir toxuması
C) Birləşdirici toxuma
D) Əzələ toxuması
E) Qığırdaq toxuması

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 135-136

819) Selikli qişa hansı toxumadan təşkil olunmuşdur?

A) Epitel, birləşdirici toxuma
B) Əzələ toxumasından
C) Epitel, birləşdirici və əzələ qatıdan
D) Epitel qatından
E) Epitel əzələ toxumasından

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 105-106

820) Selikaltı qatı hansı toxuma təşkil edir?

A) Qığırdaq toxuması
B) Əsl birləşdirici toxuma
C) Əzələ toxuması
D) Sinir toxuması
E) Kövşək birləşdirici toxuma

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 106

821) Həzm sisteminin əzələ qatını hansı əzələ təşkil edir?

A) Eninə-zolaqlı və saya əzələ
B) Eninə-zolaqlı əzələ
C) Saya əzələ
D) Saya əzələ və xüsusiləşmiş növlər
E) Ürək əzələsi

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 105-106

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

822) Hansı vəzili hüceyrələr mədənin epitelini regenerasiyasını təmin edir?

A) Oksifil-pariental hüceyrələr
B) Oksifil endokrin hüceyrələr
C) Ara hüceyrələr
D) Əsas hüceyrələr
E) Endokrin funksialı hüceyrələr

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 107

823) Mədədə hansı vəzi hüceyrəsi zülal şirəsi - pepsinogen ifraz edir?

A) Ara və endokrin hüceyrələr
B) Ara hüceyrələr
C) Əsas hüceyrələr
D) Endokrin funksialı hüceyrələr
E) Pariental-okifil hüceyrələr

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 107 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 244-245

824) Dərinin epidermis qatını hansi toxuma növü təşkil edir?

A) Çoxqatlı buynuzlaşmış
B) Çoxsıralı epitel
C) Keçid epiteli
D) Təkqatlı epitel
E) Təksiralı epitel

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 149-150 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 123

825) Dərinin derma qatını hansı toxuma növü təşkil edir?

A) Birləşdirici toxuma
B) Sinir toxuması
C) Epitel toxuması
D) Əzələ toxuması
E) Sümük toxuması

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 123 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 220-221

826) Dəri törəmələri: tər, piy vəziləri, tüklər, dırnaqlar dərinin hansı qatında yerləşir?

A) Sinirlərdə
B) Əzələlərdə
C) Dermada
D) Birləşdirici toxumada

Sırf az ödənişsiz istifadə üçün

E) Epidermisdə

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 124

827) Traxeyanın selikli qişası hansı epitel növü təşkil edir?

A) Çoxqatlı epitel
B) Təkqatlı epitel
C) Təksıralı epitel
D) Vəzili epitel
E) Çoxsıralı kirpikcikli epitel

Ədəbiyyat: M.Abdullayev, H.Abiyev. Ümumi histologiya.1975 səh 146-147 О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 127

828) Alveolların divarında hansı liflər yerləşir?

A) Elastiki liflər
B) Retikulyar liflər
C) Xondrin lifləri
D) Kollogen lifləri
E) Osseyn lifləri

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 127-128 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 214-215

829) Müayinə üçün götürülmüş materialın kəsiyinin qalınlığı neçə mm olmalıdır?

A) 12mm
B) 15mm
C) 10 mm
D) 11mm
E) 5 mm

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 158 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 5-6

830) Fiksasiya nədir?

A) Toxuma strukturlarının bütövlüklə saxlanması
B) Kəsiklərin parafindən azad edməsi
C) Materialın donan mühitə salınması
D) Kəsiklərin əşya şüşəsinə yapışdırılması
E) Kəsiklərin susuzlaşdırılması

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 156-158 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 4

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

831) Fiksəedici məhlul, fiksə olunan materialın həcmindən neçə dəfə çox olmalıdır?

A) 30 dəfə
B) 25 dəfə
C) 20 dəfə
D) 15 dəfə
E) 10 dəfə

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 158

832) Sadə fiksəedicilər hansılardır?

A) Senker, Müller məhlulu
B) Novasin-Krılov məhlulu
C) Formalin, etil, metil, aseton
D) Senker, Maksimov məhlulları
E) Maksimov, Buen, Karnua

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 161-163

833) Mürəkkəb fiksəedici məhlul hansıdır?

A) Aseton
B) Etil spirti
C) Metil spirit
D) Bouin məhlulu
E) Formalin

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 166-168

834) Xüsusi histoloji kəsikləri hazırlayan cihaz necə adlanır?

A) Termostat
B) Mikroskop
C) Sentrifuqa
D) Kriosat
E) Mikrotom

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 189-190 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 4-5

835) Materialı nədən azad etmək üçün yuyurlar?

A) Qliserindən
B) Parafindən
C) Zəhərli maddələrdən
D) Selluloiddən

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Fiksəedicilərin qalıqların çöküntülərindən

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 168-169 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 4-5

836) Preparatları nə üçün rəngləyirlər?

A) Dekansizlətmək üçün
B) Kəsiklərdən donan məhlulları çıxartmaq üçün
C) Toxuma və hüceyrə quruluşunu mikroskopda yaxşı görünsün deyə
D) Toxuma kəsiyini susuzlandırmaq üçün
E) Donan mühitdə saxlamaq üçün

Ədəbiyyat: О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий. Основы гистологии с гистологической техникой.1982 səh 215 B.Qorxmazov, S.Əliyev. Histologiya. 1995 səh 4-5

Bölmə 5. Parazitologiya

837) Analətrafı nahiyyənin müayinəsi üçün hazırlanmış pambıq tampon hansı məhlulda isladılır?

A) 50 %-li qliserin, 1%-li çay sodası
B) 10 %-li HCl
C) Yuyucu toz məhlulu
D) $ZnSO_4$
E) $MgSO_4$

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 182

838) Plazmodium falciparumun (tropik malyariya) qamontları hansı formadadır?

A) Parçalanmış
B) Kiçik dairəvi
C) Aypara şəkilli
D) İri dairəvi
E) Kiçik oval

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 44

839) Adı çəkilən qurd yumurtalarından hansının örtüyü rəngsizdir?

A) Fasiola
B) Enli-lent qurdu
C) Klonorx
D) Ankilostom
E) Paraqonim

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 301

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

840) Laboratoriyaya müayinə üçün bir neçə material çatdırılıb. Laborant hansı materialın müayinəsindən başlamalıdır?

A) İrinli
B) Formalaşmış
C) Yarım formalaşmış
D) Duru patoloji qarışığı olmayan
E) Duru,qanlı-selikli

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 161

841) Bütün helmintlərin yumurtalarını aşkar etmək üçün yararlı olan, hidrofilli sallofon parçalarından istifadə etməklə yerinə yetirilən üsul hansıdır?

A) Kato üzrə qalın yaxma
B) Fülleborn
C) Kalantaryan
D) Berman
E) Qoryaçev

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 172.

842) Uşaq müalicə olunmasına baxmayaraq daimi olaraq enterobioza yoluxur.Nə üçün?

A) Yaxşı yuyulmamış meyvə-tərəvəzlə qidalanır
B) Autoinoaziya baş verir
C) Çirkli oyuncaqlarla oynayır
D) Torpaqla oynayır
E) Çiy su içir

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 98

843) Kato üsulu ilə müayinə zamanı bozumtul-sarı,uzunsov,bir ucunda qabarıq digər ucunda qapaqcıq, içərisində ankosfer olmayan, 75 mkm ölçüdə yumurta aşkar olunub.Bu hansı parazitə məxsusdur?

A) Exinokokk
B) Donuz soliteri
C) Öküz soliteri
D) Kiçik lent qurdu
E) Enli-lent qurdu

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 76

844) Laborant müayinə zmanı 7 nəfərlik ailədə 3 uşaqda bizquyruq aşkar edib. Necə etməli?

A) Digər 4 nəfəri müayinə etmək
B) Ailənin bütün üzvlərini müalicəyə cəlb etmək

Tashkent ödənişsiz istifadə üçün

C) Uşaqları müalicə etmək
D) Uşaqların paltarını dezinfeksiya etmək
E) Uşaqları ailədən ayırmaq

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 99

845) Xəstədə tenioz aşkar edilib. Laborant hansı müayinə üsulunu seçir?

A) İsupov-Proxorov
B) Berman
C) Şurman
D) Xarad və More
E) Nativ yaxma

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 84.

846) Laborant müayinə zamanı limonabənzər sarı-qəhvəyi, hər iki qütbündə açıq rəngli cisimciyi olan yumurtaya rast gəlib. Yumurta hansı qurda məxsusdur?

A) Metaqonim
B) Paraqonim
C) Şistasom
D) Askarid
E) Tükbaşqurd

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 70.

847) Kütləvi müayinələr zamanı nəcisdə strongiolid sürfələrini aşkar etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Fülleborn
B) Şulman
C) Karto
D) Qoryaçev
E) İsupov və Proxorov

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 178.

848) İşlədici qəbul etdikdən sonra xaric olunmuş qurdun öküz teniyası olduğunu laborant necə təyin edə bilir?

A) Başcığın üzərində çoxsaylı qarmaqcıqlar yoxdur
B) Başcığın üzərində 22-32 ədəd qarmaqcıq var
C) Uzunluğu 3 metrə qədərdir
D) Hər yetkin buğumda balalığın 8-12 yan şaxəsi var
E) Buğumlar passivdir

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

849) Duodenal möhtəviyyatın və ödün götürülməsi zamanı hansı məhluldan istifadə olunur?

A) NaOH
B) ZnSO4
C) NaCl
D) HCl
E) 33%-li MgSO4

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 183

850) Dizenteriya amöbünün böyük vegetativ formasının xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

A) Yalançı ayaqların əmələ gəlməməsi
B) Formalaşmış nəcisdə aşkar edilməsi
C) 30-40 mkm ölçüdə olması
D) Sitoplazmada bakteriaların olması
E) Endoplazmasında eritrositin olması

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 16.

851) Dizenteriyanın diaqnozu zamanı yaxmalardan biri nəyə görə lüqol məhlulunda hazırlanır?

A) Sistaları aşkar etmək üçün
B) Parazitin nüvəsini müəyyən etmək üçün
C) Toxuma formasını aşkar etmək üçün
D) Böyük vegetativ formanı aşkar etmək üçün
E) Amöbü hava qabarcıqlarından fərqləndirmək üçün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 16

852) Leyşmaniyozun keçiricisi hansı buğumayaqlıdır?

A) Milçək
B) Bitlər
C) Trakan
D) Birə
E) Mığmığa

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 27

853) Lyambliyanın vegetativ formaları hansı materialda aşkar edilir?

A) Bəlğəmdə
B) Qanda
C) Limfa mayesində
D) Duodeal möhtəviyyatda
E) Sidikdə

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 27

854) Bağırsaq trixomonadının cinsiyyət yollarında patogenlik edə bilməməsinə səbəb nədir?

A) Hərəkəti zəif olduğu üçün
B) Kiçik ölçüdə olduğu üçün
C) Müxtəlif növlər olduğu və müxtəlif qidalanma şəraitinə uyğunlaşdığı üçün
D) 5 qamçılı olduğu üçün
E) Sista əmələ gətirmədiyi üçün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 38.

855) Dördgünlük malyariya zamanı bir eritrositin içərisinə neçə parazit düşür ?

A) Bir
B) Dörd
C) Beş, altı
D) Üç
E) Altı, səkkiz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 43

856) Hansı qida vasitəsi ilə opistorxla yoluxma baş verir?

A) Yumurta ilə
B) Su bitkiləri ilə
C) Mal əti ilə
D) Meyvə-tərəvəz ilə
E) Balıq əti ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 62.

857) Romanovski üzrə boyanmış preparatda plazmodiumun nüvəsi hansı rəngə boyanır?

A) Tünd qəhvəyi
B) Sarı
C) Tünd boz
D) Qırmızı albalı
E) Qara

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 71.

858) Hansı materialın müayinəsi malyariyanın diaqnozunu təsdiqləyir ?

A) Limfa mayesi
B) Sidik
C) Bronxial selik

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Qan
E) Mədə möhtəviyyatı

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 76.

859) Berman üsulu zamanı stronqiloid sürfələrinin hərəkəti nəyə əsaslanır?

A) Sürfələrin həyatilik qabiliyyətinin təyin edilməsinə
B) NaNO3 məhlulunda aşkar edilməsinə
C) Stronqiloid sürfələrinin istiliyə doğru hərəkət etmə qabiliyyətinə
D) NaCl məhlulunda aşkar edilməsinə
E) Askarid yumurtalarının məhlulun səthində üzməsinə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 177.

860) Aşağıdakılardan hansılar öküz teniyalasının fərqləndirici cəhətləridir?

A) Uzunluğu 10 m,buğumları çox enli
B) Baş iri, buğumların sayı 300-500
C) Uzunluğu 5-6 m, buğumları aktiv, balalığın 18-36 yan şaxəsi
D) Balalığın 35-40 yan şaxəsi
E) Başın diametri 4m, buğumları qısa

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80.

861) Xəstə sərbəst olaraq qurd buğumlarının düz bağırsaqdan çıxdığını müşahidə edir. Hansı helmintozdan şübhələnmək olar?

A) Humenolepidozdan
B) Teniozdan
C) Teniarinxozdan
D) Enterebiozdan
E) Askaridozdan

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80

862) Xəstənin laboratoriyaya çatdırdığı qurd buğumunun uzunluğu 10-12 mm, eni 5-6 mm, balalığın 8-12 yan şaxəsi olub, içərisində 50 minə qədər yumurta vardır. Buğum hansı helmintə aiddir?

A) Alveokokk
B) Kiçik lent qurdu
C) Donuz teniyası
D) Öküz teniyası
E) Exinokokk

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 84.

sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

863) Öd və duodenal möhtəviyyat selikli və irinli olarsa, onlara nə əlavə edilməklə sentrifuqlaşdırılır?

A) ZnSO4 ilə
B) Spirt ilə
C) NaCl ilə
D) Kükürd efiri ilə
E) Süd turşusu ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 184

864) Bəlğəmin Lüqol məhlulu ilə boyanmış nativ yaxmasında laborant hansı ibtidailəri aşkar edir?

A) Leyşmaniya
B) Pnevmasista, trixomonad, amöb
C) Plazmodiumlar
D) Lyambliya
E) Sarkosista

Ədəbiyyat: D.E.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 160.

865) Nəcisin müayinəsində yumurtasına rast gəlinmir. Ancaq qurdun düz bağırsağından çıxması, qaşınma əmələ gətirməsi müşahidə edilmişdir. Söhbət hansı helmintdən gedir?

A) Strongiloid
B) Tükbaş qurd
C) Askarid
D) Bizquyruq
E) Ankilostom

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

866) Dəri üzərində olan “qoturluq” elementlərinin qaşınıb götürülməsi üçün hansı vasitələrdən istifadə edilir?

A) Pipet
B) Tənzif
C) Pambıq
D) Kibrit çöpü
E) Skalpel, Folkman qaşığı, ülgüc

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 207

867) Amöb dizenteriyalı xəstənin əşyaları və yataq dəsti necə zərərsizləşdirilir?

A) KMnnO4 məhlulu ilə
B) NaCL məhlulu ilə
C) 3%-li lizol məhlulu ilə

Ensiklopedik ödənişsiz istifadə üçün

D) 96%-li spirtlə
E) HCl məhlulu ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 27

868) İbtidailərə görə nativ yaxmanın hazırlanmasında hansı məhluldan istifadə olur?

A) Etanol
B) Metanol
C) Sirkə turşusu
D) NaCl
E) Qliserin

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 161

869) Variantlarda göstərilən sistalardan hansı bağırsaq amöbünə (Entamoeba Coli) aiddir?

A) 6 nüvəli
B) 8 nüvəli
C) 3 nüvəli
D) 5-6 nüvəli
E) 4 nüvəli

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 21.

870) Dəri leyşmaniozuna görə hazırlanmış nativ yaxmanın boyanması hansı üsulla aparılır?

A) Sil Nilsen üsulu ilə
B) Lyüqol ilə
C) Heydenhayn üsulu ilə
D) Romanovski üsulu ilə
E) Metilen göyü ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 161

871) İki nüvəsi və 4 cüt qamçısı olan ibtidai hansıdır?

A) Trixomonad
B) Triponosom
C) Leyşmaniya
D) Lyambliya
E) Balantidiya

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 34.

snskaz ödənissiz istifadə üçün

872) Cinsiyyət yollarının trixomonozu zamanı hansı material müayinə edilir?

A) Limfa düyünləri punktatı
B) Bəlğəm
C) Nəcis
D) Qan
E) Uşaqlıq yolu ifrazatı

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 39

873) Qan yaxması preparatında laborant Plazmodium-falsiparum (tropik) növünün morula mərhələsində neçə merazoid aşkar edir?

A) 5-6
B) 12-24
C) 10-13
D) 8-10
E) 2-4

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 42.

874) Qoryaçev üsulunu hansı məhluldan istifadə etməklə tətbiq edirlər?

A) 50%-li qliserin
B) HCl-məhlulu
C) NaSO4-məhlulu
D) NaCl-doymuş məhlulu və su
E) Efir və spirt

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 176.

875) Hansı xəstəliklər zamanı duodenal möhtəviyyatın müayinəsi aparılır?

A) Askaridoz
B) Opistarxoz
C) Trixosefalyoz
D) Enterobioz
E) Şistosomoz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 62.

876) Bu helmintlərdən hansı qara ciyərin öd yollarında parazitlik edir?

A) Fassiola
B) Bizquyruq
C) Paraqonium
D) Şistosom
E) Nanotiet

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 67.

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

877) Hansı zənginləşdirmə üsulunun tətbiqi zamanı helmint yumurtalarını aşkar etmək üçün həm məhlul, həm də çöküntü tədqiq edilir?

A) Flotasiya
B) Fülleborn
C) Çökdürmə
D) Kato
E) Berman

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 174.

878) Buğumunun eni uzunluğundan çox olan, ölçüsü 10-12 metr olan helmint hansıdır?

A) Kiçik lent qurdu
B) Enli lent qurdu
C) Exinokokk
D) Donuz teniyası
E) Öküz teniyası

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 76.

879) Teniarinxozun diaqnostik üsullarından biri hansıdır?

A) Anusətrafı nahiyədə qaşıntı materialının götürülməsi
B) Qoryaçev
C) Berman
D) Şulınan fırlatma
E) Duodenal zondlama

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 80.

880) Romanovski boyağının tərkibi hansıdır?

A) Azur,metien abısı
B) Azur, eozin, etanol, qliserin
C) Lüqol məhlulu,eozin
D) NaCl və qliserin
E) Efir,metil spirti

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 156.

881) İnsanın opistorla yoluxması hecə baş verir?

A) Krab və xərçənglə
B) Donuz əti
C) Çiy mal əti ilə
D) Çiy və yaxşı duzlanmamış balıq əti ilə
E) Torpaqdan,çirkli əllərlə

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 62.

882) Askaridin sürfələrinin ağciyərdə inkişaf mərhələsinın diaqnozu hansı materialın müayinəsinə əsasən qoyulur?

A) Nəcis
B) Bəlğəm
C) Qan
D) Limfa mayesi
E) Sidik

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 102.

883) Entomoeba Coli-nin vegetativ formasını xarakterizə edən əlamətlər:

A) Sitoplazmasında göbələk, mikroorqanizmlər, qida hissəcikləri olur, eritrositlər olmur
B) Sista əmələ gətirmir
C) Nüvəsi görünmür
D) Ölçüsü 40-80 mkm-dir
E) 12 barmaq bağırsaqla qidalanır

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 21.

884) Laborant fassiolanın yumurtasını aşkar edib. Lakin şəxs fassialyoza yoluxmayıb. Bu nə deməkdir?

A) Bitki hüceyrələridir
B) Yumurtalar tranzit olaraq insan orqanizmə keçə bilib
C) Toxuma heceyrələridir
D) Qida hissəcikləridir
E) Yumurtalar orqanizmə meyvə-tərəvəz ilə daxil olub

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 67.

885) Nə üçün himenolepidozun laborator diaqnostikası zamanı xəstəyə fenasol və purgen təyin edilir, sonra müayinə aparılır?

A) Işlədici kimi
B) Müayinənin effekliliyini artırmaq üçün
C) Yumurtaların çoxlu miqdarda aşkar olunması üçün
D) Qurdun strobilasını dağıtmaq üçün
E) Bütün cavablar düzdür

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 89.

886) Vegetativ formasının uzunluğu 30-150 mkm, eni 30-100 mkm olan və insanın ən iri ibtidai paraziti aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Balantidiya

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Bağırsaq amöbü
C) Trixomonad
D) Lyambliya
E) Leyşmaniya

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 25.

887) Dəri leyşmaniyozunun tədqiqi zamanı yalnız deformasiyaya uğramış və dağılmış törədicilərin aşkar edilməsi nəyi göstərir?

A) Materialın sağalma dövründə götürülməsini
B) Sağlam toxumadan götürülməsini
C) Materialın xoranın üzərindən götürülməsini
D) Xəstəliyin ilk stadiyası zamanı götürülməsini
E) Materialın irinli nahiyədən götürülməsini

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 30.

888) Cinsiyyət yolları trixomonadının ölçüsü nə qədərdir?

A) 30-430 mkm
B) 10-15 mkm
C) 8-15 mkm
D) 25-35 mkm
E) 14-30 mkm

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 39.

889) Öd və duodenal möhtəviyyatda hansı ibtidai parazitin vegetativ mərhələsi aşkar edilir?

A) Amöb
B) Balantidiya
C) Trixomonad
D) Leyşmaniya
E) Lyambliya

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 160.

890) Lyambliyanın hansı mərhələsi insan üçün invazion hesab edilir?

A) 3 nüvəli sistası
B) 2 nüvəli sistası
C) 1 nüvəli sistası
D) Vegetativ forması
E) 4 nüvəli sistası

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 34.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

891) Kontakt helmintozuna yoluxmuş uşaqların dırnaqları altında yumurtalarına rast gəlinən helmint hansıdır?

A) Tükbaş qurd
B) Enli lent qurdu
C) Askarid
D) Bizquyruq
E) Nekator

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 101.

892) Hansı helmintozun diaqnozu üçün anal ətrafı müayinə üsulu tətbiq edilir?

A) Trixosefalyoz
B) Askaridoz
C) Ankitostomitoz
D) Teniorinxoz
E) Stronqiloidoz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80.

893) Bu əlamətlərdən hansı opistorxun yumurtasına aiddir?

A) 130-145 mkm, simmetrik, qapaqlı
B) 75 mkm, simmetrik, sarı rəngli
C) 26-30 mkm, asimmetrik, sarımtıl-bozumtul rəngli
D) 100 mkm, qızılı-qəhvəyi rəngli, qapaqlı
E) 25-35 mkm, asimmetrik, qəhvəyi rəngli

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 62.

894) Hansı canlılar alveokokun əsas sahibidir?

A) At
B) Tülkü, canavar
C) Ev quşları
D) Dövşan
E) Donuz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 94.

895) Kato üsulu ilə müayinə apararkən kiçik lentqurdunun yumurtalarını aşkar etmək üçün laborant diqqətli olmalıdır. Nə üçün?

A) Çoxqatlı örtüyü olduğu üçün
B) Yumurtalar rəngsiz və şəffaf olduğu üçün
C) Yumurtalar kiçik olduğu üçün
D) Yumurtalar tünd rəngli olduğu üçün
E) İçərisində onkosfer olduğu üçün

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 87.

896) Uşaq düz bağırsağından bizquyruqların çıxdığını görüb, lakin analətrafı müayinədə yumurtalar aşkar edilmir. Nə üçün?

A) Digər helmint ola bilər
B) Müayinə düzgün aparılmayıb
C) Nəcisin müayinəsinə ehtiyac var
D) Bağırsaqda ancaq erkən fərdlərdir
E) Uşaq səhv edib

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

897) Iri 130-145 mkm, oval, qapaqcıqlı, qəhvəyi və ya sarı, içərisi yumurta sarısı hüceyrələri ilə dolu olan yumurta hansı helmintə məxsusdur?

A) Opistorx
B) Klonorx
C) Fassiola
D) Bizquyruq
E) Askarid

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 67.

898) Hansı helmintoz zamanı diaqnostika məqsədi ilə “sorğu üsulu” tətbiq edilir?

A) Himenolepidoz
B) Exinokokkoz
C) Trixosefalyoz
D) Teniarinxoz
E) Difillobotsioz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80.

899) Qızılı – qəhvəyi, oval, 100 mkm ölçüdə, daxilə doğru basılmış qapaqcıqlı iri yumurta hansı helmintə aiddir?

A) Paraqonium
B) Sistosom
C) Enlilent qurdu
D) Metaqonium
E) Stranqiloid

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 70.

900) Aşağıdakı qurdların hansının yumurtasında onkosfer olmur?

A) Öküz teniyası
B) Kiçik lent qurdu

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Exinokokk
D) Klonorx
E) Donuz teniyası

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 66.

901) Laborant nativ preparatda müxtəlif ölçülü, qara örtüklü, daxili struktursuz və şəffaf törəmələr aşkar etmişdir. Bu törəmələr nədir?

A) Tenid yumurtası
B) Amöb sistası
C) Hava qabarcıqları
D) Bizquyruq yumurtası
E) Onkosfer

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 180.

902) Ağız trixomonadini müəyyən etmək üçün laborant hansı materialı müayinə etməlidir?

A) Limfa mayesi
B) Öd
C) Mədə şirəsi
D) Bronxial selik, bəlğəm
E) Qan

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 39.

903) Preparatda aşkar olunmuş ölçüsü 50-60 mkm, bir tərəfi qabarıq, digər tərəfi yastı, içərisində rüşeym olan, şəffaf yumurtalar hansı helmintə aiddir?

A) Opistorx
B) Askarid
C) Ankilostom
D) Bizquyruq
E) Klonorx

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

904) Bu məhsulların hansı ilə tenioza yoluxma baş verir?

A) Donuz əti
B) Mal əti
C) Balıq əti
D) Meyvə-tərəvəz
E) Konsevslər

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 84.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

905) Toplanmış zərərli materiallar hansı xüsusi vəsaitlərlə laboratoriyaya çatdırılır?

A) Metal futlyar, biks
B) Əl çantaları ilə
C) Yol çantaları ilə
D) Səbətlərlə
E) İri polietilen torbalarla

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 217.

906) Laboratoriyada material tədqiqata qədər hansı şəraitdə saxlanılmalıdır?

A) Adı temperaturda sorucu şkafda
B) Soyuducuda aşağı temperaturda
C) Pəncərə qarşısında
D) Masa üzərində
E) Dolabda

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 217.

907) Laborator müayinə zamanı zərərli material gözə düşərsə onu nə ilə yumalı?

A) Kalium-permanqanat məhlulu ilə
B) Adi su ilə
C) NaCl məlulu ilə
D) 70%-li etanolla
E) Lüqol məhlulu ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 216.

908) Hansı helmintoza görə müayinə apararkən laborant özü yoluxa bilər?

A) Opistorxoz
B) Himenolepidoz
C) Klonorxoz
D) Teniarinxoz
E) Difillobotrioz

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 87.

909) Laboratoriyada olan xloramin, spirt, karbol turşusu məhlulları nə üçün tətbiq edilir?

A) Yaxma hazırlamaq üçün
B) İbtidailəri aşkar etmək üçün
C) Zərərsizləşdirici və dezinfeksiyaedici kimi
D) Helmint yumurtaları aşkar etmək üçün
E) Dərini təmizləmək üçün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis "Tibbi parazitalogiya". Səh 215.

sns.az ödənişsiz istifadə üçün

910) Öküz teniyası ilə insanın yoluxması necə baş verir?

A) Çirkli meyvə-tərəvəzlə
B) Çirkli əllərdən
C) Yaxşı bişməmiş donuz əti ilə
D) Yaxşı bişməmiş balıq əti ilə
E) Yaxşı bişməmiş mal əti ilə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 80.

911) Miozlar nədir?

A) Sarkosistanın əmələ gətirdiyi xəstəlikdir
B) Gənələrin keçirdiyi xəstəlikdir
C) Pnevmasistanın əmələ gətirdiyi xəstəlikdir
D) Milçək və mozalan sürfələrinin insan orqanizmində əmələ gətirdiyi xəstəliklərdir
E) Amöbün əmələ gətirdiyi xəstəlikdir

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 148.

912) Bu əlamətlərdən hansı exinokokka aiddir?

A) Sürfəsi qovuq şəkillidir
B) Yetkin buğumda 1500-ə qədər yumurta olur
C) Uzunluğu 5 sm
D) Ayrı cinslidir
E) Bədən 100-120 buğumdan ibarətdir

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 92.

913) Yumurtaları xüsusi baramacığın içərisində yerləşən qurd aşağıdakılardan hansıdır?

A) Donuz teniyası
B) Balqabaqvari qurd
C) Kiçik lent qurdu
D) Alveokokk
E) Öküz teniyası

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

914) Qadın cinsiyyət orqanlarına sürünərək daxil olan və orada iltihab prosesinə səbəb olan qurd hansıdır?

A) Tükbaş qurd
B) Ankilostom
C) Askarid
D) Bizquyruq
E) Stronqiloid

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 98.

915) Sürfələri aktiv hərəkətlə dəridən keçərək orqanizmə daxil olan helmint hansıdır?

A) Askarid
B) Bizquyruq
C) Nekator
D) Paraqonim
E) Fassida

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 109.

916) Helmint yumurtasını aşkar etmək üçün sentrifuqlaşdırma zamanı sidik çöküntüsünün üzərinə hansı məhlul tökülür?

A) Malaxit yaşılı
B) Lüqol və ya Metilen abısı
C) $MgSO_4$
D) $ZnSO_4$
E) NaCl

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 184.

917) Bu üsullardan hansı toksoplazmozun diaqnozu zamanı tətbiq edilir?

A) Nəcisin müayinəsi
B) Qanda İg G vəİg M anticismlərinin aşkar edilməsi
C) Bəlğəm müayinəsi
D) Zənginləşdirmə üsulları
E) Analətrafı müayinə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 234.

918) Tükbaş qurdun diaqnozu zamanı tətbiq edilən üsullar bunlardan hansı ola bilər?

A) Berman üsulu
B) Yapışqanlı lent üsulu
C) Qoryaçev üsulu
D) Kato üsulu, zənginləşdirmə üsulları
E) Şulman-fırlatma

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 238

919) Tünd sarı zülal təbəqəli, mayalanmış, düzgün dalğavari kontura malik yumurta hansı helmintə məxsusdur?

A) Kiçik lent qurdu

Ensk az ödənişsiz istifadə üçün

B) Nekator
C) Klanorx
D) Şistosom
E) Askarid

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 103

920) Helmintozlara görə qanın müayinəsi zamanı hansı qan elementinin normadan artıq olduğu müşahidə edilir?

A) Trombosit
B) Monosit
C) Eozinofil
D) Limfosit
E) Eritrosit

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 238

921) Askaridozun bağırsaq stadiyasını aşkar etmək üçün hansı materialın müayinəsi aparılır?

A) Mədə möhtəviyyatı
B) Qan
C) Limfa mayesi
D) Nəcis
E) Sidik

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 106

922) Stronqiloidin miqrasiya etmiş sürfələri hansı materialın müayinəsinə əsasən qoyulur?

A) Bəlğəmin
B) Mədə şirəsinin
C) Sidiyin
D) Nəcisin
E) Ödün

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 113

923) Filyariozlara nəyə əsasən diaqnoz qoyulur?

A) Qanda yumurtaların tapılmasına
B) Ödün müayinəsinə
C) Sidiyin müayinəsinə
D) Qan yaxması və qalın qan damlası preparatında sürfələrin tapılmasına
E) Nəcisin müayinəsinə

Ədəbiyyat: D.Y.Qenis “Tibbi parazitalogiya”. Səh 120

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

924) Şistosomun çökdürmə üsulu ilə müayinəsində istifadə olunan həlledici hansı maddələrdən ibarətdir?

A) CaCO3
B) Qliserin, NaCl
C) NaN O3, su
D) Qliserin, H2SO4
E) Fenol, spirt

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 179

925) Brumpt üsulu ilə stronqiloid sürfələrini aşkar edərkən nəcisin üzərinə hansı maddə əlavə edilir?

A) HCl
B) Qliserin
C) Su
D) NaCl
E) Fenol

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 178

926) Nəcisin Qoryaçev üsulu ilə tədqiqi zamanı sınaq şüşəsində olan NaCl məhlulunun üzərinə hansı qarışıq tökülür?

A) NaHCO3 və su
B) Su və qliserin
C) Su və efir qarışığı
D) Su və nəcis qarışığı
E) NCl və su

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 176

927) Zənginləşdirmə üsullarını yerinə yetirərkən preparatın qurumaması üçün üzərinə hansı maddə əlavə olunur?

A) Efir
B) Na-bikarbonat
C) 50%-li qliserin
D) Spirt
E) Fenol

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 175

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

928) Fülleborn üsulu ilə nəcisin tədqiqi zamanı məhlulun səthinə toplanmış helmint yumurtalarını yığmaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Taxta şpatel
B) Qasıq
C) Şüşə çubuq
D) Pipet
E) Spiral şəkilli ilmək

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 174

929) Əşya şüşəsi üzərində hazırlanmış qalın qan damlasının diametri nə qədər olmalıdır?

A) 2 sm
B) 1,5 sm
C) 5 sm
D) 3 sm
E) 4 sm

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 156

930) Quru Romonovski boyağını əzdikdən sonra hansı maddələrlə qarışdırılmalıdır?

A) Qliserin , etanol
B) Efir, farmalin
C) $MgSO_4$, su
D) Sirkə turşusu
E) Fenol, su

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 156

931) Romonovski boyağının tam yetişməsi üçün onu hansı temperaturda və neçə gün müddətinə termostata yerləşdirirlər?

A) 45 °C T-da 12-15 gün
B) 37°C T-da 3-5 gün
C) 50°C T-da 12-15gün
D) 60°C T-da 15-20 gün
E) 40°C T-da 6-8 gün

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 17

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

932) Uzun müddət yüksək temperaturda saxlanmış qalın qan damlası preparatı hansı rəng alır?

A) Qara
B) Sarı
C) Mavi
D) Göy
E) Açıq qırmızı

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 158

933) Ibtidailər aşkar etmək üçün "asılan damla" üsulunu yerinə yetirərkən istifadə olunan məhlul hansıdır?

A) NaCl –in izotonik məhlulu
B) Qliserin
C) Efir
D) Spirt
E) Kapron turşusu

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 160

934) Dizenteriya amöbünün toxuma forması hansı materialda aşkar edilir?

A) Ağ ciyər toxumasında
B) Mədə şirəsində
C) Yoğun bağırsaq xorasından hazırlanmış histoloji kəsikdə
D) Nazik bağırsağın selikli qişasında
E) Qara ciyər toxumasında

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 17

935) Qəhvəyi rəngli, içərisində iki dairəvi rüşeym hüceyrəsi olan, qapaqcığı ensiz qütbündə yerləşən yetkin yumurta hansı sorucuya məxsusdur?

A) Şistosoma
B) Paraqonimə
C) Metaqonimə
D) Fassiolaya
E) Lansetşəkilli iki ağızlı qurda

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 66

936) Suyun yüksək qələvi reaksiyası (PH 7,3 və çox) zamanı yaxma hansı rəngə boyanır?

ynk az ödənişsiz istifadə üçün

A) Bozumtul-yaşıl, mavi
B) Tünd göy
C) Bənövşəyi
D) Qırmızı
E) Çəhrayı

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр.

937) Iri, sarımtıl, uzunsov-oval formalı və iri yan çıxıntısı olan yumurta hansı helmintə aiddir?

A) Askarid
B) Manson şistomu
C) Bizquyruq
D) Opistarx
E) Donuz teniyası

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 73

938) Hansı müayinə materialında qan şistosomunun yumurtaları axtarılır?

A) Öddə
B) Mədə şirəsində
C) Yoğun bağırsağın selikli qişasında
D) Nazik bağırsağın selikli qişasında
E) Sidik çöküntüsündə

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 73

939) Nəcisin flotasiya üsulu ilə müayinəsi zamanı əşya şüşələri bankanın üzərində neçə dəqiqə saxlanılır?

A) 60-70
B) 50-60
C) 20-30
D) 40-50
E) 60-80

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 176

940) Aşağıdakılardan hansı qalın qan damlası preparatına aiddir?

A) Eritrositlər hemolizə uğrayır
B) Kiçik böyüdücü ilə mikroskoplaşdırılır
C) Fiksə olunmur
D) Fiksə olunur

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Prepart çox nazik olmalıdır

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 154

941) Qalın qan yaxması preparatında orta hesabla hər görmə sahəsində neçə leykosit sayılmalıdır?

A) 30-40
B) 10-15
C) 40-50
D) 25-30
E) 20-25

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 154

942) Romanovski boyağının hazırlanması zamanı suyun reaksiyasını təyin etmək üçün suya hansı maddə əlavə olunur?

A) Efir
B) NaCl
C) H2SO4
D) Formalin
E) Hematoksillin

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 157

943) Romanovski işçi boyağını alarkən turş reaksiyalı suyu qələviləşdirmək üçün suya hansı maddə əlavə olunur?

A) 1 %-li natrium bikarbonat
B) HCl
C) H2S
D) Spirt
E) Na2SO4

Ədəbiyyat: Д.Е.Генис. «Медицинская паразитология». Москва 1991«Медицина» 1991 Стр. 157

944) Cinsiyyət yolları trixonomozunun əlaməti aşağıdakılardan hansıdır?

A) Bəlğəm ifrazı
B) Ürək bulanması
C) İrinli-serozli ifrazat
D) İshal
E) Qarında ağrılar

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991Səh: 39

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

945) Hansı helmintoz zamanı duodenal möhtəviyyat və nəcis müayinə edilir?

A) Askaridoz
B) Şistosomoz
C) Fassialioz
D) Difillobotrioz
E) Tenioz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 69

946) Toksoplazmozdan şübhələndikdə hansı materialın müayinəsi aparılır?

A) Sidik
B) Qan, onurğa beyin mayesi
C) Bəlğəm
D) Nəcis
E) Mədə möhtəviyyatı

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 53

947) İnsanın difillobotrioza yoluxması necə baş verir?

A) Mal əti ilə
B) Çirkli əllərlə
C) Sürfələrlə yoluxmuş balıq əti ilə
D) Krab əti ilə
E) Meyvə tərəvəzlə

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 79

948) Balıqçılar və su təsərrüfatı işçiləri arasında profilaktik tədbirlər hansı helmintoz zamanı aparılır?

A) Enterobioz
B) Difillobotrioz
C) Trixinelloz
D) Nekatoroz
E) Askaridoz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 76

949) Teniarinxozlu xəstə tibb məntəqəsinə müraciət edibsə, tibb işçisi diaqnoz məqsədilə hansı üsuldan istifadə etməlidir?

A) Sulman
B) İsupov və Broxorov
C) Sorğu üsulundan
D) Berman
E) Qoryaçev

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 83

950) Profilaktik tədbir olaraq hansı helmintoz zamanı otun, yem sahələrinin insanın nəcisi ilə çirklənməsinin qarşısı alınmalıdır?

A) Fassialyoz
B) Paroqonimoz
C) Opistorxoz
D) Teniarinxoz
E) Klonorxoz

Ədəbiyyat: Медицинская паразитология. Москва « Медицина» 1991 Səh: 84

Bölmə Qarışıq 2

951) Sidikdə urobilin olarsa, Florens sınağı ilə təyin edildikdə hansı rəngli həlqə alınır?

A) Çəhrayı
B) Sarı
C) Abı
D) Qəhvəyi
E) Yaşıl

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 25

952) Sidikdə qan piqmenti olarsa Amidopirin sınağında hansı rəng alınır?

A) Göy
B) Qırmızı
C) Sarı
D) Bənövşəyi
E) Qara

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh

953) Sidikdə qan piqmenti təyin edildikdə hansı qaydaya riayət edilməlidir?

A) Sidik çalxalanmalıdır
B) Sidik təzə olmalıdır
C) Bütün cavablar doğrudur
D) Qablar tam təmiz olmalıdır
E) Kimyəvi təmiz reaktivdən istifadə olunmalıdır

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 27

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

954) Sidikdə qan piqmentini təyin etmək üçün hidrogen-peroksidin (H2O2) 3%-li məhlulu necə hazırlanır?

A) 30 hissə perihidrol, 40 hissə distillə suyu
B) 35 hissə perihidrol, 45 hissə distillə suyu
C) 2,5 hissə perihidrol, 35 hissə distillə suyu
D) 2 hissə perihidrol, 30 hissə distillə suyu
E) 3 hissə perihidrol, 27 hissə distillə suyu

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 27 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 19

955) Sidikdə urat duzlarını əritmək üçün sidiyə hansı reaktiv damızdırılır?

A) Fuşe reaktivi
B) Selena reaktivi
C) Sudan III reaktivi
D) Haynes reaktivi
E) Yaffe reaktivi

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 29

956) Urat duzlarını əritmək üçün Selena reaktivinin tərkibi hansı maddələrdən ibarətdir?

A) Pikrin turşusu, bura, su
B) Bura, bor turşusu, distillə suyu
C) Sirkə turşusu, yod, distillə suyu
D) Xlorid turşusu – benzidin, distillə suyu
E) Buzlu sirkə turşusu, sulfat turşusu, su

Ədəbiyyat: Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 29

957) Fibrinoliz prosesi nə deməkdir?

A) Qan laxtasının yığılması
B) Qan laxtasının həll olması
C) Qanın trombokinazasının əmələ gəlməsi
D) Fibrinogenin fibrinə çevrilməsi
E) Protrombinin trombinə çevrilməsi

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.188

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

958) Yaranma mexanizmlərindən asılı olaraq hemorragik diatezlər neçə qrupa bölünür?

A) 5
B) 7
C) 2
D) 4
E) 3

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.189

959) Trombositlərin kəmiyyət dəyişkənliyi ilə müşayət olunan xəstəlik necə adlanır?

A) Anemiya
B) Hemofiliya
C) Trombositopatiya
D) Trombositopeniya
E) Vaskulit

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.189`

960) Trombositlərin keyfiyyət dəyişkənliyi ilə müşayiət olunan xəstəlik necə adlanır?

A) Anemiya
B) Leykoz
C) Trombositopatiya
D) Hemofiliya
E) Trombositopeniya

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.190

961) Trombositlərin adgeziya xüsusiyyəti nə deməkdir?

A) Damarlarda qanın normal axımının bərpası
B) Trombositlərin bir-birinə yapışaraq aqreqatlar əmələ gətirməsi
C) Qan laxtasının lizisə uğraması
D) Qan laxtasının yığılması
E) Trombositlərin damarın zədələnmiş sahələrinə yapışması

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.183

962) Trombositlərin aqreqasiya xüsusiyyəti nə deməkdir?

A) Trombositlərin kəmiyyətcə dəyişməsi
B) Trombositlərin keyfiyyətcə dəyişməsi
C) Trombositlərin damarın zədələnmiş sahələrinə yapışması

susk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Trombositlərin reflektor spazmının saxlanılmasında iştirakı
E) Trombositlərin bir-birinə yapışaraq toplantılar əmələ gətirməsi

Ədəbiyyat: А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова. «Клинические лабораторные исследования», Москва «Медицина» 1984 стр.183

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün