

Neonatologiya

04.10.2023

1) Aşağıdakılardan hansı şəkərli diabet olan ananın yenidoğulmuş uşağında olmaz?

- A) hiperkalsiemiya
- B) metabolik asidoz
- C) hipoqlikemiya
- D) hiperbilirubinemiya
- E) hipomaqnezemiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 106.

2) Rinit,qovuqcu və hepatosplenomeqaliya hansı bətdaxili infeksiyada olur?

- A) Sifilis
- B) Sitomeqalovirus infeksiyası
- C) Qızılca
- D) Toksoplazmoz
- E) Hepatit B

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 219.

3) Nekrotik enterokolitin diaqnostikasında hansı əlamət ən dürüst hesab olunur?

- A) nəcisdə qanın görülməsi
- B) diareya
- C) rentgenoloji müayinədə-bağırsağ pnevmatozu
- D) bağırsağ ilgəklərinin dartılması
- E) qarnının ön divarının, tənəsül üzvlərinin ödemli olması

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 247.

4) Pilorostenoz aid olan simptom hansıdır?

- A) Bədən kütləsi normal və ya zəif azalmış olur
- B) Mədənin peristaltikası tez-tez, "qum saati" şəklində olur
- C) Nevrotik irsiyyət
- D) Qusma doğulandan olur
- E) Qusuntu kütləsi qəbul edilən qidadan az olur

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 390.

5) Yenidoğulmuşlarda hansı immunoqlobulin növü anadan cift vasitəsilə keçir?

- A) gM
- B) IgA
- C) IgG
- D) IgD
- E) gE

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 287.

6) Hansı vitaminin çatışmazlığı yarımçıq doğulmuş uşaqlarda hemolizin səbəbi ola bilər?

- A) Vitamin B6
- B) Vitamin B12
- C) Vitamin E
- D) Vitamin D
- E) Vitamin A

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. “Неонатология” (в 2-х томах), том 2. 2004, стр.111.

7) Aşağıdakılardan hansı Bekvit sindromu üçün tipik olmayan simptomdur?

- A) göbək ciyəsi yırtığı
- B) hemihipertrofiya
- C) visseromeqaliya
- D) anemiya
- E) hipoqlikemiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 189.

8) Aşağıda qeyd edilən hansı halda enteral qidalandırma dayandırılmamalıdır?

- A) yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi
- B) anadangəlmə metabolizm qüsurları olduqda
- C) təkrarlanan qıcolmalar zamanı
- D) bağırsaq keçməzliyi əlamətləri olanda
- E) ekstubasiyadan sonrakı 12 saat ərzində

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük), 2007, səh. 132.

9) Bollard şkalasına görə, uşağın hestasiya yaşının qiymətləndirilməsi üçün hansı morfoloji meyar istifadə olunmur?

- A) cinsiyyət üzvləri
- B) qulaq seyvanı
- C) dərinin şəffaflığı
- D) böyük əmgəyin ölçüləri
- E) süd vəziləri

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 112

10) Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin kəskin çatışmazlığı zamanı hansı laborator müayinə yanlışdır?

- A) hiperkaliemiya
- B) 17OKS azalması
- C) ortizolun azalması
- D) AKTH-nun azalması
- E) hipoqlikemiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 453.

11) Vaxtında doğulmuş 24-saatlıq yenidoğulan uşağın müayinəsində nəcisin olmamağı məlum olur. Uşağın arxa əmgəyi 2 sm-ə qədər açıqdır, göbək yırtığı müşahidə edilir. Bu uşaqda ilk növbədə hansı diaqnoz ehtimal olunur?

- A) Anadangəlmə hipotireoz
- B) Hirşsprunq xəstəliyi
- C) Şəkərli diabet olan anadan yenidoğulmuş
- D) Trisomiya 13
- E) Bekvit sindromu

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007.

12) Lesitin/sfinqomielin nisbətinin hansı göstəriciləri tənəffüs pozuntusu sindromunun yaranma ehtimalının az olduğunu göstərir?

- A) 1-dən az
- B) 0,5-dən az
- C) 2:1
- D) 2-dən çox
- E) 0,5:1

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. “Неонатология” (в 2-х томах), том 1, стр. 520.

13) Kəskin gedişli sepsis nə qədər davam edir?

- A) 1-1,5 ay
- B) 2-3 ay
- C) 3 aydan artıq
- D) 15 gün
- E) 2-3 gün

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 234.

14) Onurğa beyin mayesinin hansı laborator göstəricisi irinli meningit üçün xarakterik deyil?

- A) 1 mm³-də hüceyrələrin orta miqdarının 35-dən çox olması
- B) Neytrofillərin miqdarının 60%-dən çox olması
- C) Zülalın miqdarının 1,70 q/l-dən çox olması
- D) Limfositlərin üstünlük təşkil etməsi
- E) Qlükozanın likvordakı miqdarının qandakı miqdarına nisbətinin 40-dan az olması

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 252.

15) Hamilə qadının qanında alfa-fetoprotein miqdarının azalması nə zaman olur?

- A) Daun sindromunda
- B) sinir borusunun inkişaf qüsurlarında
- C) anadangəlmə nefrozda
- D) bətdaxili inkişafın ləngiməsində
- E) çoxdöllü hamiləliklərdə

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 109.

16) Tranzitor sarılıq zamanı bilirubinin səviyyəsi orta hesabla nə qədər olur?

- A) 180-200 mkmol/l
- B) 85-102 mkmol/l
- C) 120-145 mkmol/l
- D) 140-165 mkmol/l
- E) 160-185 mkmol/l

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 267.

17) Aşağıdakılardan hansı konyuqasion sarılığa aiddir?

- A) Hipotireoz zamanı sarılıq

- B) α -1 antitripsin defisiti zamanı sarılıq
- C) Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza fermentinin defisiti zamanı sarılıq
- D) Alacil sindromu
- E) Oraq hüceyrəli hemolitik anemiya zamanı sarılıq

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 266.

Tarix: 29.09.2023 15:08:07

18) Birincili hemorragik pozuntulara bunlardan hansı aiddir?

- A) DYL sindromu
- B) Mexaniki sarılıq zamanı hemorragik sindrom
- C) Vitamin K defisitli hemorragik sindrom
- D) Trombositopatiyalar
- E) İnfeksiya zamanı hemorragik sindrom

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 314.

19) “Pişik qışqırığı” sindromu hansı xromosom mutasiyası zamanı baş verir?

- A) 19-cu
- B) 13-cü
- C) 18-ci
- D) 5-ci
- E) 21-ci

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 92.

20) Başın dərisində aplaziya sahələrinə hansı sindromda rast gəlinir?

- A) Şturge – Veber sindromu
- B) Elers – Danlos sindromu
- C) Alacil sindromu
- D) Conson-Blizzard sindromu
- E) Cutis Laxa sindromu

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 164.

21) Aşağıdakılardan hansı yanlış ifadədir?

- A) Sinus taxikardiyası zamanı ürək əzələsinin yığılması vaxtında doğulmuşlarda dəqiqədə 190, vaxtından əvvəl doğulmuşlarda 195 olur.
- B) Mədəciküstü və mədəcik taxikardiyaalarının müalicə sxemi bir-birindən fərqlənir.
- C) Ekstrasistoliya yenidoğulma dövründə taxikardiyaaların ən çox təsadüf edilən formasıdır, müalicə tələb etmir.

D) Mədəcüküstü taxikardiyalar zamanı ürək çatışmazlığının əlamətləri olmadıqda, müalicəni diqoksinlə başlamaq lazımdır.

E) Həyatının 3-cü günündən qabarıq ürək çatışmazlığı ilə müşayiət olunan intensiv küylər körpədə anadangəlmə ürək qüsurlarına səbəb yaradır.

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 379.

22) Bunlardan hansı hipokaliemiyanın səbəblərinə aid deyil?

- A) sidikqovucuların qəbulu
- B) qlükozidlərlə intoksikasiya
- C) ağır asidoz
- D) qlükokortikoidlərin qəbulu
- E) qeyri-rasional infuzion terapiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 162.

23) Hiperkaliemiyanın səbəblərinə hansı aid deyil?

- A) kəskin böyrək çatışmazlığı
- B) DYL sindromu
- C) insulin qəbulu
- D) kəskin böyrəküstü vəzi çatışmazlığı
- E) damardaxili hemoliz

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 162.

24) Hipokaliemiyanın əlamətlərinə nə aid deyil?

- A) bədən kütləsinin pis artımı
- B) taxikardiya
- C) EKQ-da Q-T intervalının uzanması
- D) qəbizlik
- E) EKQ-da iti T dişciyi

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 162.

25) Hiperkaliemiyanın əlamətlərinə nə aid deyil?

- A) EKQ-da genişlənmiş T dişciyi
- B) ürək aritmiyaları
- C) bağırsağ keçməzliyi
- D) bradikardiya
- E) sütlük

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 162.

26) Bətdaxili inkişaf ləngiməsinin ağırlaşmalarına nə aid deyil?

- A) Polisitemik sindrom
- B) Alkaloz
- C) Hialin membranlar xəstəliyi
- D) Hipotermiyaya meyillilik
- E) Persistə edən ağciyər hipertenziyası

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 120.

27) Vaxtında doğulmuşlarda Ponderal indeksi normada nəyə bərabərdir?

- A) 70-80
- B) 40-50
- C) 50-60
- D) 60-70
- E) 30-40

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007, səh. 122.

28) Yenidoğulmuş uşaq həyatın 5-ci dəqiqəsində qiymətləndirilmişdir: dodaqları çəhrayı, əlləri və ayaqları sianotik, ürək döyüntüləri 80/dəq, uşaq öskürür, ətrafları bir qədər bükülüb, tənəffüs qeyri-requlyardır. Apqar şkalasına görə qiymətləndirin:

- A) 6
- B) 7
- C) 8
- D) 4
- E) 5

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007.

29) Vaxtından əvvəl doğulan yenidoğulmuşlarda oksigen müalicəsi artıq olanda hansı ən önəmli fəsad əmələ gəlir?

- A) tənəffüsün depressiyası
- B) retrolental fibroplaziya
- C) ürək çatışmazlığı
- D) tənəffüs pozuntusu sindromu
- E) kardiomiopatiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya" (dərslük). 2007.

30) Yenidoğulmuş uşaqda qanlı qusma qeyd olunur. Qanamamanın uşağa aid olduğunu hansı üsulla sübut etmək olar?

- A) uşağın periferik qanının öyrənilməsi
- B) uşaqda HbF müayinə etmək
- C) ananın periferik qanının öyrənilməsi
- D) anada HbF təyin etmək
- E) Apt testi

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007.

31) Yenidoğulmuş uşağa 10 dəqiqə ərzində 100% oksigen verilməsinə baxmayaraq, hipoksiya əlamətləri aradan qalxmasa, nə ehtimal olunur?

- A) respirator distres sindrom
- B) atelektazlar
- C) ağciyər hipertenziyası
- D) aspirasion pnevmoniya
- E) bronx-ağciyər displaziyası

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007.

32) Üçgünlük yenidoğulmuşda melena və hematoməzis müşahidə olunur. Tromboplastin zamanı və protrombin zamanı uzanmışdır. Bu uşaqda ilk ehtimal olunan nədir?

- A) XIII faktor çatışmazlığı
- B) afibrinogenemiya
- C) K vitamini çatışmazlığı
- D) hemofiliya A
- E) hemofiliya B

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007.

33) Anadangəlmə toksoplazmoz zamanı hansı simptom spesifik deyil?

- A) kəllədaxili kalsifikatlar
- B) xorioretinit
- C) dəridə vezikulalar
- D) limfadenopatiya
- E) hepatomeqaliya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 214.

34) Birincili immunodefisit vəziyyətlərə hansı aiddir?

- A) Mak Elfreş sindromu
- B) Alacil sindromu

- C) Bekvit sindromu
- D) Viskott – Oldriç sindromu
- E) Kazabah – Merit sindromu

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 290.

35) Aşağıdakılardan hansını üz sinirinin travmatik zədələnməsi ilə diferensiasiya etmək lazımdır?

- A) Kofferat sindromu
- B) Mebeus sindromu
- C) Klod-Bernard-Qorner sindromu
- D) Arqayl Robertson sindromu
- E) Unterharnşeydt sindromu

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007.

36) Methemoqlobin qanda nə qədər olanda koma və ölüm baş verir?

- A) 10%
- B) 20%
- C) 30%
- D) 50%
- E) 70%

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 303.

37) Rüşeymin uşaqılıq divarına implantasiyasından ciftin əmələ gəlməsinə qədər olan dövr necə adlanır?

- A) blastogenezi
- B) embriogenezi
- C) fetogenezi
- D) progenez
- E) kimatogenezi

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 85.

38) Embrional dəliklərin persistə etməsi nəticəsində yaranan anadangəlmə inkişaf qüsurları necə adlanır?

- A) blastopatiyalar
- B) fetopatiyalar
- C) qametopatiyalar
- D) deformasiya
- E) embriopatiyalar

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh.86.

39) Doğuş zamanı döldə aşağıdakı proseslərdən hansı baş vermir?

- A) cift-dol qan dövrünün dəyişməsi
- B) artan hipoksiya
- C) alkalozun əmələ gəlməsi
- D) kəllə sümüklərinin yerdəyişməsi
- E) simpatoadrenal sistemin aktivləşməsi

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 70.

40) Körpə doğulan kimi doğum zalında onunla aparılan tədbirlərin ardıcılığını düzgün seçin:

1. Göbək ciyəsinin işlənməsi;
2. Yenidoğulmuşun qurudulması;
3. Tənəffüs yollarının təmizlənməsi;
4. İlk dəfə döşlə əmizdirmə;
5. Yenidoğulmuşun vəziyyətinin Apqar şkalası ilə qiymətləndirilməsi;
6. Yenidoğulmuşun anaya verilməsi;
7. Profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi.

- A) 3, 5, 2, 1, 6, 4, 7
- B) 3, 5, 6, 1, 2, 4, 7
- C) 2, 5, 6, 3, 1, 4, 7
- D) 6, 5, 1, 3, 2, 4, 7
- E) 5, 3, 1, 2, 6, 4, 7

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 31.

41) Yanlış ifadəni seçin:

- A) Vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda kütlə itkisi 14%-ə qədər ola bilər.
- B) Vaxtında doğulan uşaqlarda dərinin saralması bilirubin səviyyəsi 50 mkmol/l olduqda nəzərə çarpır.
- C) Cinsi kriz əlamətləri müalicə tələb etmir və 1-2 gün ərzində keçib gedir.
- D) Arterial axacaq doğuşdan 10-15 dəqiqə sonra bağlanmağa başlayır.
- E) Sidik turşulu infarkt əlamətləri 2-ci həftənin sonunda yox olur.

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007.

42) Yanlış ifadəni seçin:

- A) Arterial axacaq doğuşdan 10-15 dəqiqə sonra bağlanmağa başlayır
- B) Həyatın 1-ci və 2-ci sutkasında miokardın elektrik aktivliyi yüksəlir
- C) Ürəkdə tranzitor dəyişikliklər 2 gündən çox davam edir

- D) Göbək venasının mənəfi 2-3 həftədən sonra bağlanmağa başlayır
- E) Göbək arteriyaları doğuşdan 45-50 saniyə sonra funksional olaraq bağlanır

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 75.

43) Ürəkdə tranzitor dəyişikliklərə hansı aid deyil?

- A) taxikardiya
- B) EKQ-da sol mədəcikdə gərginlik
- C) ürək ölçülərinin tranzitor böyüməsi
- D) tonların karlaşması
- E) dalğa hündürlüklərinin voltajının azalması

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 75.

44) “Yeni doğulan körpənin həyatının ilk saniyələrində xarici qıcıqlara – işığa, səsə, ağrıya reaksiya verməməsi, əzələ tonusunun, əmmə, udma, vətər və s. Reflekslərin olmaması” tərifini aşağıdakılardan hansına aiddir?

- A) Energetik çatışmazlıq sindromu
- B) Doğuşun katarsisi
- C) İmprinting
- D) Qasp
- E) Yenicə doğulan uşaq

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 74.

45) Baş beyinə hansı növ qansızması zamanı onurğa beyin mayesində çoxlu miqdarda eritrositlər aşkar olunur?

- A) mədəcikdaxili
- B) beyinciyyə
- C) epidural
- D) subaraxnoidal
- E) subdural

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. “Неонатология” (в 2-х томах), том 1. 2004, стр.466.

46) Aşağıdakılardan hansı streptodermiyalara aiddir?

- A) Epidermik qovucuq
- B) Ritter dermatiti
- C) Sadə ektima
- D) Vezikulopustilyoz
- E) Fiqner psevdofurunkulyozu

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 186.

47) Lesaj simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

- A) pnevmoniya
- B) osteomielit
- C) sepsis
- D) meningit
- E) ensefalit

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. “Неонатология” (в 2-х томах), том 2. 2004, стр.23.

48) Alacil sindromuna hansı aid deyil?

- A) tam xolestaz
- B) hemihipertrofiya
- C) hiperxolesterinemiya
- D) hepatosplenomeqaliya
- E) xarakterik sifət quruluşu

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 275.

49) Öd yollarının atreziya və hipoplaziyası üçün nə xarakterik deyil?

- A) trombositoz
- B) hemorragik sindrom
- C) protrombin kompleksi faktorlarının aşağı səviyyəsi
- D) qələvi fosfatazanın yüksəlməsi
- E) hipoproteinemiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya” (dərslük). 2007, səh. 275.

50) Ödün qatılaşması sindromu üçün nə xarakterik deyil?

- A) protrombin səviyyəsinin azalması
- B) sidikdə öd piqment daşlarının olması
- C) qələvi fosfatazanın artması
- D) xolesterinin artması
- E) qeyri-düz bilirubinin artması

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 276.

51) Xlamidioz üçün nə xarakterik deyil?

- A) irinli konyunktivit
- B) öskürək

- C) diareya
- D) eozinofiliya
- E) infeksiyon toksikozun olmaması

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Неонатология» (в 2-х томах), 2004, том 2, стр.82.

52) Yenidoğulanlarda qan kütləsi bədən kütləsinin neçə faizini təşkil edir?

- A) 6-8%
- B) 10%
- C) 20%
- D) 15%
- E) 5%

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 294.

53) Bunlardan hansı hemolitik anemiyalara aid deyil?

- A) oraq hüceyrəli anemiya
- B) talassemiya
- C) qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza defisiti
- D) Minkovski – Şoffar anemiyası
- E) defisitli anemiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 303.

54) Bruton xəstəliyi (anadangəlmə aqammaqlobulinemiya) immunodefisitə hansı tipinə aiddir?

- A) T sisteminin defisiti
- B) kombinə olunmuş immunodefisit
- C) faqositoz sisteminin defisiti
- D) komplement sisteminin defisiti
- E) B sisteminin defisiti

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh.304.

55) Anuriyanın prerenal forması hansı patoloji vəziyyət zamanı yaranır?

- A) sidik kisəsinin şişi
- B) kəskin hipoksiya
- C) sidik turşusu infarktı
- D) böyrək polikistozu
- E) böyrək ageneziası

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 424.

56) Sağlam yenidoğulanlarda sidikdə hansı silindrlər ola bilər?

- A) hialin
- B) leykositar
- C) dənəli
- D) epitelial
- E) eritrositar

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 426.

57) Neonatal tranzitor tireotoksikoz zamanı diaqnostikada bu fikirlərdən hansı yanlıştır?

- A) qanda TSH-nin səviyyəsinin enməsi
- B) P-Q intervalının qısalması
- C) ürək tonlarının güclənməsi
- D) sümük yaşının hestasiya yaşına görə çox olması
- E) EKQ-də P, R və T dişciklərinin yüksək olması

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh.440.

58) Beyin ödeminin müalicəsində bunlardan hansı istifadə olunmur?

- A) deksametazon
- B) laziks
- C) pirasetam
- D) prozerin
- E) mannitol

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 472.

59) Göz qapaqlarının kənarlarının bitişməsi necə adlanır:

- A) Entropion
- B) Ektropion
- C) Ankiloblefon
- D) Blefarofimoz
- E) Epikant

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 484.

60) Hansı dərmanın ağızdan qəbulu nekrotik enterokolitə səbəb ola bilər?

- A) simetikon
- B) ampisillin
- C) saxaroza
- D) prebiotik
- E) gentamisin

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 495.

61) Doğum evində antibiotiklərlə müalicə nə zaman göstəriş deyil?

- A) Ağır tənəffüs pozuntusu sindromu
- B) Mübadilə qan köçürülməsi
- C) Göbək venasının kateterizasiyası
- D) Tranzitor taxipnoe
- E) Subaraxnoidal qanaxma

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 499.

62) Vaxtında və vaxtından əvvəl yenidoğulanlar üçün şöbələrdə sistem antibiotiklərlə müalicə nə zaman göstəriş deyil?

- A) Uşaqda infeksiyon patologiyaya şübhə varsa və uşağın vəziyyəti gözləmə taktikasına imkan vermirsə
- B) Göbək damarlarının və iri venaların kateterizasiyası zamanı
- C) Ex yuvantibus
- D) irinli konyunktivit
- E) Kortikosteroidlər uzun müddət işlənərsə

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 499.

63) Hansı dərmanlar qaraciyər fermentlərinin sintezini yaxşılaşdırır?

- A) eritromisin
- B) fenobarbital
- C) indometasin
- D) metronidazol
- E) tetrasiklin

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 498.

64) Çəkisi 1500 q-a qədər olan uşaqlara hər bir inyeksiya zamanı əzələ daxilinə neçə ml-dən artıq maye yeridilməməlidir?

- A) 2 ml
- B) 0,5 ml
- C) 1 ml
- D) 4 ml
- E) 3 ml

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 498.

65) “Boz uşaq sindromu” hansı antibiotikın ađırlaşmasıdır?

- A) levomisetin
- B) seftazidim
- C) gentamisin
- D) ampisillin
- E) karbenisillin

Ədəbiyyat: Tađıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslik). 2007, səh. 502.

66) Süd ifrazını artıran maddə hansıdır?

- A) oral kontraseptiv maddələr
- B) oksitosin
- C) estrogen
- D) adrenalin
- E) progesteron

Ədəbiyyat: Tađıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslik). 2007, səh. 505.

Tarix: 29.09.2023 15:08:16

67) Süd ifrazını azaldan maddə hansıdır?

- A) estrogen
- B) nikotin turşusu
- C) piridoksin
- D) apilak
- E) prolaktin

Ədəbiyyat: Tađıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslik). 2007, səh. 505.

68) Yanlış ifadəni seçin:

- A) Həyatın 1-ci həftəsində antibiotiklərin böyrəklərdən xaric edilməsi zəifdir.
- B) Venadaxili damcı üsulu ilə antibiotikin yeridilməsi məqsədəuyğun deyil, çünkitez parçalanır.
- C) Yenidoğulanlarda vəziyyətlərinin ađırlığı ilə əlaqədar antibiotiklər 35 gün və daha çox təyin olunur.
- D) Yenidoğulanlarda gentamisinin istifadəsi “boz sindrom” adlanan ađırlaşmaya gətirib çıxara bilər.
- E) Sulfanilamidlərin istifadəsi hemoqlobini oksidləşdirib methemoqlobinə çevirir.

Ədəbiyyat: Tađıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslik). 2007, səh. 502.

69) Süd verən analara hansı dərmanlar əks göstəriş deyil?

- A) Metronidazol
- B) Levomisetin
- C) Fenoterol
- D) Rezerpin
- E) Propiltireourasil

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 508.

70) Yenidoğulanların fizioloji göstəricilərindən hansı yanlışdır?

- A) Sidik ifrazı gün ərzində 20-25 dəfə olur
- B) Yuxu gün ərzində 18-20 saat olur
- C) Ürək yığılmaları dəqiqədə 160-180-dir
- D) Tənəffüs hərəkətləri dəqiqədə 40-50-dir
- E) Defekasiya gün ərzində 3-7 dəfə ola bilər

Ədəbiyyat: İsayev İ. “Uşaq xəstəliklərinin propedevtikası”. 2011, səh. 29.

71) Topuq testi nə zaman aparılır?

- A) doğuşdan 1 həftə sonra
- B) doğuşdan sonra birinci 48 saat ərzində
- C) doğuşdan 3-5 gün sonra
- D) doğuşdan bir ay sonra
- E) doğuşdan dərhal sonra

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007

72) BDİL sindromu ilə doğulan uşaqlara aid yanlış ifadəni seçin:

- A) Hipoplastik variant bütün fetometrik göstəricilərin proporsional olaraq geri qalması ilə xarakterizə olunur.
- B) Displasik variantda dölün zədələnməsi hamiləliyin üçüncü trimestrində baş verir.
- C) BDİL-in hipotrofik variantında yenidoğulmuşda yalnız kütlə defisiti qeyd edilir.
- D) Hipoplasik variantda dölün zədələnməsi hamiləliyin ikinci trimestrində baş verir.
- E) BDİL perinatal xəstələnmə və ölümün ən çox rast gəlinən səbəblərindən biridir.

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 115.

73) Bunlardan hansı fetopatiyalara aid deyil?

- A) uraxus
- B) böyrəyin displaziyası
- C) mikrocefaliya
- D) kriptorxizm

E) teratoma

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 85.

74) Bioloji mühitlərdə “bayquş gözü” hüceyrələrinin tapılması hansı infeksiya üçün xarakterikdir?

- A) sifilis
- B) sitomeqalovirus
- C) məxmərək
- D) toksoplazmoz
- E) herpes

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 196.

75) Qoxzinger infiltratları hansı anadangəlmə infeksiya üçün xarakterikdir?

- A) xlamidioz
- B) listerioz
- C) toksoplazmoz
- D) məxmərək
- E) sifilis

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Неонатология» (в 2-х томах), том 2. 2004, стр.81.

76) Yenidoğulmuşlarda nekrotik yaralı enterokolitin qiymətləndirilməsi üçün hansı təsnifatdan istifadə olunur?

- A) Bollard
- B) Silverman
- C) Klaudin Amiel-Tisen
- D) BELL
- E) Duboviç

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 247.

77) Fenilketonuriyanı aşkar etmək üçün nə aparılmalıdır?

- A) Seybin – Feldman testi
- B) Vasserman reaksiyası
- C) Felin sınağı
- D) Apt testi
- E) Peyer reaksiyası

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 109.

78) Hepatit B-nin profilaktikasına aid yanlış ifadəni seçin:

- A) Anti-HBs immunoqlobulin ən gec doğuşdan sonra 48 saat ərzində vurulmalıdır.
- B) Vaksinasıya doğuşdan sonra 12 saat müddətində aparılmalıdır.
- C) Döşlə əmizdirmə dayandırılmalıdır.
- D) Qanında HBsAg olan ana və onun körpəsi təcrid edilmirlər.
- E) Keysəriyyə kəsiyi ilə doğuş yoluxmanın qarşısını almır.

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 206.

79) Anadangəlmə məxmərək üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvi deyil?

- A) hiperemik dəri fonunda xırda səpgilər
- B) xoriorretinit
- C) eşitmə sinirinin zədələnməsi
- D) anadangəlmə ürək qüsuru
- E) katarakta

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 208.

80) Enterovirus hansı bioloji materialda tapılmır?

- A) faringeal selikdə
- B) sidikdə
- C) bioptatda
- D) likvorda
- E) nəcisdə

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 213.

81) Toksoplazmozun aşkar edilməsi üçün hansı testdən istifadə olunur?

- A) Seybin – Feldman
- B) Feliq
- C) Vasserman
- D) Peyer
- E) Apt

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 216.

82) Granulomatosis infantiseptica hansı bətdaxili infeksiya üçün xarakterikdir?

- A) Listerioz
- B) Məxmərək
- C) Toksoplazmoz

- D) Herpetik infeksiya
- E) Sifilis

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 222.

83) Listeriyalar hansı antibiotiklərə həssas deyillər?

- A) sefalosporinlər
- B) penisillinlər
- C) aminoqlikozidlər
- D) karbopenemlər
- E) makrolidlər

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh.222.

84) Suçiçəyi olan yenidoğulan uşaqların müalicəsinə aid yanlış ifadəni seçin:

- A) Səpginin başladığı gündən ən azı 14 gün sağlam uşaqlardan təcrid edilməlidir.
- B) Suçiçəyi xəstəliyinin əlaməti olan yenidoğulan 10 gün müddətində asiklovir almalıdır.
- C) Anası suçiçəyi keçirməmiş yenidoğulan uşaq suçiçəyi ilə xəstə personalla təmasda olubsa, 96 saat ərzində uşağa və anasına spesifik və ya polivalent immunoqlobulin vurulmalı və asiklovir təyin edilməlidir.
- D) Doğuşdan 5 və daha çox gün əvvəl suçiçəyi ilə xəstələnmiş anadan olmuş yenidoğulana heç bir spesifik müalicə aparılmır.
- E) Ana doğuşa 4-5 gün qalmış və ya doğuşdan sonra ilk günlər suçiçəyi ilə xəstələnərsə, doğulan kimi uşağa spesifik və ya polivalent immunoqlobulin vurulmalıdır.

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 210.

85) Yenidoğulanlarda görmə funksiyası hansı reflekslə yoxlanılır?

- A) Klod-Bernar-Qorner
- B) Robinson
- C) Finkelşteyn
- D) Peres
- E) Peyper

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 65.

86) Makroqlossiya nə zaman olmur?

- A) Hipotireoz
- B) Bekvit sindromu
- C) Şəkərli diabetli analardan doğulan yenidoğulanlarda

- D) Daun xəstəliyi
- E) Pyer-Robin sindromu

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007.

87) CREST sindromuna nə aid deyil?

- A) teleangioektaziya
- B) kalsinoz
- C) Reyno sindromu
- D) pilorospazm
- E) sklerodaktiliya

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Неонатология» (в 2-х томах), том 2. 2004, стр.307.

88) VATER sindromunun əlamətlərinə nə aid deyil?

- A) radial sümüyün və böyrəklərin anomaliyaları
- B) traxeo-efozageal fistula
- C) baş beyin anomaliyaları
- D) onurğa sütununun anomaliyaları
- E) qida borusunun və anusun atreziyası

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya» (dərslük). 2007, səh. 110.

89) Yenidoğulanların müayinəsi zamanı əzələ tonusunun artması nə zaman müşahidə olunur?

- A) Böyrəküstü vəzin çatışmazlığı
- B) Boynun yuxarı seqmentlərinin zədələnməsi
- C) Subdural qansızma
- D) Metabolik asidoz
- E) Subaraxnoidal qansızma

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya». 2007, səh.57.

90) Arqayl Robertson sindromuna hansı anadangəlmə infeksiya zamanı rast gəlinir?

- A) CMV
- B) Herpes
- C) Toksoplazmoz
- D) Sifilis
- E) Rubella

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. «Neonatologiya». 2007, səh.60.

91) Anadangəlmə hipotireoz zamanı bunlardan hansı olmur?

- A) Dərinin qalınlaşması
- B) Qəbizlik
- C) Makroqlossiya
- D) Tranzitor sarılığın uzanması
- E) Vaxtından əvvəl doğulma

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya". 2007, səh.445.

92) Anadangəlmə hipotireoz üçün bunlardan hansı xarakterik deyil?

- A) Diz oynaqlarının rentgenoramında "sümük yaşının" hestasiya yaşından geriliyi
- B) Bradikardiya
- C) EKQ-də QRS dişciklərinin voltajının yüksəlməsi
- D) Hiperlipidemiya
- E) Hiperxolesterinemiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya". 2007, səh.446.

93) Adrenogenital sindrom zamanı hansı müayinə düzgün deyil?

- A) Qanda kortizolun miqdarının azalması
- B) Plazmada AKTH-nın səviyyəsinin yüksəlməsi
- C) Qanda 17-hidroksiprogesteronun səviyyəsinin yüksəlməsi
- D) Sidikdə 17-OKS-nin ekskresiyasının yüksəlməsi
- E) Sidikdə 17-OKS ekskresiyasının azalması

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya". 2007, səh.451.

94) Böyrəküstü vəzi çatışmazlığının kəskin krizi zamanı düzgün olmayan göstərici hansıdır?

- A) Hipoxloremiya
- B) Hiperkalemiya
- C) Hipoqlikemiya
- D) Metabolik alkaloz
- E) Hiponatriemiya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya". 2007, səh.452.

95) Aşağıdakılardan hansı göbəyin infeksiyon xəstəliyinə aiddir?

- A) Amniotik göbək
- B) Mekkel divertikuliti

- C) Göbəyin xorası
- D) Göbəyin funqusu
- E) Göbəyin fistulası

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya”. 2007, səh.188.

96) İrinli meningit olan yenidoğulanda onurğa beyin mayesi müayinəsi zamanı hansı dəyişiklik olmur?

- A) 1 mm³-də hüceyrələrin orta miqdarı >35
- B) Sitoz >60%
- C) Qlükozanın likvordakı miqdarınının qandakı miqdarına nisbəti >40
- D) Zülalın miqdarı >1,70
- E) Neytrofillər üstünlük təşkil edir

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya”. 2007, səh.252.

97) Osteomielit xəstəliyi başlanandan sonra rentgen müayinəsində baş verən dəyişikliklər nə zaman ortaya çıxır?

- A) Rentgen müayinəsində heç bir dəyişiklik baş vermir
- B) 4-5 gün sonra
- C) 14 gün sonra
- D) 2-3 gün sonra
- E) 7-10 gün sonra

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya”. 2007, səh.254.

98) Albinizmin II tipi I tipindən hansı əlaməti ilə fərqlənir?

- A) İntellektin geri qalması
- B) Gözlərin pigmentasiyasının zəif olması
- C) Yaş artdıqca dərinin, tüklərin, gözün rənginin dəyişməsi
- D) Eşitmənin zəifləməsi
- E) Boyun inkişafının ləngiməsi

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. “Neonatologiya”. 2007, səh.168.

99) Hansı dəri xəstəliyində başlanğıc dövründə eozinofillərin kəskin miqdarda artması patognomik sayılır?

- A) Elers – Danlos sindromu
- B) Vulqar ixtioz
- C) Brök eritrodermiyası
- D) Bullyoz epidermoliz
- E) Blox – Sultsberger sindromu

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya". 2007, səh.174.

100) Bekvit sindromu zamanı bunlardan hansı olmur?

- A) Mikroqnatıya
- B) Böyrəklərin qabıq maddəsinin hiperplaziyası
- C) Makroqlossiya
- D) Göbək ciyəsi yırtığı
- E) Visseromeqaliya

Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. "Neonatologiya". 2007, səh.189.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün