Ftiziatriya

1) Vərəm ocağı nədir?

A) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə insan
B) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə insan və xəstə heyvanların yaşadığları məkan
C) Xəstə insanların yaşayış yeri.
D) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə heyvanların yaşayış yeri
E) Xəstə insanların toxunduğu əşyalar və ya mikobakteriya ifraz edən heyvanlar

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

2) Xəstənin yaşadığı yer hansı halda ən qorxulu vərəm ocağı sayılır?

A) Ocaqda infiltrativ vərəm xəstələri yaşayırsa
B) Ocaqda ilkin vərəm kompleksi olan xəstə yaşayırsa
C) Ocaqda bəlğəmində molekulyar-genetik Genexpert MBT/Rif metodu ilə VMB-nin DNT-sı aşkarlanan xəstə yaşayırsa
D) Ocaqda bəlğəmdə mikroskopik üsulla VMB aşkarlanan xəstə yaşayırsa
E) Ocaqda fibroz kavernoz vərəm xəstəsi yaşayırsa

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.
E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

3) Xəstəliyin ən çox rast gəlinən yayılma yolları?

A) Tibbi manupulyasiyalarla
B) Dəri və selikli qişaların zədələnməsi ilə
C) Ərzaq məhsulları ilə
D) Hava-damcı yolu
E) Cift vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.
E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

4) Vərəmə görə yoluxucu sayılan xəstə necə təyin olunur?

A) Genetik əlamətlərə görə (yaxın qohumluq), yanaşı xəstəlik, immunoloji əlamət, sosial faktorlar
B) İmmunoloji əlamətlərə görə
C) Bəlğəmin sadə mikroskopiyası yolu ilə

sınaq üçün istifadə üçün

D) Yaş və cinsə, irsə görə
E) Yanaşı xəstəliklər və sosial faktorlar (miqrant, qaçqın, evsiz- eşiksiz, məhbusluqdan azad olunanlar və s.) iş şəraitinə görə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

5) Vərəmə yoluxma riski yüksək olanlara hansılar aiddir?

A) Yaşlı insanlar
B) Gənc yaşda olanlar
C) Yeniyetmələr
D) Südəmər və 3 yaşa qədər uşaqlar
E) Qocalar və ahıllar

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999.

6) Sosial risk qrupları hansılardır?

A) Miqrantlar
B) Yaşayış yeri olmayan şəxslər
C) Sadalanların hamısı
D) Keçmiş məhbuslar
E) Alkoqoliklər

Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

7) Epidemioloji vəziyyətə qiymət vermək üçün hansı göstəricilər mütləqdir?

A) Xəstələnmə
B) İnfeksiyaya yoluxma
C) Xəstələnmə, xəstəlik, ölüm, infeksiyaya yoluxma
D) Xəstəlik
E) Ölüm

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

8) Vərəmə görə xəstəlik anlayışını aşağıdakılardan hansılar ifadə edir?

Sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) İlin axırına qeydiyyatda olan fəal vərəmli xəstələrin sayı
B) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəm xəstələrinin sayı
C) İlin axırına qeydiyyatda olan xəstələrin 100.000-ə vurularaq əhalinin orta illik sayına bölünməsi
D) Ərazidə olan bütün xəstələr içərisində vərəm xəstələrinin xüsusi çəkisi
E) Dispanser müşahidəsində olan xəstələrin sayı

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

9) Vərəmdən ölüm göstəricisinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Vərəm dispanserində qeydiyyatda olan xəstələrin arasında vərəmdən ölənlərin sayı
B) 100nəfər əhaliyə görə il ərzində səhiyyənin bütün sahələri üzrə vərəmdən ölənlərin sayı
C) Səhiyyənin bütün xidməti sahələrində il ərzində vərəm xəstəliyindən ölənlərin sayı
D) İl ərzində vərəmdən ölənlərin sayı
E) İl ərzində səhiyyənin bütün sahələrində qeydə alınan vərəmdən ölənlərin sayının 100 minə hasilinin əhalinin orta illik sayına nisbəti

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

10) Kontingentin abasilləşməsi göstəricisi hansıdır?

A) Basilyarlıq qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin sayıdır;
B) VMB (-) mənfi olan xəstələrin bütün kontingent içərisində faizidir
C) VMB (-) mənfi olan xəstələrin sayının 100 VMB (+) müsbət olan xəstələrə nisbətidir
D) Cari ildə abasilləşmiş qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin cəmi sayının 100-ə hasilinin kontingentdə olan basilyar xəstələrin sayına nisbəti
E) Bütün sayılanlardır

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

11) Vərəmlə xəstələnmə göstəricisi hansıdır?

virsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Hesabat ilində ilkin qeydiyyata alınan fəal vərəmli xəstələrin sayının 100 min nəfərə vurularaq əhalinin sayına olan nisbətidir
B) Cari ildə aşkar olunan vərəmli xəstələrin sayıdır
C) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəmli xəstələrin sayıdır
D) 10000 nəfər əhaliyə görə vərəmli xəstələrin sayıdır
E) Göstərilən ərazidə yaşayan əhalinin sayına görə xəstələrin faizidir

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

12) Vərəmdən kliniki sağalma necə hesablanır?

A) III və V qrup xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentə nisbəti
B) III dispanser qrupuna keçənlərin sayının 100-ə hasilinin kontingentdə olan fəal xəstələrin orta illik sayına nisbətidir
C) Qeydiyyatdan çıxarılan xəstələrin 100-ə hasilinin kontingentin cəmi sayına nisbəti
D) Fəal qrupa keçənlərin 100-ə hasilinin kontingentin cəmi sayına nisbəti
E) Bütün sayılanlar düzgündür

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

13) Vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxma riski yüksək olan uşaqlar qrupuna hansılar aid deyil?

A) Yarımçıq doğulmuşlar, tez-tez və uzun müddətli xəstələnən uşaqlar
B) Postvaksinal çapığı olmayanlar
C) Vərəm ocaqlarında yaşayan uşaqlar
D) Vərəm əleyhinə peyvənd almayan uşaqlar
E) Vərəm keçirənlər

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi" Bakı 2006

14) Vərəm əleyhinə peyvəndlərin təşkilində dispanserin fəaliyyəti nədən ibarətdir?

A) Bütün cavablar doğrudur
B) Metodik təlimatlar və instruksiyaların yaradılması, maarifləndirmə
C) Vərəm ocaqlarında vaksinasiya və revaksinasiyanın təşkili
D) Postvaksinal immunitetin formalaşdığı dövr ərzində eyni mənzildə yaşayan VMB ifraz edən xəstələrin izolyasiyasının təşkili
E) Vaksinasiyanın aparılması üçün tibb bacılarının və həkimlərin hazırlanması

sinaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

15) Vərəm əleyhinə peyvənd materialı hansı standartlara uyğun olmalıdır?

A) Bütün cavablar doğrudur
B) Zəif virulent olmalıdır
C) Steril olmalıdır
D) İmmunogen olmalıdır
E) Saxlanma zamanı stabil qalmalıdır

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

16) Vərəm əleyhinə peyvənd materialının optimal saxlanma temperaturu neçədir?

A) 2° C
B) 0° C
C) 5° C
D) 2 - 8° C
E) 4° C

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 7 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

17) Vərəm əleyhinə peyvəndin orqanizmə daxil edilmə yolu hansıdır?

A) Dəri altı
B) Dəri üstü
C) Əzələ daxili
D) Daxilə və buruna
E) Dəri içi

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

18) Düzgün aparılmış vaksinasiya və revaksinasiyadan sonra dəridə nə qalır?

A) Bütün sayılanlar
B) Ulduzvari çapıq
C) Ləkə

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Kelloid çapıq
E) Çapıq

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018

19) vaksinasiyadan sonra əmələ gələn çapığın ölçüsü neçə mm olmalıdır?

A) 3-5 mm
B) 1-3 mm
C) 5-8 mm
D) 10-15 mm
E) 2-10 mm

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

20) Sağlam yenidoğulmuşlara VƏP nə vaxt edilir?

A) Həyatının 1-ci ayında
B) Həyatının 5-7-ci günü
C) Həyatının 1-ci sutkasında
D) Həyatının 10-12-ci günündə
E) Həyatının 10-cu sutkasında

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018

21) Vərəm əleyhinə vaksinin açıldıqdan sonra saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) Müddətsizdir
B) 8 saat
C) Bir sutka
D) 4-6 saat
E) 7 saat

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 9 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

22) 2 TV ilə Mantu sınağı nə vaxt müsbət sayılır?

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Papulanın ölçüsü 3-4 mm olarsa
B) Papulanın ölçüsü 5 mm və daha böyük olarsa
C) Papulanın ölçüsü 1-2 mm olarsa
D) Hiperemiya əmələ gələrsə
E) Reaksiyanın izi yoxdursa

Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006

23) Bir yaşa qədər uşaqlarda dəri içərisinə daxil edilən vərəm əleyhinə peyvəndin miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 0.2 ml
B) 0.05 ml
C) 0.025 ml
D) 1.0 ml
E) 0.1 ml

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 7 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

24) Vərəm əleyhinə peyvənd aparılandan sonra ailədə vərəmli xəstə olarsa uşağın izolyasiya müddəti nə qədərdir?

A) 1 il
B) 5 ay
C) 1 ay
D) İzolyasiya vacib deyil
E) 2 ay

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018

25) Postvaksinal immunitetin müddəti nə qədərdir?

A) Bütün həyat boyu saxlanılır
B) 6 il
C) 8 ildən artıq
D) 2 il
E) 1 il

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

26) Mikobakteriya ifraz edən kontingentin abasilləşməsi göstəricisi necə hesablanır?

A) Basilyar qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentin sayına nisbətidir
B) VMB mənfi olan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin VMB (+) olan xəstələrin sayına nisbətidir
C) VMB (-) olan xəstələrin bütün kontingentə olan nisbətidir
D) Cari ildə abasilləşmiş və basilyar qeydiyyatından çıxarılmış xəstələrin sayının 100-ə hasilinin ilin axırında qeydiyyatda olan VMB (+) müsbət olan xəstələrin orta illik sayına olan nisbətidir
E) I qrup dispanser qeydiyyatında olan abasilləşən xəstələrin sayıdır

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.

27) Erkən residivlərin göstəricilərinin artması nə ilə əlaqədardır?

A) Bütün sadalananlar
B) Fəal xəstələrin vaxtından əvvəl qeyri fəal (III) dispanser qrupuna köçürülməsi nəticəsində
C) Dispanser qeydiyyatında olan xəstələrin müşahidəsindəki nöqsanlar ilə
D) Xəstələrin vaxtından əvvəl bir qrupdan digərinə keçirilməsi nəticəsində
E) Natamam müalicə ilə

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 1998

28) Vərəm xəstəliyinin intensiv göstəricisi sayılan xəstələnmə nə deməkdir?

A) 100 min əhaliyə görə ilkin qeydiyyata götürülən fəal xəstələrin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti
B) İlkin xəstələr arasında "viraj"ın səviyyəsi
C) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi
D) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmin səviyyəsi
E) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

29) Vərəmlə xəstələnmənin intensiv göstəricisi nə deməkdir?

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 100 min əhaliyə görə dispanser qeydiyyatında olan fəal xəstələrin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti
B) İlkin xəstələr arasında "viraj"ın səviyyəsi
C) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi
D) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi
E) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmin səviyyəsi

Ədəbiyyat: С.П.Буренков. Современные принципы противотуберкулезный работы в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

30) Vərəmdən ölümün intensiv göstəriciləri hansılardır?

A) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmdən ölənlərin səviyyəsi
B) 100 min əhaliyə görə dispanser qeydiyyatında olan fəal xəstələrdən ölənlərin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti
C) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmindən ölənlərin səviyyəsi
D) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmdən ölənlərin səviyyəsi
E) İlkin xəstələr arasında səpələnmiş vərəmdən ölənlərin səviyyəsi

Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

31) Epidemioloji gərginlik hansı göstəricilərlə izah olunur?

A) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi
B) İlkin xəstələr arasında tuberkulin sınağının "hiperergiya"sının səviyyəsi
C) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi
D) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz və vərəm meningitinin səviyyəsi
E) İlkin xəstələr arasında "viraj"ın səviyyəsi

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

32) Yoluxma ilə mikobakteriya ifraz edən xəstələrin sayı arasındakı əlaqədə hansı uyğunluq doğru sayılır?

A) 1% yoluxma 150 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur
B) 1% yoluxma 1000 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur
C) 1% yoluxma 50 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur
D) 1% yoluxma 150-500 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur
E) 1% yoluxma 100 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002. Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

33) İnsanların yoluxma mənbəyi olan heyvanlar hansılardır?

A) Quşlar
B) Sürünənlər
C) Pişiklər və itlər
D) İri buynuzlu qaramal
E) Suda quruda yaşayanlar

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları" Bakı 2003.

34) Vərəmlə yoluxma riski yüksək olan uşaqlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Tez-tez və uzun müddət xəstə olan və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar
B) Vərəm ocaqlarında yaşayanlar
C) KJB vaksinasiya olunmamışlar
D) Bütün sadalananlar
E) Postvaksinal çapıqları olmayanlar

Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi" Bakı 2006

35) Yeniyetmələr üçün vərəmə görə "risk" qruplarına sadalananlardan hansı aid deyil?

A) Vərəm ocağında yaşayanlar
B) Çoxdan yoluxmuşlar
C) Ümumi pediatrik şəbəkədə risk qrupu kimi qeydiyyatda olmayanlar
D) Rentgenoloji kiçik və böyük qalıq əlamətləri olanlar
E) Əvvəlcə lokal vərəm keçirmiş, kliniki sağalanlar

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003.

36) Tez-tez xəstələnən uşaq və yenyetmələrin vərəmə görə müayinəsi kimlər tərəfindən aparılır?

A) Həkim-terapevt

Sınaq üçün istifadəsiz istifadə üçün

B) Həkim-mütəxəssis tərəfindən
C) Ftiziatr
D) Ftiziatr və pediatr tərəfindən
E) Cərrahlar tərəfindən

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

37) Ümumi pediatrik şəbəkə tərəfindən həyata keçirilən vərəm əleyhinə tədbirlər hansılardır?

A) Kütləvi tuberkulin diaqnostika və fərdi tuberkulin diaqnostika
B) Heç biri
C) Kütləvi tuberkulindiaqnostika
D) Hər biri
E) Fərdi tuberkulin diaqnostika

Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006

38) Sanitar-epidemioloji xidmətin həyata keçirdiyi vərəm əleyhinə tədbirlər hansılardır?

A) KJB vaksinasiya və revaksinasiyanın planlaşdırılması
B) Bütün sadalananlar
C) KJB pevəndinin aparılmasının düzgünlüyünə nəzarət
D) KJB vaksininin saxlanılmasının düzgünlüyünə nəzarət
E) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın planlaşdırılması və onun icrası üzərində nəzarət

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

39) Epidemioloji cəhətdən gərgin vəziyyət zamanı vərəmlə xəstələnmək təhlükəsi kimlərdə daha çox müşahidə olunurr?

A) Ahıl yaşlılarda
B) Orta yaşlılarda
C) Uşaqlarda
D) Uşaq və yeniyetmələrdə
E) Yeniyetmələrdə

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm

Sınaq üçün istifadə üçün

xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

40) Vərəm keçirmiş insanlarda “superinfeksiya” nəticəsində xəstələnmə hansı halda daha tez baş verir?

A) Vərəm keçirmiş və kliniki sağalmış şəxsin orqanizminə infeksiyanın daxil olması zamanı
B) Kiçik qalıq əlaməti ilə nəticələnmiş kliniki sağalmış insanların orqanizminə infeksiyanın daxil olması
C) Bütün sadalananlar
D) Böyük qalıq əlaməti ilə nəticələnmiş kliniki sağalmış şəxslərdə yanaşı somatik xəstəliklər olduqda (şəkərli diabet)
E) Artıq xəstələnmiş orqanizmə kənardan infeksiyanın daxil olması zamanı

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

41) “Endogen reinfeksiya”ya hansılar aiddir?

A) Orqanizmə infeksiyanın daxil olması nəticəsində daxili orqanlarda vərəm ocaqlarının yaranmaması
B) Sadalananların hamısı doğrudur
C) Sadalananların heç biri doğru deyil
D) Orqanizmə təzə daxil olmuş infeksiya nəticəsində vərəm ocaqlarının yaranması
E) Əvvəllər orqanizmdə gizli keçmiş vərəm ocağının aktivləşməsi

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.

42) Vərəmlə xəstələnmə üçün risk qrupu aşağıdakılardan hansılar sayılmır?

A) Miqrantlar
B) Normal qidalananlar və mənzil məişət şəraiti kafi olanlar
C) Evsizlər
D) Qaçqınlar
E) Kasıblar

Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

43) Əvəllər vərəm keçirmiş, rentgenoloji qalıq əlamətləri olan adamlarda vərəmlə xəstələnmə ehtimalı sağlam adamlara nisbətən neçə dəfə yüksəkdir?

A) 17 dəfə

Sinaq.az öğrənişsiz istifadə üçün

B) 2 dəfə
C) 3 dəfə
D) 70 dəfə
E) 5-10 dəfə

Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

44) ÜST kriteriyalarına görə vərəm xəstələrinə kimlər aid olunur?

A) Sadalananların hamısı
B) Rentgenoqrammada spesifik dəyişikliklər vərəmi yaxud kazeoz nekrozla qiqanthüceyrəli qranulemalar şəklində morfoloji dəyişikliklərlə təsdiq olunan xəstələr
C) Bəlğəmdə və digər möhtəviyyatlarında vərəm mikobakteriyası tapılan xəstələr
D) Zədələnmiş ocaqdan və ya toxumalardan biopsiya yolu ilə alınmış materialda vərəm mikobakteriyalarının aşkar olunması
E) Residivli öskürək, bəlğəm ifrazı, rentgenoqrammada spesifik dəyişikliklərlə xarakterizə olunan xroniki xəstələr

Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза: рекомендации для национальных программ ВОЗ. Второе издание 1998,

45) KJB vaksinasiya və revaksinasiya kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

A) Doğum evlərinin işçiləri
B) Ümumi tibbi şəbəkə işçiləri tərəfindən
C) Ftiziopediatr tərəfindən
D) Vərəm dispanserinin işçiləri tərəfindən
E) Ftiziatr tərəfindən

Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

46) Sadalananlardan uşaq və yeniyetmələrin vərəm əleyhinə stasionarının əsas vəzifələrinə aid olmayan hansıdır?

A) Diaqnostika
B) Uşaq və yeniyetmələrə dispanser nəzarəti
C) Sanitar maarif işinin aparılması
D) Müalicə
E) Sağlamlaşdırma tədbirləri

sınaq üçün ödənişsiz istifadə

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. əlavə 3. Bakı 2001;

47) Ftiziatrın öz işində istifadə etdiyi əsas epidemioloji göstərilcilər hansılardır?

A) Bütün sadalananlar
B) Əhalinin vərəm mikobakteriyası ilə yoluxma riski
C) Vərəmlə xəstələnmə
D) Vərəmdən ölüm
E) Xəstəlik göstəricisi

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.

48) KJB vaksinasiyası üçün hansı preparat istifadə edilir?

A) Pirke sinağı üçün tuberkulin
B) Koxun alt tuberkulini
C) PPD-L tuberkulini
D) KJB və KJB –M vaksini
E) Standart tuberkulin məhlulu

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001;

49) KJB vaksini hansıdır?

A) Sadalananların heç biri düz deyil
B) Ölü mikobakteriyalar
C) Apatogen, zəif virulent KJB ştammı mikobakteriyaları
D) Diri mikobakteriyadır
E) Tərkibində mikobakteriyanın elementləri yoxdur

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001;

50) Vaksinasiyanın effektsizlik göstəricisi hansıdır?

A) 4 mm ölçüdə çapığın olması
B) 5-8 mm ölçüdə çapığın olması
C) Çapıq yoxdur
D) 9-10 mm ölçüdə çapığin olması
E) 1-3 mm

sınaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Н. Кривохиж. Специфицеская профилактика и химиопрофилактика. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001;

51) KJB vaksinasiyası kim tərəfindən aparılmalıdır?

A) Pediatr və sahə tibb bacısı
B) Xüsusi təlimli tibb bacısı (vaksinator) tərəfindən
C) Ftiziatr
D) Sahə tibbi bacısı
E) Pediatr

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

52) KJB vaksinasiyasının aparılmasına və keyfiyyətinə kim nəzarət edir?

A) Vərəm dispanserinin baş həkimi
B) Sahə epidemioloqu
C) Bağça müdirəsi
D) Məktəb direktoru
E) Poliklinikanın baş həkimi

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları" Bakı 2003.

53) Şəhərdə fəal vərəm xəstələrinin müalicə olunduğu çarpayılar il ərzində neçə gün işləməlidir?

A) 290 gün
B) 340 gün
C) 300 gün
D) 320 gün
E) 360 gün

Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

54) Hansı vərəm ocağı daha təhlükəlidir?

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ocaqda 2 yaşlı xəstə yaşayır mənzil şəraiti qənaətbəxşdir
B) Ocaqda uşaq, yeniyetmə və hamilə qadın yaşayır, mənzil şəraiti qeyri-kafidir
C) Ocaqda hamilə qadın yaşayır, lakin mənzil şəraiti qənaətbəxşdir
D) Ocaqda uşaq,yeniyetmə yaşayır, lakin mənzil şəraiti qənaətbəxşdir
E) Ocaqda yaşlı insan yaşayır, mənzil şəraiti qeyri-kafidir

Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

55) Vərəm xəstəliyinin yoluxucu formalarının aşkarlanması üçün tətbiq olunan metodlar hansılardır?

A) Xəstələrin subyektiv və obyektiv şikayətləri
B) Tuberkulindiaqnostika
C) Mikroskopiya metodu, flotasiya, əkmə
D) Rentgenoqrafiya və rentgenoskopiya
E) Qanın kliniki və biokimyəvi analizləri

Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

56) ÜST-nin tələbinə görə göstərilən kliniki formalardan hansı ağciyərdən kənar vərəmə aiddir?
A) Ocaqlı vərəm,ekssudativ plevritilə fəsadlaşma
B) Fibrozkavernoz vərəm,bel fəqərələrinin vərəm osteomieliti
C) Kavernoz vərəm,plevranın empiemasıilə fəsadlaşma
D) Vərəmperikarditi,vərəmplevriti,vərəmlimfadeniti
E) İnfiltrativ vərəm və vərəm artriti

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина»1988

57) Kontaktlar arasında xəstələnmənin intensiv göstəricisi hansıdır?

A) Hesabat ilində qeydiyyatda olan sağlam kontaktların sayının 100 minə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti
B) Xəstələnən kontaktların 100-ə hasilinin ilin axırına əhalinin orta illik sayına nisbəti
C) Xəstələnən kontaktların 100-ə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Hesabat ilindən əvəlki illərdə qeydiyyatda olan kontaktların 100 minə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti
E) Xəstələnmiş kontaktların 100 minə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

58) Fibroz kavernoz vərəm zamanı cərrahi müdaxilənin səviyyəsi necə müəyyən olunur?

A) İlkin fəal xəstələr arasında cərrahi əməliyyatdan sonra ölənlərin 100-ə hasilinin ümumi fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayına nisbəti
B) İlkin fəal xəstələr arasında cərrahi müdaxilə olunanların sayının 100-ə hasilinin ümumi fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayına nisbəti
C) Sadalananların heç biri
D) Cərrahi müdaxilə olunan fibroz kavernoz xəstələrin sayının 100-ə hasilinin ümumi fibroz kavernoz xəstələrin sayına nisbəti
E) İlkin qeydiyyatda olanlar arasında fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin cərrahi müdaxilə olunanlara nisbəti

Ədəbiyyat: H.M.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

59) Tənəffüs orqanlarının aktiv vərəmi olan uşaqların dispanser qeydiyyat qrupu hansıdır?

A) I
B) III A
C) I-II
D) VA
E) IV

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.

60) Bakteriya ifrazedici ilə kontakt zamanı vərəmlə daha tez yoluxanlar kimlərdir?

A) Yaşlı adamlar (60 yaş və yuxarı)
B) 2 yaşına qədər uşaqlar
C) 39 yaşına qədər cavan adamlar

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 11-12 yaşadək uşaqlar və 15-17 yaşadək yeniyetmələr
E) 40-59 yaşında orta yaşlı şəxslər

Ədəbiyyat: Э.А.Степанова с соавт. Материнство и туберкулез в кн: Е.Н.Янченко. Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi" Bakı 2006

61) Vərəmdən kliniki sağalma hansı formula üzrə təyin edilir?

A) VMB ifrazı kəsilmiş xəstələrin sayı ilə
B) Qeydiyyatdan çıxarılan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentdə olan xəstələrin sayına nisbəti ilə
C) Fəal qruplardan köçürülən xəstələrin sayının 100-ə hasilinin fəal vərəmli xəstələrin sayına nisbəti ilə;
D) III qrupa keçirilən xəstələrin sayının 100-ə hasilinin aktiv vərəm qruplarında qeydiyyatda olan xəstələrin orta illik sayına nisbəti ilə
E) III və VI qrupda qeydiyyatda olan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin aktiv vərəm qruplarında qeydiyyatda olan xəstələrin orta illik sayına nisbəti ilə

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.

62) Vərəm ocağında yaşayan 3 yaşından yuxarı uşaqlara ftiziatrın müayinəsi və kimyəvi profilaktika hansı tezliklə aparılır?

A) 3 aydan bir
B) 2 ildə 1 dəfə
C) 3 ildən bir
D) İldə 1 dəfə
E) 6 aydan bir

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

63) Vərəm əleyhinə dispanserin əsas iş prinsipləri hansılardır?

A) Vərəm ocağında aparılan tədbirlər
B) Dispanser qrupları üzrə kontingentə nəzarət xəstələrin müalicəsi, kontaktlar arasında profilaktik tədbirlərin aparılması
C) Vərəmli xəstələrin ambulator müayinəsi və kimyəvi profilaktikanın aparılması
D) Vərəmin diaqnostikası
E) Bütün sadalananlar

Sirk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

64) Vərənlə xəstələnməyə görə tibbi risk faktorlarına hansılar aid deyil?

A) Şəkərli diabet
B) Narkomaniya
C) Alkoqolizm
D) HİV
E) Hipertoniya

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

65) İnfeksion allergiyanın hansı formaları mövcuddur?

A) KJB vaksinindən sonrakı allergiya
B) Tuberkulin Mantu 2TE –nin viraj, hiperergiya, sağalma ilə dispenser müşahidəsinə çıxarılanlar, ötən ilə nisbətən nəticəsi artanlar
C) Tuberkulinin şübhəli cavabı olanlar
D) İnfeksion allergiyanın formaları olmur
E) Tuberkulinin mənfi cavabı olanlar

Ədəbiyyat: Metodik təlimat "Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi" Bakı 2006

66) Aşağıda göstərilən qalıq əlamətlərindən hansılar vərəmə aiddir?

A) Sayılanların hamısı
B) Qastrit
C) Kelloid çapıq
D) Qeyri-spesifik limfodenit
E) Kolit

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr

67) IC qrupunda xəstələrin neçə faizi müşahidə oluna bilər?

A) 25%
B) 5%
C) 15%

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 10%
E) 20%

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr

68) Ağciyərlərdə rentgenoloji olaraq böyük qalıq əlamətləri müşahidə olunan xəstələrin dispanser qeydiyyat müddəti?

A) Ömürlük
B) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmır
C) 5 il
D) 1 il
E) 3il

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr

69) Vərəm əleyhinə dispanserin işini təşkil edən əsas tədbirlər hansılardır?

A) Sənədləşmə və hesabatın aparılması
B) Vərəmin diaqnostikası
C) Bütün sadalananlar
D) Xəstələrin müalicəsi və kimyəvi profilaktikanın aparılması
E) Qeydiyyat qrupları üzrə kontingentlərin müşahidəsi

Ədəbiyyat: H.M.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

70) Normal epidemioloji şəraitdə vərəm menıngitinin ilkin aşkar edilmiş xəstələr arasında xüsusi çəkisi ən çox neçə faiz təşkil edə bilər?

A) 2
B) 5
C) Hər biri ola bilər
D) Olmamalıdır
E) 3

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

smk.az/ödənişsiz istifadə üçün

71) İlkin aşkar edilmiş ağciyər vərəm xəstələr arasında gecikmiş formanın (fibroz kavernoz, sirrotik) xüsusi çəkisi necə hesablanır?

A) İlkin aşkar edilmiş fibroz kavernoz və sirrotik vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin ilk dəfə qeydiyyata alınmış tənəffüs üzvlərinin fəal vərəmi olan xəstələrin sayına nisbəti.
B) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin ağciyərdən kənar vərəmi olan xəstələrin sayına nisbəti.
C) Qeydiyyata ilkin götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayının 100-ə hasilinin qeydiyyatda olan tənəffüs üzvlərinin fəal vərəmi olan xəstələrinin sayına nisbəti.
D) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin dispanser qeydiyyatında olan tənəffüs üzvlərinin fəal və qeyri fəal vərəmli xəstələrin sayına nisbəti.
E) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin dispanser müşahidəsində olan bütün fəal vərəm xəstələrinin sayına nisbəti

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

72) Dispanser müşahidəsinin keyfiyyət göstəricilərinə hansılar aiddir?

A) Bütün sadalananlar
B) Vərəm xəstələrinin qeydiyyata alınması
C) Xəstələrin düzgün qruplaşdırılması
D) Dispanser müşahidəsinin və vərəm əleyhinə profilaktik əksepidemik tədbirlərin metodik təlimata uyğun aparılması
E) Vərəm xəstələrinin müalicə işinin təşkili

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

73) Bütün lokal formalar üzrə hər xəstənin dispanser müşahidəsinin opimal müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 5-6 il
B) 24 ay
C) Hər biri ola bilər
D) 4-4.5 il
E) 18 ay

sinir.az üçünsüz istifadə üçün

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

74) Dot strategiyasına görə ilkin qeydiyyata alınan xəstələr arasında residivlərin icazə verilən optimal səviyyəsi nə qədərdir?

A) 30%
B) 50%
C) 60%
D) 15%
E) 40 %

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

75) Ali təhsil müəssisələrində işləyən və vərəmə görə radikal cərrahi əməliyyat keçirmiş və bəlğəmində VMB aşkar olunmayanlar işə nə vaxt buraxıla bilər?

A) Cərrahi əməliyyatdan 18 ay keçdikdən sonra kliniki rentgenoloji, bakteriologı müsbət dinamikaya əsaslanaraq
B) Cərrahi əməliyyatdan bir il sonra 3 dəfə kultural üsulla dayanıqlı abasilləşmə cavabından sonra
C) Ümumiyyətlə işə buraxıla bilməz
D) Kliniki sağalma diaqnozu ilə qeydiyyatdan çıxarılandan sonra
E) III qrup dispanser müşahidəsinə keçməyə imkan verən iki illik sistematik müşahidədən sonra

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmrinin 1,2-ci bəndi. Bakı 2001; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

76) Rentgenoloji qeyri aktiv xarakterli vərəm prosesi olan, doğum evində işləyən şəxs nə vaxt işə buraxıla bilər?

A) 36 ay müalicədən sonra
B) III qrupa keçirildikdən sonra
C) Heç vaxt
D) Kliniki sağalma ilə qeydiyyatdan çıxdıqdan sonra
E) III qrupdan çıxarıldıkdan sonra

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

tarixli 120 saylı əmrinin 1,2-ci bəndi. Bakı 2001; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

77) Ocaqlarda sanitariya sağlamlaşdırıcı tədbirlərə aşağıda qeyd edilənlərdən hansı aid deyil?

A) Sahə terapevti tərəfindən ocağın qeydiyyata alınması
B) Cari dezinfeksiya
C) Tamamlayıcı dezinfeksiya
D) Kontaktların müayinəsi
E) Açıq formalı vərəmli xəstələrin hospitalizasiyası

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri

78) Kliniki sağalma nədir?

A) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, infiltrat tam sorulur, rentgoloji müayinədə qalıq əlamətləri müşahidə olunur
B) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, rentgenoloji müayinədə infiltratın sorulması müşahidə olunmur
C) Sadalananların heç biri
D) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, lakin dağılma boşluğu saxlanılır
E) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, lakin rentgenoloji müayinədə infiltrativ dəyişikliyin tam sorulmaması aşkar olunur

Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза (рекомендации для национальных программ ВОЗ) 1998. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

79) DOTS strategiyasına görə klinik sağalma nədir?

A) Əsas müalicə kursu dövründə mikobakteriyalar ifrazının kəsilməməsi
B) Sadalananların heç biri
C) Əsas müalicə kursunun sonuna mikobakteriyalar ifrazının yenidən baş verməsi
D) Əsas müalicə kursunun sonuna davamlı şəkildə mikobakteriyalar ifrazının kəsilməsi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза (рекомендации для национальных программ ВОЗ) 1998. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

80) Yaşlılardan II dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələr kimlərdir?

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Vərəmin olmasına şübhəli xəstələr
B) Ağciyərində keçirilmiş vərəm xəstəliyinin qalıqarı mövcud olan şəxslər
C) Xroniki gedişə malik vərəmli xəstələr
D) Vərəmin fəallığına şübhəli olan şəxslər
E) İlkin vərəmli xəstələr

Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

81) Uşaqlarda II B qrupunda hansı vərəm xəstələri müşahidə olunur?

A) Vərəmin formasından asılı olmayaraq müalicə effekti gözlənilən xəstələr
B) Vərəm xəstəliyinin fəallığı şübhəli olan şəxslər
C) Ağciyərində keçirilmiş vərəm xəstəliyinin qalığı mövcud olan şəxslər
D) Vərəmə görə müalicəyə və eyni zamanda simptomatik, qüvvətləndirici terapiyaya ehtiyacı olanlar.
E) Vərəmin formasından asılı olmayaraq müalicə nəticəsində heç bir effekt gözlənilməyən xəstələr

Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

82) Vərəmdən kliniki sağalma nədir?

A) Kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən kliniki, laborator və rentgenoloji əlamətlərin tam itməsi
B) Aparılan kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən rentgenoloji əlamətlərin tam itməsi, kliniki əlamətlərin itməməsi
C) Kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən rentgenoloji, kliniki əlamətlər itir, mikobakteriya ifrazı mikroskopik üsulla tapılmır lakin, intoksikasiya əlamətləri müşahidə olunur
D) Aparılan kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən rentgenoloji əlamətlərin itməsi, kliniki əlamətlərin itməsi
E) Aparılan kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən rentgenoloji kliniki əlamətlər itir, mikobakteriya ifrazı davam edir

Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri.

Şəxsi öyrənmə istifadə üçün

83) ÜST-nin tələbinə görə göstərilən kliniki formalardan hansı ağciyərdən kənar vərəmə aiddir?

A) Fibroz kavernoz vərəm, bel fəqərələrinin vərəm osteomieliti
B) İnfiltrativ vərəm və vərəm artriti
C) Ocaqlı vərəm, ekssudativ plevrit ilə fəsadlaşma
D) Kavernoz vərəm, plevranın empieması ilə fəsadlaşma
E) Vərəm perikarditi, vərəm plevriti, vərəm limfadeniti

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

84) Kliniki diaqnozun formalaşdırılması hansı ardıcıllıqla olmalıdır?

A) Vərəm koksiti, soyuq abseslə fəsadlaşma, ağciyərində keçirilmiş vərəmin qalığı
B) Vərəm artriti, oynaqda kontraktura və ocaqlı vərəm dağılma mərhələsiində ekssudativ plevritlə fəsadlaşma
C) Vərəm koksiti soyuq abseslə fəsadlaşma, kavernoz vərəm, vərəm empieması ilə fəsadlaşma
D) Vərəm koksiti soyuq abseslə fəsadlaşma, infiltrativ vərəm
E) Vərəm spondoliti, soyuq abseslə fəsadlaşma, fibroz kavernoz vərəm, empiema ilə fəsadlaşma

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti, Bakı 2015.

85) Aşağıda göstərilən kliniki formalardan hansı daha təhlükəlidir?

A) İnfiltrativ ağciyər vərəmi VMB (+) multirezistent forma
B) Kavernoz vərəm VMB (-), spontan pnevmotoraksla fəsadlaşma
C) Fibroz kavernoz vərəm VMB (+) monorezistent forma
D) Ocaqlı vərəm VMB (-) ekssudativ plevrit, vərəm spondiliti, soyuq abseslə fəsadlaşma
E) İnfiltrativ ağciyər vərəmi dağılma mərhələsində VMB (+), monorezistent forma

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

86) ÜST-nin təsnifatına əsaslanaraq aşağıdakı kliniki formalardan ağciyərdən kənar vərəmə hansı aiddir?

A) İnfiltrativ ağciyər vərəmi

yalnız ödənişsiz istifadə üçün

B) Fibroz kavernoz vərəm
C) Kavernoz vərəm
D) Miliar vərəm
E) Ocaqlı vərəm

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

87) Ağırlıq dərəcələrinə görə üstünlük təşkil edən kliniki formalar hansılardır?

A) Ocaqlı ağciyər vərəmi
B) Səpələnmiş ağciyər vərəmi ekssudativ plevritlə fəsadlaşma
C) Fibroz kavernoz vərəm, tənəffüs çatışmamazlığı
D) İnfiltrativ vərəm spontan pnevmatoraksla fəsadlaşma
E) İnfiltrativ vərəm dağılma mərhələsində

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

88) DOTS proqramına görə tənəffüs orqanlarının vərəminə aşağıda göstərilənlərin hansı aid deyil?

A) İnfiltrativ ağciyər vərəmi
B) Səpələnmiş ağciyər vərəmi
C) Fibroz kavernoz vərəm
D) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi
E) Kazeoz pnevmoniya

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

89) DOTS proqramına qörə ağciyərdən kənar orqanların vərəminə sayılanlardan hansı aid deyil?

A) Perikardit
B) Ekssudativ plevrit
C) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi
D) Ağciyərin kavernoz vərəmi
E) Miliar vərəm

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

90) Vərəm prosesinin inkişaf mərhələsinə görə hansı ardıcıllıq doğrudur?

A) Dağılma, səpələnmə, infiltrasiya
B) Səpələnmə, infiltrasiya, dağılma
C) Dağılma, infiltrasiya, səpələnmə
D) İnfiltrasiya, səpələnmə, dağılma
E) İnfiltrasiya, dağılma, səpələnmə

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

91) Ağırlıq dərəcəsinə görə hansı kliniki forma üstünlük təşkil edir?

A) Səpələnmiş ağciyər vərəmi, ekssudativ plevritlə fəsadlaşma, perikardit
B) Kavernoz ağciyər vərəmi, spontan pnevmotoraks
C) İnfiltrativ ağciyər vərəmi, tənəffüs çatışmazlığı
D) Fibroz kavernoz ağciyər vərəmi, ağciyər ürək çatışmazlığı, böyrək amiloidozu
E) Ocaqlı ağciyər vərəmi, koksit, ətrafların qısalması

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

92) Səpələnmiş ağciyər vərəminin yayılma yolları hansılardır?

A) Hematogen, limfogen, bronxogen
B) Sputogen yol ilə
C) Alimentar yol ilə
D) Cinsi əlaqə ilə
E) Hava damcı yolu ilə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

93) Ağciyər xərcəngi olan xəstələrdə tuberkulin sınağı əksərən:

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Müsbətdir
B) Normergik olur
C) Paradoksal olur
D) Mənfi olur
E) Hiperergikdir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2014 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

94) Keçirilmiş vərəm xəstəliyindən sonra formalaşan qalıq dəyişikliyin aktivləşərək yoluxucu formaya keçməsini göstərən ən inandırıcı metod hansıdır:

A) Auskultativ əlamətlər
B) Sürətləndirilmiş molekulyar-genetik metodla müsbət nəticə
C) Qanın ümumi müayinəsi
D) Qeyri-spesifik müalicə fonunda rentgenoloji dinamika
E) Qalıq əlamətlərin dəyişməz qalması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

95) Normada ağciyərin qalıq həcmi:

A) 1000-2000 ml
B) 500-700 ml
C) 7000-8000 ml
D) 3000-3500 ml
E) 2000-2500 ml

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

tibkitab.az Ödənişsiz istifadə üçün

96) Vərəm xəstəliyinə şübhə olduqda zamanı alınmış bioptat hansı müayinələrə göndərilməlidir:

A) Sitoloji, morfoloji və bakterioloji müayinə
B) İmmunoloji
C) Sitoloji və biokimyəvi müayinə
D) Biokimyəvi və morfoloji müayinə
E) Bakterioloji biokimyəvi müayinə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

97) Aşağıda göstərilən rentgenoloji dəyişikliklərdən hansı kiçik qalıq əlamətinə aiddir:

A) Sayca 5-dən çox, ölçüsü 1 sm-don az olan ocaqlar
B) İri həcmli kelloidlor
C) Ölçüsü 1 sm-dən böyük olan plevranın qa1ınlaşması
D) Ağciyərin rezeksiyadan sonrakı qalıqları
E) Sayca 5-dən az, ölçüsü 1 sm-dən az olan kalsinatlaşmış ocaqlar

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2014 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

98) Diaqnostik materialda vərəm mikobakteriyasını aşkarlamaq üçün bu üsuldan istifadə olunur:

A) Veltman üsulu
B) Qram üsulu
C) Sil-Nilsen üsulu
D) Van-Qizon üsulu
E) Boyl-Mariot üsulu

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov

sınaq üçün istifadə üçün

“Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi” dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56

99) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmi zamanı xəstəliyin “kiçik “forması nədir

A) Limfa vəzilərinin iri həcimli olması
B) Limfa vəzilərinin zəif böyüməsi
C) Limfa vəzilərinin böyüməsi hiss olunur
D) Limfa vəzilərində kiçik destruksiya olması
E) Limfa vəziləri ətraf toxumalarda infiltrasiya yaratmır

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi” dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56

100) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmi ən çox hansı yaş qrupunda baş verir?

A) 7-14 yaş arası
B) 70 yaşdan yuxarı
C) 0-6 yaş arası
D) 18-24 yaş arası
E) 50 yaşdan yuxarı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi” dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56

101) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin Sukkenikov V.A-ya görə qruplaşması hansıdır?

A) Bronxopulmonar
B) Traxeobronxial, paratraxeal, bronxopulmonal, bifurkasion vəzilər
C) Paratraxeal

orsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Pulmonar
E) Traxeobronxial

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

102) Yaşlılarda döş daxili limfa vəzilərinin vərəmi zamanı göy öskürəyi xatırladan tutma şəkilli öskürəyin baş verməsinin səbəbi nədir?

A) Yaşlılarda bronx bifurkasiyasının solda uzun olması
B) Yaşlılarda döş daxili limfa vəzilərinin kiçik olması
C) Yaşlılarda bronx mənfəzinin geniş olması
D) Yaşlılarda bronx divarının elastikliyinin az olması
E) Yaşlılarda bronx bifurkasiyasının sağda qısa olması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

103) "Pişik pəncəsi" rentgenoloji simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir

A) Sarkaidoz
B) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmi
C) Retikulosarkaidoz
D) Limfoqranulyomatoz
E) Aktinomikoz

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

104) Ağciyərlərin iltihabi xəstəliklərinin diaqnostikasında istifadə olunan aparıcı rentgenokontrast üsulu:

A) Angioqrafıya
B) Aortaqrafiya

sosk.az ödənişli istifadə üçün

C) Bronxoqrafıya
D) Bronx arteriyasının angioqrafiyası
E) Plevroqrafıya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

105) Diafraqmaüstü sərbəst eksudatı təyin etmək üçün döş qəfəsinin rentgenoqramması bu vəziyyətdə aparılmalıdır:

A) Nəfəs alma vaxtı
B) Yan proyeksiyada
C) Ön icmal şəkil, yüksək rejimli şüa ilə
D) İcmal rentgenoqramma, normal rejimli şüa ilə
E) Nəfəs vermə vaxtı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

106) Böyrək vərəminin yoluxucu formasının təyini üçün bu müayinə metodu önəmlidir:

A) Sidiyin Sil-Nilsen üsulu ilə mikroskopiyası
B) Angioqrafıya
C) Qanın əkilməsi
D) Rentgenoqrafıya
E) Qalxan uroqrofıya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

107) Rentgenoloji olaraq ağciyər vərəmi diaqnozu qoyarkən fikir vermək lazımdır:

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Mədə bağırsaq sisteminin rentgenskopiyasında dəyişiklik
B) Kolonoskopiyanın nəticəsinə
C) Limfoqrafiyanın nəticəsinə
D) Kölgənin formasına, prosesin lokalizasiyasına
E) Sümükdə spesifik prosesin olub-olmaması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

108) DOTS strategiyasına görə kliniki sağalma bu metodla təyin olunur:

A) Mikrobioloji
B) Kultural müayinə
C) Sidiyin ümumi analizi
D) Qanın biokimyəvi analizi
E) Şüa diaqnostikası

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

109) Normal nəfəs vermə zamanı xaricə çıxan havanın miqdarı:

A) 2500-3000 ml
B) 1500-2000 ml
C) 900-1000 ml
D) 500-1000 ml
E) 300-900 ml

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

110) Ağciyərlərdəki kölgəyəbənzər dəyişiklikləri təsvir etmək üçün fikir verilməlidir:

Sinaq üçün pulsuz istifadə

A) Plevranın vəziyyəti
B) Divararalığı üzvlərin yerini dəyişməsi
C) Diafraqmanın vəziyyətinə
D) Kölgəliklərin konturu, intensivliyi, strukturu, sayı və ölçüsü
E) Plevra – diafraqmal sinusun vəziyyətini

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; .Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 . Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

111) Periferik limfa düyünlərində kazeoz-nekrotik kütlə hansı xəstəliklərdə fistula verir?

A) Retikulosarkaidoz
B) Aktinomikoz
C) Sarkaidoz
D) Limfaqranulomatoz
E) Vərəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

112) İnfiltrativ vərəmdə "Erlix" tetradasının elementləri nədir?

A) İrinli-qoxulu bəlğəm, göbələk duzları,kalsium duzları,ə həng
B) Bəlğəmdə qan, Sarko leyden kristalları, yaşıl rəngdə bəlğəm,göbələk duzları
C) Yaşıl bəlğəm, insan tipli mikobakteriyalar, bəlğəmdə qan və kalsium duzları
D) Kirəcləşmiş elastik liflər, əhəng, dəyişilmiş mikobakteriyalar, bəlğəmdə xolesterin kristalları
E) Selikli-irinli bəlğəm, heyvan tipli vərəm mikobakteriyaları, göbələk duzları, xolesterin

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

113) Assman-Redeker infiltratının xarakteri

A) Kölgəliyin sərhədləri aydın deyil, ölçüsü 3-5 sm olur
B) Kölgəlik yayılmış, ölçüsü 8-10 sm olur
C) Kölgəlik döş daxili limfa vəzilərinə birləşərək konqlemeratı xatırladır
D) Kölgəlik plevraya birləşir, ölçüsü 1-2 sm olur
E) Dairəvi, aydın sərhədli, ölçüsü 3-5 sm olan kölgəlik

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

114) Lobit hansı forma infiltrativ vərəmə deyilir?

A) İnfiltrat S6-seqmentini əhatə edir
B) İnfiltrat bütöv bir payı əhatə edir
C) İnfiltrat bir seqmenti əhatə edir
D) İnfiltrat S10- seqmentini əhatə edir
E) İnfiltrat iki seqmenti əhatə edir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

115) "Serqan" üçbucağı infiltrativ vərəmin hansı formasında müşahidə olunur

A) Buludvari forma
B) Perissuritdə
C) Dairəvi forma
D) Bronxolobulyar forma
E) Lobit

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

Sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

116) Döş qəfəsi orqanlarının icmal rentgenoqrammasının keyfiyyət göstəricilərinə hansı aiddir.

A) Qara ciyərin tam göünməsi
B) Rentgenoqramma çəkilərkən tənəffüsün fazası
C) Körpücük sümüyünün simmetrik vəziyyəti
D) Mədə dibinin tam görünməsi
E) Kölgənin forması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

117) IV kursun bir qrup tələbələrinə 2TV tuberkulinlə Mantu sınağı edilib, onlann ikisində ölçüsü 22 mm olan papula qeydə alınmışdır. Reaksiyanı qiymətləndirin.

A) Hiperergik reaksiya
B) Hipoergik reaksiya
C) Qeyri-spesifik reaksiya
D) Normoergik reaksiya
E) Anergik reaksiya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

118) Döş qəfəsinin flüoroqrafiyası zamanı bu xəstəliklər aşkarlanır:

A) Damarlarda trombun olub-olmaması
B) Bronxun vərəmi
C) Tənəffüs sistemi xəstəlikləri
D) Sarkoileit
E) Bel fəqərələrində fəqərəarası destruksiyası

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

119) Döş qəfəsinin Perkussiyası zamanı kütləşmə qeyd olunur:

A) Bronxoektaziya xəstəliyində
B) Ekssudativ plevritdə
C) Spontan pnevmatoraksda
D) Emfizemada
E) Bronxitdə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

120) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin kiçik formalari bu müayinə ilə aşkar edilir:

A) KT
B) Ağciyərin icmal rentgenoqramması
C) Flüoroqrafik müayinə
D) Angioqrafiya
E) Bronxoqrafiya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

121) Böyrək vərəmi diaqnozunun təsdiq olunması üçün istifadə olunan minimum müayinə

A) Sidiyin GeneXpert müayinəsi
B) Enən uroqrafiya
C) Qalxan uroqrafiya
D) Sidikdə zülal fraksiyasının təyini
E) Sidiyin kultural müayinəsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov

sınaq üçün istifadə üçün

“Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

122) Qlükokortikosteroid terapiyası fonunda vərəmin fəallaşmasını təyin edir:

A) Ağciyərdə rentgenoloji olaraq vərəm, bəlğəmində mikobakteriyanın DNK-sının və mikobakteriyanın tapılması
B) Obyektiv müayinə əsasında, kliniki əlamətlərə görə
C) Qanda leykositozun olması
D) Subyektiv şikayətlər
E) Sidikdə zülalın tapılması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi” dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

123) Orta pay sindromunun payarası plevritdən ayırmaq üçün hansı proyeksiyada rentgenoqramma aparılır?

A) Ön icmal rentgenoqramma
B) Fleyşner-lordo-kifoz rentgenoqramma
C) Yan rentgenoqramma
D) Arxa icmal rentgenoqramma
E) Polipozision rentgenoqramma

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

124) Ağciyərdə seqmentdə və ya payda baş verən hipo ventilyasiya və sonra atelektaz ən çox hansı xəstəlikdə baş verir?

A) Vərəmperisissuritində
B) Aktinomikozda
C) Xroniki bronxitdə
D) Ağciyərin mərkəzi xərçəngində
E) Absesdə

Sınaq üçün

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

125) Ağciyər aktinomikozunda əsas dioqnostik əlamət hansıdır?

A) Bəlğəmdə qan elementlərinin olması
B) Bəlğəmdə çoxlu sarko-leyden spirallarının tapılması
C) Bəlğəmdə çoxlu eozinofillərin olması
D) Bəlğəmdə aktinomikoz druzlarının tapılması
E) Bəlğəmdə mikobakteriyaların tapılması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

126) DOTS strategiyasına görə vərəm xəstəliyinin aşkarlanmasında əsas müayinə üsulu:

A) Limfa vəzilərində VMB-nin aşkarlanması
B) EÇS-nin təyini
C) Eksudatda leykositlərin təyini
D) Qanda limfositlərin təyini
E) Bəlğəmdə VMB-nı aşkar etmək

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

127) Döş qəfəsinin palpasiyası ilə təyin edilir:

A) Tənəffüs ritmi
B) Ağciyərlərin aşağı kənarlarının hərəkətliliyi
C) Ağciyər1ərin aşağı sərhəddi

orsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Səs titrəməsi
E) Tənəffiisün xarakteri

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

128) Fibrobronxoskopiya üçün bu müayinələrə ehtiyac var:

A) Rentgenoloji
B) EKQ
C) Tam kliniki
D) USM
E) Rezus faktor

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

129) Plevra boşluğunda eksudatın olması hansı müayinə vasitəsi ilə dəqiqləşdirilir?

A) Perkussiya
B) Ağciyərlərin icmal rentgenoqramması
C) Palpasiya
D) Sadalanan cavablar doğrudur
E) Auskultasiya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

130) Rentgenoloji müayinələr zamanı bipolyarlıq simptomu vərəmin bu formasında müşahidə olunur:

A) Ilkin vərəm kompleksində
B) Ocaqlı ağciyər vərəmində

sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmində
D) Fibroz kavemoz vərəmdə
E) Ağciyərin tuberkulomasında

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

131) Vərəm intoksikasiyasının uzun sürən gedişi zamanı periferik limfa düyünləri:

A) Böyüyür, yumşaq, elastik konsistensiyalı, ağrısız olur
B) Böyüyür, periadenit əlamətləri var
C) Böyüyür, yumşaq, elastik konsistensiyalı, ağrısız olur, bəzən dərialtı toxuma ilə bitişmiş olur
D) Əksər hallarda dəyişmir
E) Kiçikdir, bərk konsistensiyalı, ağrısızdır

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

132) Vərəmin zəif təsirli bomba adlanan forması hansıdır?

A) Tuberkuloma
B) İnfiltrativ vərəm
C) Ocaqlı vərəm
D) Eksudativ vərəm
E) Eoznofil pnevmaniyası

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

133) Komogen tuberkuloma hansıdır?

A) Buludvari infiltrat

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Səpələnmiş vərəm
C) İnfiltrativ vərəm
D) Tək (solitar) tuberkuloma
E) Ocaqlı vərəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

134) Homogen tuberkuloma hansı klinik formanın involyusiyası nəticəsində yaranır?

A) Kazeozvərəminformasıdır
B) Ocaqlı vərəmdən sonra
C) İnfiltrativ vərəmin formasıdır
D) Səpələnmiş vərəmin formasıdır
E) Sərbəst formadır-özü sərbəst yaranır

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

135) Psevdotuberkuloma tuberkulomanın hansı növüdür?

A) Dolmuş kaverna
B) İnfiltrativ vərəmin sorulma mərhələsi
C) Qon ocağı
D) Sirrotik vərəm
E) Fibroz

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

136) Tuberkuloma niyə yavaş təsirli "bomba" adlanır?

A) Tuberkuloma ağciyər-ürək çatmazlığı yaradır

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Tuberkuloma getdikcə kirəclərə çevrilir
C) Orqanizmin immunobioloji qabliyyətinə mənfi təsir edən amillərdən tuberkuloma fəallaşır
D) Tuberkuloma kalsinatlaşır, konglemerantlaşır
E) Tuberkuloma ürək çatmazlığı yaradır

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

137) Ağciyər kökündə patoloji kölgəlik, adətən vərəmin bu formasında aşkar olunur:

A) Tuberkuloma
B) İnfıltartiv vərəm
C) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi
D) Vərəm intoksikasiyası
E) Səpələnmiş vərəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

138) Qon ocağı vərəmin hansı kliniki formasının sağalması nəticəsində yaranır:

A) Səpələnmiş vərəm
B) İnfiltrativ vərəm
C) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi
D) Ocaqlı vərəm
E) İlkin vərəm kompleksi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

139) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasının əlamətlərindən biri:

Sinaq üçün pulsuz istifadə üçün

A) Öskürək
B) Təngnəfəslik
C) Gecə tərləmələri
D) Bəlğəm
E) Döş qəfəsində ağrı

Ədəbiyyat Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

140) Döş qəfəsi daxili Iimfa düyünlərinin vərəmini aşkar etmək üçün bu metodlar daha önəmlidir:

A) Bütün göstərilənlər
B) Tuberkulinoterapiya
C) Xəstəliyin simptomlarına görə təyini
D) Kontaktlann müayinəsi
E) KT müayinəsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

141) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəminin intiltrativ formasının aşkarlanmasını sübut edir:

A) Ocaqlı səpələnmə
B) Limfogen kaverna
C) Ağciyər kökünün sərhədlərinin "yuyulmuş" olması
D) Bronx divarının vərəm mənşəli zədələnməsi
E) Nodulobronxial fıstula

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinaq üçün pulsuz istifadə üçün

142) Birincili ağciyər vərəmində kavernanın yaranma təhlükəsi bu kliniki formanın gedişi zamanı yaranır:

A) Reinfeksion birincili vərəm
B) Meningit
C) V ərəm bronxadeniti
D) Paratraxeal qrupdan olan döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi
E) İlkin vərəm kompleksi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

143) Uşaqlar arasında birincili vərəmin fəsadlaşmış gedişinin səbəbi:

A) Hər il tuberkulinlə yoxlanmaması
B) Uşağın idmanla mə.ğul olması
C) Vərəm əleyhinə revaksinasiya almaması
D) Qeyri-rasional müalicə, massiv superinfeksiya
E) Uşağın qonşu uşaqlarla təmasda olması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

144) Tuberkulomanın fəal mərhələsini xarakterizə edən əlamət nədir?

A) Konqlemeratın kirəcləşməsi
B) Tuberkulyoma rentgenoloji olaraq kazeoz kütləsinin ətrafında yaranmış fibroz həlqə, onun altında spesifik qranulyasiya və qiqant hüceyrələr yığıntısının olması
C) Tuberkulyomanın ağciyər çatmamazlığı yaratması
D) Kazeoz kütlənin kirəcləşməsi
E) Tuberkulyomanın kazeoz kütləsinin fibroz həlqə ilə əhatəsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

145) Tuberkuloma ətrafında baş verən peribronxial və perivaskulyar "ciğir" nəyi göstərir

A) Tuberkulomanın kirəclərlə əvəz olmasını
B) Ağciyər ürəyinin yaranmasını
C) Tuberkulomanın klinik əlamətsiz gedişini
D) Tuberkulomanın kalsinatla əvəz olmasını
E) Tuberkulomanın proqresivləşməsini

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

146) Tuberkulomanın qeyri fəal formasında Mantu 2TE PP-reaksiyasının nəticəsi necə olur?

A) Hiperergik
B) Müsbət və ya papula-nekrotik
C) Şübhəli
D) Mənfi
E) Çox zəif

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

147) "Tenis raketkası" simptomu infiltrativ vərəmin hansı forması üçün xarakterikdir

A) Lobit
B) Şişəbənzər yalançı infiltrativ forma
C) Bronxolobulyar
D) Oval-dairəvi Assman forması
E) Kazeoz pnevmaniya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

148) "Funksional Bronx amputasiyaysı" simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Şişəbənzər vərəm
B) Ocaqlı vərəm
C) Ağciyərin mərkəzi xərçəngi
D) İnfiltrativ vərəm
E) Tuberkuloma

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

149) Paraspesifik reaksiyalara aiddir:

A) Flüktenalı keratokonyuktivit, Kvinki ödemi, düyünlü eritema
B) K vinke ödemi, düyünIü eritema, Ponse revmatizmi
C) Flüktenalı keratokonyuktivit, Ponse revmatizmi, K vinke ödemi
D) Flüktonulyoz keratokonyuktivit, Ponse revmatizmi, düyünlü eritema, serozit kiçik olan limfoadenitlər
E) Ponse revmatizmi, papulyoz səpgilər, düyünlü eritema

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

150) De-Espin əlaməti auskultativ olaraq, bu kliniki formanın əlamətidir:

A) Uşaq və yeniyetmələrdə erkən vərəm intoksikasiyası
B) İlkin vərəm kompleksi
C) Kavemoz vərəm
D) Səpələnmiş vərəm
E) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-

Sınaq üçün istifadə üçün

157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

151) Vərəm intoksikasiyası zamanı böyümüş periferik limfa düyünləri üçün xarakterikdir:

A) Böyümüş limfa vəzilərinin palpasiya zamanı ağrılı olması
B) Periferik limfa vəzilərində fıstulIarın olması
C) Periferik limfa vəzilərinin ölçülərinin böyük olması
D) Periferik limfa vəzilərinin bərk, elastik konsistensiyalı olması
E) Yumşaq, elastik konisistensiyalı, ağrısız mikropoliadenopatiya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

152) Xəstədə düyünlü eritema müşahidə olunarsa onu hansı xəstəliklərlə differensiasiya etmək lazımdır:

A) Limfoqranulomatoz ilə
B) Talassemiya ilə
C) Revmatizm, sarkoidoz və vərəm ilə
D) Trombositar purpura ilə
E) Ürək çatmamazlığı ilə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

153) Döş qəfəsi daxili Iimfa düyünlərinin vərəmindən fərqli olaraq, limfoqranulomatozda aşkar olunur:

A) Limfositlər
B) Epiteloid hüceyrələr
C) Histiositlər
D) Piroqov-Lanqhans hüceyrələri
E) Berezovski -Şternberq hüceyrələri

Sinif özünüqiymətləndirmə üçün

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

154) Rentgenoloji olaraq "Tut meyvəsi" simptomu vərəmin hansı kliniki forması üçün xarakterikdir:

A) İnfıltrativ ağciyər vərəmi üçün
B) İlkin vərəm kompleksi üçün
C) Sirrotik vərəm üçün
D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi üçün
E) Fibroz-kavemoz ağciyər vərəmi üçün

Ədəbiyyat Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi” dərs vəsaiti 2014 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

155) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmindən fərqli olaraq limfosarkomada qeyd olunur:

A) Tuberkulinə qarşı normergik reaksiya
B) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin tədricən böyüməsi
C) Xəstəliyin xroniki gedişi
D) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin tez böyüməsi
E) Xəstəliyin kəskin başlanması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

156) Kütləvi müayinə zamanı tətbiq olunan minimum müayinələrə:

A) Nəcisin analizi
B) Qanın biokimyəvi analizi
C) Tuberkulindiaqnostika
D) Sidiyin analizi

sinif.az onlayn istifadə üçün

E) Qanın ümumi analizi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

157) "Zıngrov" əlaməti hansı xəstəlik üçün xarakterikdir

A) Mərkəzi xərçəng
B) Tuberkuloma
C) Qamartoxondroma
D) Aspregiloma
E) Adenoma

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

158) Parakavernoz auskultativ əlamətlər hansılardır

A) Kaverna üzərində səs titrəməsinin güclənməsi
B) Kaverna ətrafıda perkutor tonun güclənməsi
C) Kaverna üzərində səs titrəməsinin olmaması
D) Kaverna üzərində iri kalibirli yaş xırıltılar eşidilir
E) Kaverna ətrafında perkutor tonun qısalması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

159) Kaverna üzərində "Oral" xırıltılar nə vaxt eşidilir

A) Kavernaya açılan bronx daraldıqda
B) Kavernaya açılan bronx tutulduqda
C) Kavernaya açılan bronx genəldikdə
D) Kaverna formalaşarkən

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Bronx geniş, kaverna Qiqant olduqda

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

160) "Xəritələnmiş kaverna" nədir

A) Müalicənin sonunda kaverna böyüyür
B) Müalicənin sonunda kaverna kiçilir
C) Müalicənin sonunda kaverna formasın dəyişmir
D) Müalicənin sonunda kaverna tam itir
E) Kavernanın divarı qalınlaşır, sirrozlaşır və kaverna formasını dəyişir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

161) Görülməyən kaverna nədir

A) Rentgenoloji görülməyən, kliniki, bakteroloji bronxoqrafik təyin olunan kaverna
B) Giqant kaverna
C) Diametri 0,5 smolankaverna
D) Plevraya drenaj olunan kaverna
E) Rentgenoloji görünməyən kaverna

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

162) Rentgenoloji bipolyarlıq simptomu bu xəstələrdə müşahidə olunur:

A) Bronxolitiaz
B) Sarkoidozun 1 mərhələsi
C) Qeyri spesifik sətəlcəm
D) İlkin vərəm kompleksi
E) Aktinamikoz

Sınaq üçün nümunə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

163) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəminin "kiçik" formasının aktiv fazada olmasının əsas göstəricisi:

A) Bəlğəmdə sarko Leyden kristalının tapılması
B) Qanda leykositozun olması
C) Qanda hemoqlobinin səviyyəsinin yüksəlməsi
D) Aktivliyin klinik əlamətləri və yardımçı rentgenoloji simptomlar
E) Sidikdə zülal fraksiyası

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

164) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasının əlamətini qeyd edin:

A) Bəlğəm
B) Öskürək
C) İştahanın pozulması
D) Təngnəfəslik
E) Döş qəfəsində ağrı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

165) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin tumoroz forması xarakterizə olunur:

A) Sirroz
B) Ağciyərin atelektazı
C) Fibroz dəyişiklik
D) Diffuz emfizema

Sınaq üçün ödənişsiz versiyada

E) Hissəvi emfizema ilə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

166) Vərəm intoksikasiyası diaqnozu qeyd olunur:

A) KJB vaksinasiyasından 5 il sonra
B) KJB vaksinasiyasından 7 il sonra
C) Viraj zamanı
D) Virajdan 1-1,5 il sonra
E) Tuberkulinin mənfi cavabı zamanı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

167) Korani siptomu nədir?

A) Auskultativ əlamətdir
B) Perkutor əlamətdir
C) İnspeksiyada müəyyən olunur
D) Palpator əlamətdir
E) Rentgenoloji əlamətdir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

168) Birincili vərəmə aiddir:

A) İlkin vərəm kompleksi, döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi, miliar vərəm, sirrotik vərəm
B) Vərəm intoksikasiyası, Ilkin vərəm kompleksi, döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi, tuberkuloma

Sirsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Vərəm intoksikasiyası, ilkin vərəm kompleksi, döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi
D) Vərəm intoksikasiyası, Ilkin vərəm kompleksi, kavemoz vərəm
E) Vərəm intoksikasiyası, Ilkin vərəm kompleksi, miIiar vərəm, kazeoz sətəlcəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2014 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

169) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasının əsas kliniki simptomlar:

A) Profuz qanaxma
B) Qusma
C) Çəkinin azalması
D) İshal
E) Qanhayxırma

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

170) Döş qəfəsi daxili fimfa vəzlərinin vərəmindən sonrakı qalıqlar:

A) Kalsinat
B) Natamam sorulma
C) Aşof-Pul ocagı
D) Yumşaq ocaq
E) Simon ocağı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

171) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi olan xəstə uşaqların aşkarlanmasının əsas müayinə metodu:

Sınaq üçün istifadə üçün

A) Şüa diaqnostikası
B) Bəlğəmin müayinəsi ilə
C) Zonoqrafiya
D) Kontaktların müayinəsi
E) Rentgenoqrafiya və KT

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157 . Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

172) Kavernoz vərəmdə mikobakteriya ifrazının enmə və qalxma sindromu nədir?

A) Mikobakteriyanın görmə sahəsində az tapılması
B) Mikobakteriya ifrazının tam kəsilməsi
C) Spesifik müalicə fonunda mikobakteriyalar kəsilir, lakin 4-5-6-cı ayında yenidən mikobakteriya ifrazı baş verir
D) Mikobakteriya ifrazının kəsilməməsi
E) Mikobakteriyanın kultural tapılmaması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

173) Kaverna üzərində amforik tənəffüsü nə zaman eşidilir?

A) Giqant (diametri 6 sm-dənböyük) olan və bronxa drenajı olan kaverna
B) Kaverna formalaşma ərəfəsində olduqda
C) Diametri 3-4 sm ölçüdə olan kaverna
D) Diametri 1-2 sm ölçüdə olan kaverna
E) Parakavernoz əlamətlər zamanı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 . Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

174) Lal kaverna nədir?

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

A) Spontanpnevmatorakslafəsadlaşdıqda
B) Kaverna bronxa drenaj etmir
C) Giqant kaverna olduqda
D) Kaverna plevraya açıldıqda
E) Kaverna formalaşma ərəfəsində olduqda

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

175) Hansı lokalizasiyada kavernanın xırıltı səsləri traxea və ağız boşluğu ilə xaricdən eşidilir?

A) Kaverna aşağı payda olduqda
B) Kaverna plevraya açıldıqda
C) Kaverna orta payda olduqda
D) Kavernanın drenaj edici bronxla əlaqəsi olduqda
E) Kaverna ağciyərin yuxarı payında yerləşərək drenaj edici bronxla təmin olunduqda

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

176) Fibroz kavernoz vərəmdə kavernanın divarı neçə qatdır?

A) 3 qat
B) 4 qat
C) 1 qat
D) infiltrativ fokus görünür.
E) 2 qat

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

177) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasuun əlamətinə aiddir:

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Bəlğəm ifrazı
B) Ümumi zəiflik
C) Döş qəfəsində ağrı
D) Təngnəfəslik
E) Öskürək

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 .Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

178) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəminin rentgenoloji əlamətləri:

A) Persissurit
B) Ağciyər kökü kölgəsinin strukturunun zəifləməsi, ağciyər kökünün xarici konturunun yayılmış və politsiklik olması
C) Plevrodiafraqmal sinusda bitişmə
D) Lobit
E) Plevrada maye

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

179) Fəsadlaşmamış ilkin vərəm kompleksinin sorulması nəticəsində formalaşır:

A) Aşoff -PUL ocagı və kalsinatlar
B) Abrikosov ocagı və kalsinatlar
C) Qon, Simon ocagı və kalsinatlar
D) Simon ocagı və kalsinatlar
E) Qon ocağı və kalsinatlar

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 . Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

180) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmini tənəffüs üzvlərinin qeyri-spesifik xəstəlikləri ilə differensiasiya etmək lazım gəlir:

A) C və D cavabları düzgündür
B) Limfoqranulyomatoz
C) Sarkoidoz və divararalığının limfoması ilə
D) Abseslə
E) Ağciyər arteriyasının trombozu

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

181) Döş qəfəsi daxili limfoadenopatiyanın sistem xəstəliyi və ya bədxassəli olması diaqnozunun verifikasiyası üçün vacib sayılan müayinə metodu:

A) Limfa vəzinin biopsiyası
B) Traxeobronxoskopiya
C) Kompyuter tomoqrafıyası
D) Nüvə maqnit rezonans tomoqrafık müayinəsi
E) Döş qəfəsi orqanlarının rentgenotomoqrafık müayinəsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

182) I-Ii vərəm II-Ii vərəmdən fərqlənir:

A) Tuberkulinə həssaslığın olmasına görə
B) Destruksiyanın formalaşması və bronxogen yayılmağa meyillik olduğuna görə
C) Vərəm çöplori ilə ilk dəfə yoluxma nəticəsində yarandığına görə
D) Proqressivləşməyə meylli olduğuna görə
E) Ağciyərin yuxarı şöbələrinin xüsusi olaraq zədələnməsinə görə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinsk.az Öğrenci istifadə üçün

183) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəminin tumoroz forması təyin olunur:

A) Limfogen kavemanın inkişafı ilə
B) Periadenit əlamətləri ilə
C) Ağciyər kökündə nəzərəçarpan böyümüş və sərhədləri dəqiq olan limfa düyünləri ilə
D) Bütün döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin zədələnməsi ilə
E) Vərəmin şiş patologiyası ilə birlikdə rast gəlməsinə görə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

184) Fibroz-kavernoz vərəmdə daxili qat necə adlanır?

A) perifokal iltihab
B) Piogen-kazeoz –nekrotik irinli qat
C) Qeyri spesifik fibroz qat
D) Spesifik fibroz qat
E) Qranulyasiya qatı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

185) Fibroz-kavernoz vərəmdə "Ciğır" simptomunun tərkibi nədir?

A) Bronx qidalandırıcı arteriya
B) Seqmentar bronx
C) Ağciyərin perifokal iltihabi
D) Kavernaya açılan bronxun endo və peribronxial əlamətləri və limfa yolu
E) Bronx qidalandırıcı vena

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

186) Vərəmin sputogen yayılması nədir?

A) Diffuziya yolu ilə toxuma daxili yayılması
B) Hemotogen yolla xəstəliyin yayılması
C) Limfogen yolla xəstəliyin yayılması
D) Vərəm mikobakteriyaların bəlğəmli öskürəklə bronxun bifurkasiyasina çatır və öskürəkdən sonra nəfəs alanda ağciyərin digər hissəsinə yayılır
E) Limfobronxogen yayılması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

187) Spesifik bronxektaziya nədir?

A) Rentgenoloji bronxektaziya
B) Emfizema və qeyri spesifik bronxektaziya
C) Stafilakok pnevmaniyasında destruktiv boşluq
D) Perifokal iltihab
E) Xroniki vərəm zaman inkişaf etmiş birləşdirici toxumanın fonunda baş vermiş bronxoektatik dəyişikliklərdə mikobakteriyanın tapılması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

188) Birincili vərəmin ən çox rast gəlinən fəsadı:

A) Spontan pnevmatoraks
B) Amiloidoz
C) Ağciyər ürək çatışmazlığı
D) Plevrit
E) Ağciyər qanaxması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-

Sınaq üçün ödənişsiz istifadə

157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

189) Spesifik prosesin fəallığının qiymətləndirilməsi zamanı bu kriteriyalardan hansı əsasdır?

A) Qanın biokimyəvi göstəriciləri
B) Xəstəliyin kliniki əlamətlərinə
C) TuberkuIin sınaqlannın dinamikasına
D) Sidikdə zülalın olması
E) Rentgen-tomoqrafık müayinələrin nəticələrinə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

190) Vərəmə yoluxmanın erkən dövründə (viraj) profilaktik müalicə hansı sxem əsasında apanlmalıdır:

A) 6 ay müddətində izoniazidlə
B) 3 ay müddətində izoniazidlə
C) 5 ay müddətində ftivazidlə
D) 2 ay müddətinə ildə iki dəfə izoniazidlə
E) 4 ay müddətində 2 preparatla (İzonazid + rifampisin)

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi” dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56

191) Ağciyər kökünün genişlənməsi əksərən bu xəstələrdə olur:

A) Ağciyərin xoşxassəli törəməsi
B) Eozinofıl pnevınoniyası
C) Ağciyərin periferik xərçəngi
D) Bronxopulmonal qrupdan olan döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi
E) Vərəm intoksikasiyası

Sınaq özünüzü üçün

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

192) Uşaq və yeniyetmələr arasında vərəm intoksikasiyası üçün xarakterikdir:

A) Yüksək hərarət
B) Mantu sınağının ötən ilə nisbətən 6 mm və daha çox artması
C) Tuberkulin sınağının ilk dəfə müsbət olması
D) Tuberkulin sınaqlarının virajı ilə üst-üstə düşən və ya ondan sonrakı illərdə ön plana çıxan funksional dəyişikliklər (bədən hərarətinin subfebril olması, iştahsızlıq və poliadenopatiya) və ümumi intoksikasiya (tez yorulma, qıcıqlanma, halsızlıq, yuxunun pozulması və s.)
E) Qanhayxırma

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

193) Birincili vərəmdə bronxların hansı total zədələnmir?

A) Məhdud kataral endobronxit
B) Diffuz kataral-irinli qeyri spesifik endobronxit
C) Bronxlardakı xoralı və fıstullu proseslər
D) Peribronxit
E) Bronxlardakı infiltrativ dəyişikliklər

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

194) Sirroz nədir?

A) Fibroz dəyişiklik ağciyərin geniş sahəsini əhatə edir, ağciyər toxumasının anatomik qurluşunu və alveolun hava tutumunu pozur
B) Qabırğa arası sahədə dəyişikliyin olması
C) Fibroz toxuma ağciyərdə məhdud yerləşir, alveolun hava tutumunu pozmur

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Plevrada baş verən dəyişiklik
E) Divararalığı üzvlərin yerini dəyişə bilməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

195) Spesifik fibroz nədir?

A) Fibroz dəyişiklik bir payı tutur
B) Fibroz dəyişiklik ağciyərdə geniş yayılır
C) Spesifik fibroz dəyişiklik ağciyərdə məhdud yerləşir və alveolun hava tutumu pozulur
D) Fibroz dəyişiklik iki seqmenti tutur
E) Fibroz dəyişiklik iki payı tutur

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

196) Spesifik pnevmoskleroz nədir?

A) Divararalığı üzvləri yerini dəyişir
B) Kəskin tənəffüs çatmazlığı müşahidə olunur
C) Qabırğa arası sahələr genişlənir
D) Ağciyərin bütün sahələrini tutur
E) Pnevmoskleroz ağciyər vərəminin müxtəlif kliniki formaların geriyə sorulma mərhələsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

197) "Bronx girəcəyinin ölü vəziyyəti" simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Bronxun xərçəngi

ensk.az dənişiş tifadə üçün

B) Bronxun tozlanması
C) Bronxun vərəmi
D) Bronxun aktinomikozu
E) Bronxektaziya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

198) Xəstədə ağciyərdə vərəm ocağı olmadığı halda bəlğəmdə vərəm çöpləri tapılarsa bu hansı üzvün vərəminə aiddir?

A) Bronxun sıxılması
B) Bronx və traxeyanın vərəmi
C) Bronxun aktinomikozu
D) Ağciyər exnokoku
E) Bronxun adenoması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

199) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası zamanı müşahidə olunan rentgenoloji dəyişikliklər hansılar ola bilər?

A) Qon ocağı aşkar olunur
B) Məhdud lokal proseslər izlənilir
C) Yayılmış sirrotik dəyişikliklər aşkar olunur
D) Bütün sadalanan cavablar
E) Məhdud fibroz dəyişikliklər aşkar olunur

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

200) İlkin vərəm kompleksi ilə döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəminin differensiasiyası necə aparılır:

Sınaq üçün istifadə üçün

A) Tuberkulinə olan həssaslığa əsasən
B) Rentgenoloji əlamətlərə əsasən
C) İmmunoloji dəyişikliklərə əsasən
D) Hemoqrammada olan dəyişikliklərə əsasən
E) Kliniki simptomokomplekslərə əsasən

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

201) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası səciyyələnir:

A) Bütün sadalanan cavablar
B) Təngnəfəslik və taxikardiya ilə
C) Tədricən güclənən baş ağrısı ilə
D) Anoreksiya və distrofıya İlə
E) Bədən temperaturunun 38-38,5° S-ə qalxması ilə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

202) Genezinə görə bu kliniki forma birincili vərəm sayılır:

A) Ocaqlı ağciyər vərəmi
B) Fibroz-kavernoz vərəmi
C) Səpələnmiş ağciyər vərəmi
D) İnfiltrativ ağciyər vərəmi
E) İlkin vərəm kompleksi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

203) Yaşlı xəstələrdə döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmi dedikdə nəzərdə tutulur:

Sinaq üçün pulsuz istifadə üçün

A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində lokalizə olunmuş iltihabi proses
B) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin zədələnməsi ilə müşayiət olunan tənəffüs orqanlarının vərəmi
C) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin lokalizə olunmuş birincili və ya ikincili vərəmi
D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində lokalizə olunmuş ikincili vərəm
E) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin residivi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

204) İlkin vərəm kompleksi zamanı bipolyarlıq adətən bu fazada olur:

A) İnfiltrasiya
B) Sorulma
C) Kirəcləşmə
D) Dağılma
E) Səpələnmə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

205) İlkin vərəm kompleksinin evalyutiv prosesin rentgenoloji mərhələləri:

A) Pnevmonik faza, bərkimə fazası, infiltrasiya mərhələsinə keçməsi
B) Pnevmonik faza, dağılma fazası, kavemanın əmələ gəlməsi
C) Pnevmonik faza, sorulma, bərkimə fazaları, Qon ocağının əmələ gəlməsi
D) Dağlma fazası, sirrozun inkişafı
E) Pevmonik faza, dağlma fazası, Qon ocağının əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

206) Birincili vərəm zamanı infeksiyanın daxil olma yolu:

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Pis vərdişlər
B) Endogen
C) Ekzogen
D) Sputogen
E) Kontakt

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

207) Birincili vərəmİn həyat üçün ən təhlükəli ağırlaşması:

A) Plevrit
B) Atelektaz
C) Meningit
D) Nodulobronxial fistula
E) Limfogen və bronxogen səpələnmə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

208) Paraspesifik reaksiyaya aiddir:

A) Artrit
B) Koksit
C) Spondilit
D) Qonit
E) Ponse revmatizmi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

209) Paraspesifik reaksiyalar qeyd olunur:

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Limfoqranulomatozda
B) Birincili vərəmdə
C) Sarkoidozda
D) İkincili vərəmdə
E) Silikozda

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

210) Döş qəfəsi orqanlarının icmal rentgenoqrammasında aşkarlanması mümkün olmayan birincili vərəmin kliniki forması:

A) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası
B) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi
C) Vərəm plevriti
D) İlkin vərəm kompleksi
E) Ocaqlı vərəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

211) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasının əlaməti:

A) Təngənəfəslik
B) Subfebril hərarət
C) Öskürək
D) Döş qəfəsində ağrılar
E) Bəlğəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

212) Silikotuberkulyoz üçün əsas amil nə sayılır?

Sınaq üçün pulsuz istifadə üçün

A) Vərəm xəstəliyi tozlu şəraitdə işləmiş insanda baş verir
B) Vərəm bronxektaziya ilə yanaşı
C) Vərəm exnokokla yanaşı
D) Vərəm qabırğaların osteoparozu ilə yanaşı
E) Vərəm xərçənglə yanaşı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

213) Bakterial növlərin persistə etməsi nə dəməkdir?

A) Bakteriyaların dərmana davamlı formaya keçməsi
B) Bakteriyaların çoxalması
C) Bakteriyaların göbələyə çevrilməsi
D) Bakteriyaların virusa çevrilməsi
E) Bakteriyaların məhv olması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

214) Bakteriya növlərinin reversiyası nədir?

A) Stafilokoka bənzəməsi
B) Meninqokoka dəyişməsi
C) Bakterial formaya keçməsi
D) Göbələyə dəyişməsi
E) Virusa keçməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

215) Bakteriyaların süzülən formaları hansılardır?

A) Stafilokoka dəyişməsi

Sinif otağında istifadə üçün

B) Meninqokoka çevrilməsi
C) göbələyə çevrilməsi
D) Virusa persislə olunmuş formaları (L-forma)
E) Dəyişməyən forması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

216) L-forma mikobakteriyaların xarici qatında hansı dəyişikliklər var?

A) L-forma mikobakteriya xarici qatı yalnız qan damarlarından ibarətdir
B) L-forma mikobakteriya xarici qatında defektlər var
C) L-forma mikobakteriya xarici qatı qalınlaşmış olur
D) L-forma mikobakteriya xarici qatında defekt yoxdur
E) L-forma mikobakteriyaların xarici qatı olmur

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

217) L-forma mikobakteriyalar ətraf üçün epidemioloji təhlükə nə vaxt yaradır?

A) Heç vaxt epidemioloji təhlükə törətmir
B) Uzun müddətdən sonra reversiya edərək yoluxucu mikobakteriyalara çevrildikdə
C) Daim epidemioloji təhlükə törədir
D) Heyvanlar üçün təhlükəlidir
E) İnsan üçün təhlükəli deyil

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

218) Ilkin vərəm infeksiyasının erkən dövrü üçün 'paraspesfflk reaksiyalar xarakterikdir:

A) Qanhayxırma

sinaq üçün istifadə üçün

B) Mədə qanaxması
C) Ağciyər atelektazı (rentgenoloji)
D) Ağciyərdə destruktiv vərəm
E) Düyünlü eritema, yumşaq, elastik konsistensiyalı mikropoliadenopatiya sindromu

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

219) Ilkin vərəm kompleksinin birinci mərhələsidir:

A) Kirəc1əşmə
B) Pnevmonik
C) İnfiltrasiya
D) Sorulma
E) Tumoroz

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

220) İlkin vərəm kompleksinin ikinci mərəhələsidir:

A) Pnevmonik
B) Sorulma
C) İnfıltrasiya
D) Tumoroz
E) Kirəcləşmə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

221) İlkin vərəm kompleksinin proqressivləşməsinə aiddir:

A) Qanaxma
B) Limfohematogen disseminasiyası

ensk.az oda istifadə üçün

C) Spontan pnevmatoraks
D) Amiloidoz
E) Bronxial fıstula

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

222) İlkin vərəm kompleksinin evalyutiv proseslərinin rentgenoloji diaqnostikası:

A) 6 mərhələdə gedir
B) 5 mərhələdə gedir
C) 2 mərhələdə gedir
D) 3 mərhələdə gedir
E) 4 mərhələdə gedir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

223) Ilkin vərəm kompleksi ilə döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin rentgenoloji fərqi:

A) Vərəm prosesinin traxeobronxopulmonal limfa vəzlərində olması
B) Hiperplaziya olmuş limfa vəzləri ilə ağciyərdəki affekt arasında əlaqənin olmaması
C) Hiperplaziya olmuş limfa vəzləri ilə ağciyərdəki affekt arasında limfangitin olması ilkin vərəm kompleksi üçün xarakterikdir
D) Vərəm prosesinin bronxopulmonal limfa vəzlərində olması
E) Atelektazın ağciyərdə baş verməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

224) Limfoqranulamatozun döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmindən fərqi:

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ağciyər kökünün ətrafında intensiv kölgəliyin olması
B) Ağciyər toxumasında infiltrasiyanın olması
C) Prosesdə destruksiyanın olması
D) Limfa vəzilərinin böyüməsi ikitərəfli olaraq "boru" simptomuna malik olması
E) Prosesin birtərəfli olması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

225) Miliar vərəm zamanı səpələnmiş ocaqların tipik morfoloji əlamətlərinə nə aid deyil?

A) Ocaq ətrafı nəzərəçarpan infiltrasiya
B) Ağciyərlərin bütün sahələrini əhatə edən intertsial yerləşmiş ocaqlar
C) Strukturun eynicinsli olmaması
D) Yuxarı pay lokalizasiyalı müxtəlif ölçülü ocaqlar
E) Səpələnmiş ocaqların daxilində nekrotik dəyişiklik

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

226) Səpələnmiş vərəmin inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:

A) Çəki defisiti
B) Ağciyərlərdə xroniki qeyri-spesifik iltihab
C) Hipertoniya vərəmi
D) Xroniki anemiya
E) KgV vaksinasiyasının aparılmaması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

227) Səpələnmiş vərəm zamanı xüsusilə bu orqanın zədələnməsi həyat üçün təhlükə yaradır:

A) Qaraciyər
B) Beyinin yumşaq qişası
C) Onurğa
D) Böyrək
E) Dalaq

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

228) Bir ağciyərin çoxsaylı ocaqlarla zədələnməsi vərəm mikobakteriyasının bu yolla yayılması zamanı yaranır:

A) Kontakt
B) Bronxogen
C) Limfogen
D) Hematogen
E) Sputogen

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

229) Ağciyərlərdə ikitərəfli simmetrik ocaqlı disseminasiya vərəm mikobakteriyasının bu yolla yayılması zamanı yaranır:

A) Kontakt
B) Hematogen
C) Limfogen
D) Bronxogen
E) Sputogen

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

Sınaq üçün icazəsiz istifadə qadağandır

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

230) Miliar vərəm bu formalan var:

A) Abortiv, fəsadlaşmamış, fəsadlaşmış
B) Birincili, ikincili, üçüncülü
C) Erkən, gecikmiş, xroniki gedişli
D) Tifoid, ağciyər, meningial, septiki
E) Təzə, xroniki, yarımkəskin

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

231) Miliar vərəm zamanı:

A) Ocaqların ölçüləri 1-2 mm-dir
B) Ocaqların ölçüləri müxtəlifdir
C) Ocaqlar polimorfdur
D) Ocaqların ölçüləri 6-10 mm-dir
E) Ocaqların ölçüləri 3-6 mm-dir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

232) Səpələnmiş vərəmdə ocaqların lokalizasiyası:

A) Ocaqların subplevral lokalizasiyası ilə
B) Ağciyərin aşağı paylarında yerləşir
C) Ağciyərdən kənar orqanların vərəminin formalaşması ilə nəticələnən ocaqlar
D) Ocaqlar ağciyərin ən azı üç seqmentini zədələyir
E) Müalicə fonunda bioloji sağalma ilə qurtaran ocaqlar

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

233) Miliar vərəmli xəstələrdə Perkussiya və auskultasiya zamanı əksər hallarda aşkar olunur:

A) Qutu səsi, bronxial tənəffiis
B) Kürəkarası nahiyyədə kütləşmiş ağciyər səsi
C) Timpanik ağciyər səsi, sərt tənəffüs, tək-tək kiçik qabarcıqlı yaş xırıltılar
D) Hər iki ağciyərin aşağı payında qısalmış ağciyər səsi, sərt tənəffüs, krepitasiya
E) Cuzi dəyişiklik, nadir hallarda xırıltılar, perkutor səsin qısalması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

234) Miliar vərəmin forması:

A) Bakteremiya
B) Kəskin
C) Xroniki
D) Vaskulit
E) Septiki

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

235) Miliar vərəmin formasına aiddir:

A) Bakteremiya
B) Kəskin
C) Vaskulit
D) Tifoid
E) Xroniki

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

Sinsk.az Qanunsuz istifadə olunur

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

236) Rentgenoqrammada hər iki ağciyərin orta və yuxan paylarında ölçüsü 5-10 mm çox saylı kiçik və orta intensivlik, konqlomerat əmələ gətirməyə meylli, qeyri hemcins strukturlu ocaqlann tapılması vərəmin bu formasını təsdiq edir:

A) Səpələnmiş vərəmin yarımkəskin forması
B) Miliar vərəm
C) Kazeoz sətəlcəm
D) Ocaqlı vərəm
E) Xroniki səpələnmiş vərəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

237) Rentgenoqrammada ağciyər köklərinin "yuyulmuş" kölgəliyi və ağciyər şəklinin zəifləməsi ilə birlikdə rast gəlinən, hər iki ağciyərin bütün sahələrinə yayılmış, ölçüsü 2 mm-dək, kiçik intensivlikli, çox saylı, eynitipli ocaqlann tapılması bu diaqnozu təsdiq edir:

A) Kazeoz sətəlcəm
B) Miliar vərəm
C) Yarımkəskin səpələnmiş vərəm
D) Ocaqlı vərəm
E) Xroniki səpələnmiş vərəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

238) Miliar vərəmin kliniki formaları:

A) Septiki, yanm kəskin, xroniki formalar
B) Meningial forma, basilyar meningit, ağciyər forması, tifoid forma
C) Basilyar meningit, meninqoensefalit, ağciyər forması, tifoid forma
D) Septiki, tifoid, ağciyər, meningial formalar
E) Meninqoensefalit, ağciyər forma, tifoid forma

sınaq özünüyoxlama üçün

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

239) Xroniki səpələnmiş vərəm zamanı ocaqlarm polimorfizmi şərtlənir:

A) Vərəm mikobakteriyasının eyni zamanda külli miqdarda qana daxil olması
B) Vərəm mikobakteriyasının hematogen və bronxogen yolla yayılmasının birlikdə rast gəlinməsi
C) Disseminasiya dalğalarının təkrarlanması
D) Vərəm mikobakteriyasının eyni zamanda hematogen, limfogen, bronxogen yolla yayılması
E) Vərəm mikobakteriyasının fasiləsiz olaraq qana daxil olması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

240) Ağciyərlərdə disseminasiyalı patologiya olan xəstələrdə adətən döş qəfəsi daxili adenopatiyaya da rast gəlinir:

A) Mikrolitiaz zamanı
B) Silikoz zamanı
C) Səpələnmiş vərəm zamanı
D) Sarkoidoz zamanı
E) İntoksikasiya zamanı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

241) Miliar vərəmin septiki forması ilə irinli sepsisi fərqləndirmək üçün aparılan əsas müayinə:

A) Sidiyin ümumi analizi
B) Bəlğəmin molekulyar genetik müayinəsi
C) Ağciyərlərin rentgenoskopiyası

sual.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Qanın ümumi analizi
E) Hemokultura

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

242) Vərəmin hansı kliniki formasında ştampvari kavernalar tipik əlamətidir:

A) Səpələmiş vərəmin kəskin formasının
B) Miliar vərəmin
C) Səpələnmiş vərəmin xroniki formasının
D) Yarımkəskin hematogen səpələnmiş vərəmin
E) Səpələnmiş vərəmİn tifoid formasının

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

243) Səpələnmiş ağciyər vərəminin yayılma yolları:

A) Sputagen yol ilə
B) Hematogen, limfogen, bronxogen
C) Dəri-selikli qişa təması ilə
D) Hava damcı yolu ilə
E) Alimentar yol ilə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

244) "Nəlbəkidə ikra" simptomu hansı kliniki formaya aidir?

A) Miliar vərəm
B) Xroniki gedişli səpələnmiş vərəm
C) Yarımkəskin səpələnmiş ağciyər vərəmi
D) Bronxogen səpələnmiş ağciyər vərəmi

sinif.az dərslik kitabda üçün

E) Kəskin gedişli ağciyər vərəmi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

245) Miliar vərəm zamanı ocaqlann ölçüsü:

A) 0.2 sm-ə qədər diametrə
B) 0.6 sm-dən artıq diametrə
C) 0.4 sm-ə qədər diametrə
D) 1-2 mm-ə qədər diametrə
E) 1 sm-ə qədər diametrə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016

246) Kliniki gedişə görə səpələnmiş vərəmin neçə forması var?

A) 5 forması var
B) 3 forması var (kəskin, yarımkəskin, xroniki)
C) 1 forması var
D) 4 forması var
E) 2 forması var

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56.n Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016

247) Miliar vərəm yayılmasına görə hansı formadır?

A) Limfogen səpələnmiş vərəmdir
B) Xroniki səpələnmiş formadır
C) Cavabların heç biri düz deyil
D) Yanmkəskin səpələnmiş vərəmdir
E) Kəskin hematogen səpələnmiş formadır

Sirsk.az ödənişsiz tətbiqdə üçün

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

248) Miliar vərəm ən çox hansı insanlarda baş verir?

A) Qan xəstəlikləri olanların
B) Mədə-bağırsaq patologiyaları olanlar
C) Silikoz keçirən xəstələrdə
D) BSJ vaksini almayan uşaqlarda
E) Ürək-damar çatmamazlığı olanlar

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

249) Rentgenoqrammada ağciyərlərin yuxarı və orta payIannda torşəkilli fibrozla yanaşı rast gəlinən çoxsaylı polimorf ocaqIann tapılması, ağciyər köklərinin yuxanya doğru dislokasiyası, damcıyabənzər ürək, bazal emfizema vərəmin bu formasını təsdiq edir:

A) Yanınkəskin səpələnmiş vərəm
B) Miliar vərəm
C) Ocaqlı vərəm
D) Xroniki səpələnmiş vərəm
E) Sirrotik vərəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

250) Miliar vərəminə aid simptomları?

A) Tarelkada kürü
B) Qar lopası
C) Zınqrov

Sınaq üçün ödənişsiz istifadə

D) Pişik cırmağı
E) Tüstü borusu

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

251) Yarımkəskin hematogen səpələnmiş vərəmdə əmələ gələn kavernalar:

A) Alterativ
B) Parafokal
C) Ateromatoz
D) Sekvesterləşmiş
E) Ştampvari

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

252) Miliar vərəmdə ocaqlar yerləşir:

A) Alveollarda
B) İnterstisial toxumada
C) Plevrada
D) Bronxun divarında
E) Ağciyər köklərində

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

253) Miliar vərəmin əmələ gəlməsinin şərti:

A) Limforea
B) Göstərilənlərin hamısı düzdür
C) Spontan pnevmatoraks
D) Bakteremiya

sual.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Heç biri düz deyil

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

254) Ağciyərlərin miliar vərəmi zamanı çoxsaylı ocaqlar ağciyərin hansı sahəsini zədələyir?

A) Əsasən zirvolori
B) Kökətrafı sahədən başqa bütün sahəni
C) Əsasən yuxarı və orta payları
D) Eyni dərəcədə bütün sahələri
E) Əsasən orta və aşağı payları

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

255) Ocaqlı vərəmi hansı formalara ayırırlar:

A) Proqressivləşən və reqressivləşən
B) Birincili və ikincili
C) Eksudativ və proliferativ
D) Tipik və atipik
E) Yumşaq və fibroz ocaqlı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

256) Vərəm mikobakteriyasının aşkar olunmasında daha çox istifadə olunan üsul hansıdır?

A) Kultural üsul
B) Bioloji materialın GeneXpert müayinəsi

sual.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Bioloji üsul
D) Histolojı müayinə
E) Sitoloji müayinə

Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən aşkarında bakterioloji müayinə metodunun təşkili (metodik təlimat) Bakı 2001.

257) Mikobakteriyaları aşkar etmək üçün hansı materialdan istifadə edilməlidir?

A) Bütün sayılanlar
B) Bioptat
C) Mədə və bronxların yuyuntu suları
D) Plevral maye
E) Bəlğəm, sidik və şişdən gələn ifrazat

Ədəbiyyat: M.A.Şıxlinskaya, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.B.Qurbanova. Turşuya davamlı mikoakteriyaların aşkarlanması üçün mikroskopik tədqiqatın aparılması üsulları (metodik təlimat) Bakı 2006. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

258) Mikroskopik müayinənin effektivliliyini artıran hansı müayinə metodu var?

A) Lyuminesent mikroskopiyası
B) Kultural əkmə üsulu
C) Biokimyəvi müayinələr.
D) Flotasiya
E) İmmunoloji müayinələr

Ədəbiyyat: M.A.Şıxlinskaya, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.B.Qurbanova. Turşuya davamlı mikoakteriyaların aşkarlanması üçün mikroskopik tədqiqatın aparılması üsulları (metodik təlimat) Bakı 2006. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

259) Vərəm mikobakteriyaları aşağıda göstərilənlərdən hansına transformasiya edə bilirlər?

A) Rikketsiyalara
B) Kokklara
C) L-formalara və filtrdən keçən virusa oxşar formalara
D) Transformasiya etmirlər
E) Viruslara

Sinaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.; E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

260) Mikobakteriyaların kultural müayinə metodları hansılardır?

A) Sadalanların heç biri
B) Elektron mikroskopiya
C) Luminissent mikroskopiya
D) İmmunoloji hüceyrə zəncirinin aşkarı
E) Fenotipik və genotipik müayinələr

Ədəbiyyat: М.И.Перельман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.; E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

261) Atipik mikobakteriyalar harada yaşayır?

A) Torpaqda
B) Su hövzələrində
C) Bütün cavablar düzgündür
D) Heyvanların orqanizmində
E) Quşların orqanizmində

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

262) Atipik mikobakteriyaların törətdiyi ağciyər mikobakteriyozu ilə vərəmi hansı əlamətlərə görə diferensasiya etmək mümkündür?

A) Xəstəliyin kliniki gedişatına görə
B) Ayırd edilmir
C) Aşkar edilmiş törədicinin növünə görə
D) Xəstəliyin rentgenoloji əlamətlərinə görə
E) Bütün cavablar düzgündür

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.; E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

sınaq üçün istifadə üçün

263) Mikobakteriyaların spesifik dərmanlara həssaslığını hansı üsulla aşkar etmək olar?

A) Hamısı ilə
B) Kultural üsul ilə
C) Bioloji metodla
D) İmmunoloji üsulla
E) Biokimyəvi üsulla

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

264) Aerogen yoluxma zamanı vərəm mikobakteriyalarını ilkin olaraq hansı hüceyrələr fagositoz edir?

A) Makrofaqlar və neytrofillər
B) Limfositlər
C) II –ci sıra alveolositlər
D) I –ci sıra alveolositlər
E) Eritrositlər

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.; E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

265) Mikobakteriyaların spesifik dərmanlara davamlığı hansı üsulla təyin edilir?

A) Biokimyəvi üsulla
B) Sadalanların hamısı ilə
C) İmmunoloji üsulla
D) Kultural üsul ilə
E) Bioloji metodla

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

266) Kultural metodla 7-8 gün müddətində cavab əldə etmək üçün mikobakteriyalar hansı mühitdə əkilməlidir?

A) Aqar-Aqar

Sinaq üçün istifadə üçün

B) Bərk qidalı mühitdə
C) Levenşteyn-Yensen qidalı mühitdə
D) Qris mühiti
E) BAKTEK 960 MGİT duru qidalı mühitdə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

267) Vərəmin ikincili formaları hansı orqanlarda gizli yerləşən ocaqların reaktivasiyası nəticəsində əmələ gəlir?

A) Bronx divarının membran qışasında
B) Ağciyər parenximasında
C) Plevrada və digər orqanlarda (böyrəklər, sümüklər, oynaqlar və s.)
D) Bütün qeyd edilən orqan və toxumalarda
E) Divararalığı limfa vəzlərində

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

268) İlkin vərəmin lokalizasiyası hansılardır?

A) Bütün göstərilənlər mümkündür
B) Döş qəfəsi daxili limfa vəziləri
C) Ağciyər toxuması və döş qəfəsi daxili limfa vəziləri
D) Bronxlar
E) Ağciyər toxuması

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

269) Vərəmin ikincili formaları dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Vərəmin xroniki formaları
B) İlkin yoluxma ocaqlarının endogen reaktivasiyası və ekzogen superinfeksiya nəticəsində əmələ gələn vərəm
C) Orta yaşlı insanlarda vərəm
D) Yaşlı insanlarda vərəm
E) Vərəmin ağciyərdən kənar lokalizasiyası

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.; E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

270) Ağciyərlər ardıcıl olaraq hansı anotomik vahidlərə bölünür?

A) Pay, seqment, zona
B) Zona, pay, seqment
C) Pay, seqment, asinus
D) Pay, asinus, seqment
E) Seqment, pay, asinus

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

271) Ağciyərin anatomik quruluşunun vahidi nədir?

A) Pay
B) Seqment
C) Asinus
D) Zona
E) Paycıq

Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

272) Sağ ağciyərin neçə seqmenti var?

A) 7
B) 10
C) 6
D) 8
E) 2

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

273) Sol ağciyər neçə seqmentdən ibarətdir?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 9
E) 8

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

274) Ağciyərin orta payının lateral hissəsində neçənci seqment yerləşir?

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) I-II seqment
B) III seqment
C) V seqment
D) IV seqment
E) VI seqment

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

275) Sol ağciyərin yuxarı payının linqulyar hissəsində neçənci seqmentlər yerləşir?

A) III-IV seqmentlər
B) I-II seqmentlər
C) V-VI seqmentlər
D) IV-V seqmentlər
E) IX-X seqmentlər

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

276) Ağciyərin aşağı payının yuxarı hissəsində neçənci seqment yerləşir?

A) VI seqment
B) VII seqment
C) VIII seqment
D) X seqment
E) IX seqment

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

277) Sol ağciyərin yuxarı payının arxa şöbəsində neçənci seqment yerləşir?

A) I-II seqment
B) II seqment
C) I seqment
D) IV-V seqment
E) II-III seqment

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

278) Sol ağciyərdə onurğa sütununun IV-VI döş fəqərələrinin ön proyeksiyasında yerləşən seqment hansıdır?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) VIIseqment
B) VIII seqment
C) IX seqment
D) VI seqment
E) X seqment

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

279) Tənəffüs yolların bütün şöbələrinin ümumi funksiyası hansılardır?

A) Havanın bölünməsi
B) Yad cisimlərdən təmizləmə
C) Kondisə etmə (isitmə, nəmləşdirmə)
D) Bütün sayılanlar
E) Havanın keçirilməsi

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

280) Yuxarı tənəffüs yollarının başlanğıcı sayılan burunun tənəffüs aktında hansı funksiyası var?

A) Havanı nəmləndirir, soyudur
B) Havanı soyudur
C) Havanı qəbul edir, soyudur
D) Havanı qəbul edir, qızdırır, nəmləndirir
E) Sadalanların heç biri düz deyil

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

281) Tənəffüs yollarından seliyin ağız boşluğuna nəqlində əsas rolu nə oynayır?

A) Tənəffüs zamanı havanın hərəkəti
B) Öskürək
C) Sadalananların hamısı doğrudur
D) Kirpikli epitelinin kirpikciklərinin ehtizazı
E) Seliyin osmotik təzyiqindəki fərq

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

282) Ağciyərlərin üzərini örtən plevra necə adlanır?

tensk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Zərif birləşdirici toxuma
B) Visseral plevra
C) Fassiya
D) Sadalanların heç biri
E) Parietal plevra

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

283) Kirpikli epitelinin hərəkəti nəticəsində iri bronxlardan seliyin yerdəyişməsinə nə səbəb olur?

A) Seliyin öz formasını saxlaya bilmə qabiliyyəti
B) Bütün sayılanlar
C) Seliyin yapışqanlığı
D) Seliyin gərginliyi və elastikliyi
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

284) Sağlam insanlarda havanın kondensləşməsi hansı şaxələnmə səviyyəsində başa çatır?

A) Pay bronxlarıda
B) Membran bronxlarının başlanğıc şöbələrində
C) Seqmentar bronxlarda
D) Tənəffüs bronxlarında
E) Subseqmentar bronxlarda

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

285) Sağ ağciyərin orta payında hansı seqmentlər yerləşir?

A) I-III seqment
B) II-IV seqment
C) VIII-IX seqment
D) VI seqment
E) IV-V seqment

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.
286) Döş qəfəsi daxili plevra necə adlanır?

A) Visseral
B) Parietal

tosk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Fassiya
D) Aponevroz
E) Zəif birləşdirici toxuma

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

287) Asinusu drenaj edən bronx hansıdır?

A) Membran bronxiol
B) Terminal bronxiol
C) Respirator bronxiol
D) Sadalananların heç biri
E) I-II sıra bronxları

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

288) Yad cismin makrofaqlar tərəfindən faqositozu necə başa çatır?

A) Yad cismin sitoplazmada tapılması, bronxlar və limfa damarları vasitəsi ilə xaric olması ilə
B) Bütün cavablar doğrudur
C) Makrofaqın zədələnməsi ilə
D) Heç biri doğru deyil
E) Yad cismin dağılması ilə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

289) Döş sümüyü ilə hansı qabırğalar birləşmir?

A) XI-XII qabırğa
B) V-VI qabırğa
C) I –II qabırğa
D) Birləşməyən yoxdur
E) IX-X qabırğa

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

290) Bronx ağciyər aparatının kökündə böyümüş limfa düyünləri hansı xəstəliklərdə müşahidə oluna bilər?

A) Xroniki pnevmoniya
B) Kiçik qan dövranında durğunluq zamanı

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Vərəm və şişlərdə
D) Ürəyin kəskin işemik xəstəliklərində
E) Xroniki bronxitdə

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

291) Plevral səhifələr hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

A) Ağciyər parenximasının bərabər ventilyasiyasının təmini
B) Bronxial arteriyalar sistemində qanın hərəkətinin bərabərliyinin təmini
C) Plevradaxili təzyiqin qorunub saxlanılması
D) Baryer funksiyası
E) Plevral şırımlarda mayenin kapilyar təbəqəsinin saxlanmasını

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

292) Plevra boşluğunda olan təzyiq necə qiymətləndirilir?

A) Mənfi təzyiq
B) Atmosfer təzyiqi
C) Təzyiq olmur
D) Müsbət təzyiq
E) Normal təzyiq

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

293) İltihabi mənşəli ekssudativ plevritlər zamanı plevral bitişmələrin əmələ gəlməsinin qarşısını necə almaq olar?

A) Bütün cavablar doğrudur
B) Xəstəliyin erkən diaqnostikası
C) Ekssudatın təkrar evakuasiyası
D) Ekssudatın aşkar olunduğu an evakuasiyası
E) Plevral boşluğa eksudatın evakuasiyasından sonra plevral bitişmələrin əmələ gəlməsinin qarşısını alan preparatların (qlükokortikoid hormonlar, lidaza) yeridilməsi

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

294) Aşağıdakılardan hansı immunitetin əsasını təşkil edir?

A) Hüceyrə
B) Humoral

Sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Makrofaqial-faqositar sistem
D) Sadalananların hamısı
E) Neyroendokrin

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

295) Ağciyərin həyat tutumu hansı cihaz vasitəsilə təyin olunur?

A) Rentgenoqraf
B) Tomoqraf
C) Angioqraf
D) Audimetr
E) Spirometr

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

296) Vərəm əleyhinə immunitetin yaranması hansı faktorla əlaqədardır?

A) Ləng tipli yüksək həssaslıq
B) Vərəm mikobakteriyalarının antigen strukturunun xüsusiyyətləri ilə
C) Bütün sayılanlarla
D) İmmun yaddaş
E) Antitel əmələgətirmə

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

297) Normada ağciyərin qalıq həcmi (ağciyərin ümumi həcmindən % hesabı ilə) nəyə bərabərdir?

A) 7000-2000 ml
B) 3000-3500ml
C) 1000-2000 ml
D) 500-700 ml
E) 2000-2500 ml

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

298) Ağciyərin həyat tutumu neçə ml-dir?

smk.az dənişsiz istifadə üçün

A) 6000 ml
B) 1500 ml
C) 4000 ml
D) 3500 ml
E) 5000 ml

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

299) Ağciyərin tənəffüs hərəkətinin yazısı necə adlanır?

A) Pnevmoqrafiya
B) Heç biri
C) Tomoqrafiya
D) Skanoqrafiya
E) Rentgenoqrafiya

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

300) Hava vasitəsilə ağciyərə daxil olan toksiki maddələrin və mikroorqanizmlərin ağciyəri zədələməsi riski nə ilə əlaqədardır?

A) Bütün sayılanlarla
B) Ağciyərin zərər verən mühitlə daha çox təmasda olması ilə
C) Orqanizmin immun sistemindən asılı olaraq
D) Ağciyərin hava daşıyıcı yollarının epitelial qatının funksiyası ilə
E) Bu orqanın qan dövranı xüsusiyyətləri ilə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

301) İnsan orqanizminə vərəm mikobakteriyaları daha çox hansı yolla daxil olur?

A) Həzm traktı vasitəsi ilə su və qida ilə
B) Tənəffüs orqanları vasitəsi ilə (hava-damcı yolu ilə)
C) Kontakt vasitəsi ilə
D) Transplasentar yol ilə
E) Yatrogen yol ilə (tibbi manupiulyasiyalar zamanı alətlər vasitəsi ilə yoluxma)

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

302) Vərəm mikobakteriyalarının orqanizmə daxil olarkən ilkin olaraq hansı bronxları zədələmək ehtimalı var?

A) Bronxiolların (terminal və respirator)
B) Sadalanların heç birini
C) Subseqmentar və membran bronxları
D) Alveol bronxların
E) Baş, pay və seqmentar bronxları

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

303) Mikobakteriyanın miqrasiyası zamanı vərəm ocağının yaranma ehtimalı hansı orqanda yox dərəcəsindədir?

A) Dərialtı piy təbəqəsində
B) Plevra və oynaqlarda
C) Böyrəklərdə, sidik axarlarında və sidik kisəsində
D) Limfa vəzilərində
E) Ağciyər toxumasında və bronxial ağacda

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

304) Orqanların vərəmlə zədələnməsinə təsir edən amillər hansılardır?

A) İrsi genetik faktor
B) Yaş faktoru (böyümə və ayrı-ayrı orqan və onların strukturalarının yenidənqurma dövrü)
C) Bütün sayılanlar
D) İmmundefisitlər
E) Yanaşı xəstəliklər

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

305) Uşaqlarda vərəm infeksiyasına qarşı ən az davamlı orqanlar hansılardır?

A) Qan damarları
B) Sümüklər
C) İri oynaqların sinovial qişaları
D) Limfa vəziləri
E) Böyrək damarlarının kapilyarları

Sinaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

306) Göstərilən xəstəliklərin hansı vərəmə görə risk qrupuna daxildir?

A) Ağciyər qanqrenası
B) Ağciyər absesi
C) Şəkərli diabet
D) Xroniki kolit
E) Xroniki qastrit

Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

307) Vərəm xəstəsinin hansı şikayəti differensial diaqnostikada mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

A) Qan hayxırma, döş qəfəsində ağrı, öskürək
B) İştahasızlıq,
C) Heç biri
D) Oynaqlarda ağrı
E) Qida kütləsi ilə qanqusma, döş qəfəsində ağrı

Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

308) Həyat şəraiti vərəmlə xəstələnmə riskinə və vərəmin gedişinə təsir edirmi?

A) Sadalananların heç biri
B) İnfeksion prosesin sonrakı gedişinə və xəstələnmə riskinə təsir edir
C) Xəstələnmə riskinə az təsir göstərir və onun gedişinə cüzi təsir edir
D) İnfeksion prosesin sonrakı gedişinə və xəstələnmə riskinə təsir etmir
E) Xəstəliyin yaranmasında əsas rol oynamır

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

309) Ftiziatr üçün ailəvi anamnez hansı hallarda maraq kəsb edir?

A) Hal hazırda ailədə vərəmli xəstənin yaşaması
B) Bu infeksion xəstəliyə irsi meyillilik
C) Sadalananların hamısı

Sinaq ödənişsiz istifadə üçün

D) Açıq formalı vərəmi olan xəstə ilə kontaktda olması yaxud olmaması
E) Vərəmli xəstə ilə kontaktda olduqda və bronx-ağciyər xəstələnəndə ilə tez-tez xəstələnmə

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

310) Hansı müayinənin köməyi ilə vərəm mikobakteriyasının massivliyini və keyfiyyətini təyin etmək olar?

A) Kliniki müayinə
B) Qanın müayinəsi
C) Mikroskopiya və kultural müayinə
D) Flüoroqrafiya
E) Sidiyin müayinəsi

Ədəbiyyat: Методические указания по классификации очагов туберкулезной инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных метоприятий при туберкулезе Москва 1980/ Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

311) Hansı müayinə üsulu ilə vərəm mikobakteriyasını aşkar etmək və onun keyfiyyətini təyin etmək olar?

A) Flüoroqrafiya və kliniki müayinə üsulları ilə
B) Mikroskopik və kultural müayinə üsulu
C) Flüoroqrafiya müayinə üsulları
D) Qanın biokimyəvi müayinə üsulları
E) Kliniki müayinə üsulları

Ədəbiyyat: Методические указания по классификации очагов туберкулезной инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных метоприятий при туберкулезе Москва 1980. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

312) Ağciyərin bərkimiş nahiyəsi harada olarsa onu perkussiya ilə müəyyənləşdirmək mümkün olar?

A) Divar aralığı nahiyədə
B) Döşdaxili limfa vəzlərində
C) Subplevral nahiyədə
D) Ağciyər dərinliyində
E) Sadalananların heç biri

Sinif öz ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

313) Ağciyərin xırıltılarını aydınlaşdırmaq üçün nə edirlər?

A) Xəstənin tənəffüsünü sürətləndirirlər
B) Xəstə dərindən nəfəs alır
C) Xəstə oturaq vəziyyətdə nəfəs alır
D) Heç biri
E) Öskürəkdən sonra tənəffüsü saxlayırlar

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

314) Hansı kliniki forma kliniki və rentgenoloji olaraq zəif simptomlara malik olur?

A) Fibroz kavernoz vərəm
B) Sirrotik vərəm
C) Səpələnmiş vərəm
D) İnfiltrativ vərəm
E) Ağciyərin ocaqlı vərəmi

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

315) Rentgenoloji olaraq hansı dəyişikliklər böyük qalıq əlamətlərinə uyğundur?

A) Sayı beşdən artıq olan bərkimiş vərəm ocaqları
B) Sadalananların heç biri
C) Yumuşaq ocaqlar
D) Sorulma mərhələsində infiltrat
E) Kaverna

Ədəbiyyat: M.C.Греймер, M.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

316) Vərəm mikobakteriyasının DNK-sının aşkar olunmasında daha çox istifadə olunan üsul hansıdır?

A) Kultural üsul
B) Bioloji üsul

sinaz.az öğrənişsiz istifadə üçün

C) Histoloji müayinə
D) Sitoloji müayinə
E) Molekulyar genetik Genexpert MBT/Rif metodu

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən aşkarında bakterioloji müayinə metodunun təşkili (metodik təlimat) Bakı 2001. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

317) Vərəm mikobakteriyanlarını tapmaq üçün aşağıdakı hansı materiallardan istifadə olunur?

A) Bəlğəm
B) Bronxların yuyuntu suyundan
C) Plevral mayedən
D) Sidik
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən aşkarında bakterioloji müayinə metodunun təşkili (metodik təlimat) Bakı 2001. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

318) Aşağıda göstərilən rentgenoloji qalıq əlamətlərindən hansı kiçik qalıq əlamətinə aiddir?

A) Sayca 5-dən az ölçüsü 1 sm-dən kiçik olan kalsinatlaşmış limfa düyünləri
B) Sayca 5-dən çox ölçüsü 1 sm-dən kiçikolan dəqiq sərhədlərə malik ocaqlar
C) Ölçüsü 1 sm-dən böyük olan plevranın qalınlaşması
D) İri həcmli kelloidlər
E) Ağciyərin rezeksiyasından sonrakı qalıqlar

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

319) Kütləvi tuberkulindiaqnostika aparılması məqsədinə aşağıdakilardan hansı uyğun deyil?

A) Yüksək risk qrupunun aşkar olunması və dispanserdə müayinəsi üçün
B) Xəstə uşaqları aşkar etmək üçün
C) Revaksinasiya aparıldığı üçün (VSL seçmək üçün)
D) Yoluxma göstəricisinin müəyyənləşdirilməsi üçün
E) Stasionarda kontingentləri müalicə etmək üçün

Sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı – 2006. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

320) Uşaqlarda tuberkulindiaqnostika nə üçün aparılır?

A) Vərəmin erkən diaqnostikası üçün
B) Vərəm prosesinin aktivliyini təyin etmək üçün
C) Müalicənin effektliyinə nəzarət üçün
D) Vərəmdən və pnevmaniyadan sonrakı qalıq əlamətlərinin differensal diaqnostikası üçün
E) Sadalanların hamısı

Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı – 2006. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

321) Azərbaycanda ambulator şəraitində istifadə edilən tuberkulin sınağı hansıdır?

A) 100 TV ilə Mantu sınağı
B) Kox sınağı
C) Sayılanlardan heç biri
D) Sayılanların hamısı
E) 2 TV ilə Mantu sınağı

Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı – 2006. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

322) Tuberkulin hansı tələblərə uyğun olmalıdır?

A) TDM-in patogenliyini saxlayan tuberkulin
B) Qeyri stabil
C) TDM-in virulentliyini saxlayan tuberkulin
D) Bioloji aktiv
E) Spesifik, standart, təmizlənmiş

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

323) Tuberkulin sınağının virajı nə deməkdir?

A) Hər il sınağın müsbət cavabının olması
B) Bütün sadalananlar
C) Vərəm əleyhinə peyvənd almış 2 yaşlı uşaqda sınağın müsbət olması
D) Sadalanların heç biri
E) Əvəllər "mənfi" və "şübhəli" olan reaksiyaların ilk dəfə müsbət olması

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

324) Rentgenoloji və kliniki olaraq mikobakteriya ifraz edən fəal vərəm xəstəsi tapıldıqda ilk dəfə hansı müəssisəyə xəbərdarlıq vərəqəsi göndərilir?

A) Respublika vərəm institutuna
B) Ərazi şəhər poliklinikasının baş həkiminə
C) Ərazi səhiyyə təşkilatının rəhbərinə
D) Respublika vərəm dispanserinə
E) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

325) Hansı səbəb tuberkulinə qarşı hiperergik həssaslığı törətmir?

A) Vərəmlə xəstələnmə
B) Orqanizmdə vərəm infeksiyasının fəallaşması
C) Superinfeksiya, eləcə də aktiv formalı vərəm nəticəsində orqanizmi spesifik sensibilizasiyanın yüksəlməsi
D) Keçirilmiş qeyri spesifik pnevmoniyanın qalığı
E) Paraallergik amillər

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

326) Bir neçə ağciyər seqmentində müşahidə olunan fibroz necə adlanır?

A) Böyük qalıq əlaməti
B) Kiçik qalıq əlaməti
C) Ocaqlı vərəm sorulma mərhələsində
D) Residiv
E) Ocaqlı vərəm bərkimə mərhələsində

Sınaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

327) Mikroskopiyanın interpritasiyası zamanı bir müsbət (+) nəyi izah edir?

A) 100 görüş sahəsində 100 mikobakteriya
B) 100 görüş sahəsində 150 mikobakteriya
C) 100 görüş sahəsində 1-9 mikobakteriya
D) 100 görüş sahəsində 200 mikobakteriya
E) 100 görüş sahəsində 250 mikobakteriya

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

328) Rentgenoloji olaraq kiçik ocaqlar hansı ölçüdə olur?

A) Diametri 7-8 mm
B) Diametri 3-4 mm
C) Diametri 1 sm-dən yuxarı
D) Diametri 9-10 mm
E) Diametri 5-6 mm

Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

329) Rentgenoloji olaraq orta ölçülü ocaqlar hansı ölçüdə olur?

A) Diametri 3-4 mm
B) Diametri 10-12 mm
C) Diametri 5-8 mm
D) Diametri 15 mm
E) Diametri 9-10mm

Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

330) Rentgenoloji olaraq iri ölçülü ocaqlar hansı ölçüdə olur?

A) Diametri 3-4 mm
B) Diametri 5-8 mm
C) Diametri 10-12 mm
D) Diametri 9-10mm

sinaq özünüzsiz istifadə üçün

E) Diametri 15-20 mm

Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

331) Mikobakteriyanın kəmiyyət göstəricilərinə hansılar aiddir?

A) Sadalananların hamısı
B) Şərti mikobakteriya ifrazı
C) Hissəvi mikobakteriya ifrazı
D) Kütləvi mikobakteriya ifarzı
E) Bir görüş sahəsində 1-2 mikobakteriyanın olması

Ədəbiyyat: Методические указания. По классификации очагов туберкулезной инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных метоприятий при туберкулезе Москва 1980. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

332) Ağciyərin destruktiv vərəmində mikobakteriyaların yaxma və əkmə metodları vasitəsilə bəlğəmdə aşkarlanması neçə faiz olmalıdır ?

A) 60 %
B) 40 %
C) 70 %
D) 100 %
E) 50%

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

333) DOT strategiyası üzrə nəzarət altında müalicə neçə mərhələdə aparılır?

A) Müalicə mərhələlərlə aparılmır
B) 4 mərhələdə
C) Sadalananların hamısı
D) 2 mərhələdə - intensiv və davamedici
E) 6 mərhələdə

Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci buraxılış 1998-il. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

334) DOT strategiyası üzrə xəstələr neçə kateqoriyaya bölünür?

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 6
B) 4
C) 8 və daha çox
D) 8
E) 2

Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci buraxılış 1998-il. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

335) DOT strategiyası üzrə intensiv mərhələ neçə ay təşkil edir?

A) 2 ay
B) 1 il
C) 4 ay
D) 7-8 ay
E) 9-10 ay

Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci buraxılış 1998-il. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

336) DOTS strategiyası üzrə davamedici mərhələ neçə ay təşkil edir?

A) 2-3 ay
B) 4 ay
C) 4-5 ay
D) 2 ay
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci buraxılış 1998-il. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

337) Göstərilən preparatlardan ineksion spesifik dərmanlar hansılardır?

A) Kanamisin+ Rifampisin
B) Streptomisin+ Kanamisin
C) İzoniazid+Kapriomisin
D) Kapriomisin + Sikloserin+ Proteonamid
E) İzoniazid+ Rifampisin+ Streptomisin

Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci buraxılış 1998-il. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinsk.az ödənişsiz sitatdə üçün

E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

338) İlkin yoluxmuş uşağın orqanizmində vərəm mikobakteriyalarına yoluxma yolları hansılardır?

A) Fəal vərəm xəstəsi ilə təmas
B) Limfogen
C) Hematogen
D) Bütün sayılanlar
E) Bronxogen

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

339) Erkən yaşlı uşaqlarda vərəm intoksikasiyanın əsas klinik simptomu hansıdır?

A) Temperaturun yüksəlməsi
B) Qanhayxırma
C) Öskürək
D) Titrətmə
E) Bədən çəkisinin artmaması

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

340) İlkin yoluxmanın hansı əsas dövrləri ayırd edilir?

A) Latent mikrobizm
B) Paraspesifik allergiya
C) Bakteriemiya
D) Inkubasiya
E) Bütün sayılanlar

Ədəbiyyat: Король О.И., Носкова О.М., Клочкобова Л.В. и др. Характеристика туберкулезной инфекции у детей. Пробл.туб. 1992 № 7-8. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

341) Tuberkulinə həssaslığın “virajı” anlayışı nəyi ifadə edir?

A) Vərəm infeksiyasının erkən dövrü
B) Mantu reaksiyasının ölçüsünün 4 mm-ə qədər olması
C) Əvvəllər hiperergik reaksiya olanlarda reaksiyanın daha da artması

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Əvəllər “mənfi” və “şübhəli” kimi qiymətləndirilən tuberkulin sınaqlarından sonra ilk dəfə “müsbət” tuberkulin reaksiyasının əmələ gəlməsi
E) Sadalanların heç biri

Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

342) İlkin vərəm infeksiyasının erkən dövründə preventiv müalicənin aparılmasında məqsəd nədir?

A) Paraspesifik reaksiyalara təsir
B) İntoksikasiya sindromuna qarşı təsir
C) Tuberkulinə qarşı həssaslığa təsir
D) Kazeoz nekroza qarşı təsir
E) Vərəm mikobakteriyaların məhv edilməsi təsir

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

343) İlkin yoluxmanın vərəmlə xəstələnməyə keçməsinin əsas səbəbləri hansılardır?

A) Massiv superinfeksiyalar
B) İlkin vərəm infeksiyasının erkən dövründən profilaktik müalicənin aparılmaması
C) Əlverişsiz premorbid fon və tez-tez təsadüf olunan interkurrent xəstəliklər
D) Postvaksinal immunitetin sönməsi
E) Bütün sayılanlar

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

344) Döşqəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi ilə xəstə uşaqların aşkarlanmasının əsas üsulu hansıdır?

A) Rentgenoskopiya
B) Bütün sayılanlar
C) Ağciyər kökündən keçən tomoqrafik müayinə
D) Flüoroqrafik müayinə
E) Rentgenoqrafiya

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

345) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin fəal fazada olan vərəmi üçün ən tipik morfoloji dəyişiklik nədir?

Sınaq özəlnişsiz istifadə üçün

A) Perifokal iltihab
B) Kalsinasiya
C) Limfoid toxumanın hiperplaziyası
D) Kazeoz nekroz
E) Limfa vəzi toxumasının fibrozlaşması

Ədəbiyyat: Миллер Ф.ДЖ. Туберкулез у детей «Медицина» 1984. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

346) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin rentgenoloji əlamətləri hansılardır?

A) Ağciyər kökünün deformasiyası və genişlənməsi
B) Ağciyər kökünün xarici konturunun yayılmış və polisiklik olması
C) Ağciyər kökü kölgəsi strukturunun zəifləməsi
D) Ağciyər kökünün ölçüsünün böyüməsi
E) Bütün sayılanlar doğrudur

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

347) Uşaq və yeniyetmələrdə birincili vərəm zamanı xəstəliyin klinik əlamətlərinin dərəcəsi hansı faktorlardan asılıdır?

A) Uşağın yaşından
B) Təbii immunitetin vəziyyətindən
C) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin zədələnməsinin morfoloji substraktından
D) Postvaksinal immunitetin vəziyyətindən
E) Bütün sayılanlardan

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

348) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmini tənəffüs üzvlərinin hansı qeyri-spesifik xəstəlikləri ilə differensasiya etmək lazım olur?

A) Bütün sayılanlar
B) Ağciyər köklərinin və divararalığının "geniş damarlar" fenomeni ilə
C) Divararalığının limfoması ilə
D) Çəngələbənzər vəzin hipereplaziyası ilə
E) Sarkaidoz ilə

Ədəbiyyat: М.И.Перельман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

349) Çəngələbənzər vəzin böyüməsinin ambulator şəraitdə minimum müayinə metodu hansıdır?

A) Döş qəfəsi orqanlarının 2 proyeksiyada çəkilmiş rentgenoqramması
B) Kompüter tomoqrafik müayinəsi
C) Divararalığı orqanlarının uşağın qarnı üstə uzanma vəziyyətində aparılmış tomoqrafik müayinəsi
D) Bütün sayılanlar
E) Pnevmomediastinoqrafiya

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

350) Döş qəfəsi daxili limfadenopatiyanın sistem xəstəliyi və ya bəd xassiyətli olması diaqnozunun verifikasiyası üçün vacib sayılan müayinə metodu hansıdır?

A) Maqnit nüvə rezonans kompyuter tomoqrafik müayinəsi
B) Limfa vəzinin biopsiyası
C) Traxeobronxoskopiya
D) Döş qəfəsi orqanlarının rentgenotomoqrafik müayinəsi
E) Kompyuter tomoqrafiyası

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

351) Uşaqlar arasında ilkin vərəmin fəsadlaşmış gedişatının səbəbi nədir?

A) Qeyri-rasional müalicə
B) Vərəm əleyhinə peyvənd olmayan uşaqlarda xəstəliyin gec aşkarlanması
C) Uşağın erkən yaşlı olması səbəbindən şikayətlərinin araşdırılmasında olan çətinliklər
D) Bütün sayılanlar
E) Massiv superinfeksiya

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

352) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmi zamanı ağır fəsad hansıdır?

A) Limfogen səpələnmə
B) Vərəm meningiti
C) Hematogen disseminasiya
D) Bronxların zədələnməsi
E) Bronx ağciyər zədələnməsi

Sınaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: Рачинский С.В. Бронхолегочный туберкулез у детей раннего возраста Москва «Медицина» 1975. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

353) Vərəmə yoluxmuş erkən yaşlı uşaqlar ən çox hansı səbəbdən vərəmlə xəstələnirlər?

A) Bronx-ağciyər sisteminin birləşdirici toxumalı elastik karkasının tam inkişaf etməməsi ilə əlaqədar
B) Hematoensefalik baryerin yüksək keçiriciliyi səbəbindən
C) İntensiv böyümə və əsas tənzimləyici sistemlərin funksional yetişkənliyinin zəifliyi ilə əlaqədar
D) İmmunitetin funksional zəifliyi və yüngül dərəcəli enməsi ilə
E) Bütün sayılanlar

Ədəbiyyat: Король О.И., Носкова О.М., Клочкобова Л.В. и др. Характеристика туберкулезной инфекции у детей. Пробл.туб. 1992 № 7-8. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016

354) Xroniki gedişatlı ilkin vərəmin kəskinləşməsi hansı ağır kliniki forma şəkildə özünü biruzə verə bilər?

A) Bütün sayılanlarla
B) Istənilən bronx ağciyər fəsadları
C) Bronx ağacının zədələnməsi
D) Miliar vərəm və meningit ilə nəticələnən hematogen disseminasiya
E) Döş qəfəsi daxili vəzlərinin digər qruplarının prosesə cəlb olunması

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

355) Vərəmə ilkin yoluxma nə ilə nəticələnə bilər?

A) Latent mikrobizm
B) Spesifik infeksion immunitetin formalaşması
C) Müalicədən sonra sağalma
D) Bütün sayılanlar
E) Vərəmin lokal formasının əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко, Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

356) Tuberkulinə qarşı hiperergiyanın aşkarlanması nəyi sübut edir?

A) Parallergiyanı
B) Bütün sayılanları
C) Superinfeksiyanı

Sitrik.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Vərəmin lokal formasını
E) Orqanizmdə VMB –nin yüksək aktivliyini

Ədəbiyyat: Рыжкова А.П., Фирсова В.А. Овсянкина Е.С., Кузмина Л.Э. Диагностика туберкулеза в современных условиях СПб. 1992. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

357) İlkin yoluxma zamanı infeksiyanın orqanizmdə yayılmasının əsas yolları hansılardır?

A) Bronxogen
B) Limfohematogen
C) Hemotogen
D) Bütün sayılanlar
E) Limfogen

Ədəbiyyat: Кочнова И.Е.Сухановский В.П., Ильяш Н.Н, Малютина И.Д. Об особенностях современного туберкулеза у детей. Проб.туб. 1981 №1. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

358) Rentgen-tomoqrafik müayinə zamanı infiltrasiya fazasında hansı qrup limfa vəzlərinin patoloji prosesə cəlb olunmasını aşkar etmək mümkün deyil?

A) Ön bronxopulmonal
B) Botall axarının limfa vəzlərini
C) Sol tərəfdə aşağı bronxopulmonal
D) Bifurkasion
E) Sol tərəfdə yuxarı bronxopulmonal

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

359) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərin vərəmi olan xəstələrdə müalicənin başlanğıc kombinasiyasının və preparatların dozasının seçilməsi hansı faktorlardan asılıdır?

A) Uşağın yaşından və premorbid fonundan
B) Spesifik prosesin fazasından
C) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərindəki prosesin yayılma dərəcəindən
D) Bütün sayılanlardan
E) Zədələnmənin nəzərdə tutulan morfoloji substraktından

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

360) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində aşkarlanan patoloji prosesin qeyri spesifik xarakterdə olmasını nə təyin edir?

sınaq üçün ödənişsiz istifadə

A) Qeyri-spesifik terapiyanın effektivliyi
B) İki tərəfli limfa damarlarının reaksiyasının olması
C) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin iki tərəfli simmetrik hiperplaziyası
D) Bütün sayılanlar
E) Əsas xəstəliyin zəifləməsi və ya onun müalicəsi fonunda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin ölçüsünün kiçilməsi

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

361) Spesifik prosesin fəallığının qiymətləndirilməsi hansı kriteriyalara əsaslanır?

A) Mikroskopik müayinənin nəticələrinə
B) Xəstəliyin kliniki əlamətləri
C) Rentgen-tomoqrafik müayinələrin nəticələri
D) Molekulyar-genetik Gnenexpert MBT/Rif müayinəsinin nəticələrinə
E) Bütün sayılanlar

Ədəbiyyat: Фирсова В.А. Туберкулез органов дыхания – М.Медицина 1978. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

362) İlkin vərəmdə bronxların zədələnməsinin mümkün variantlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Məhdud kataral endobronxit
B) Bronxlardakı infiltrativ dəyişikliklər
C) Diffuz kataral-irinli endobronxit
D) Peribronxit
E) Bronxlardakı xoralı və fistullu proseslər

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

363) İlkin vərəmdə bronxların zədələnməsini təsdiq edən yardımçı rentgenoloji əlamətlərə hansılar aiddir?

A) Bronx-ağciyər zədələnməsi
B) Bronx mənfəzinin tutulması
C) Bronx-ağciyər səpələnməsi
D) Bütün sayılanlar
E) Hipoventilyasiya

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sınaq üçün istifadə üçün

364) Ekssudativ plevritin kəskin dövrü üçün hansı klinik əlamətlər xasdır?

A) Subfebril hərarət
B) İntoksikasiya sindromu
C) Bütün sayılanlar
D) Döş qəfəsində ağrılar
E) Quru öskürək

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

365) Xroniki gedişatlı ilkin vərəm üçün əsas xarakterik cəhət nədir?

A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərindəki morfoloji polimorfizm
B) Dalğavari gedişat
C) Proqressivləşən torpid gedişat
D) Bütün sayılanlar
E) Xəstəliyin uzun müddət davam etməsi (2 ildən az olmayaraq)

Ədəbiyyat: Василева М.П., Довгалюк И.Ф., Шац С.Б. Течение ослажнений первичного туберкулеза у детей в современных условиях Проб.туб. 1984 № 4. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

366) Uşaqlarda iri bronxların vərəminin diaqnostikası nəyə əsaslanır?

A) Laborator müayinələrin nəticələrinə (bakterial)
B) Rentgen tomoqrafik müayinələrin nəticələrinə
C) Traxeobronxoskopiyanın nəticələrinə
D) Rentgenoskopiyaya
E) Klinik kriteriyalara

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

367) Uşaq və yeniyetmələr arasında aparılan tuberkulindiaqnostikanın məqsədi nədir?

A) Əhali arasında vərəmə yoluxmanın səviyyəsini müəyyən etmək üçün
B) Kontaktlar arasında profilaktik tədbir kimi
C) Bütün sayılanlar
D) VƏP (vərəm əleyhinə profilaktika aparılması üçün kontingentin seçilməsi
E) Differensial diaqnostika məqsədi ilə

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan

onsk.az öğrenci istifadə üçün

Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

368) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi "müsbətdir" anlayışı nəyə uyğundur?

A) Papulanın ölçüsünün 4 mm-ə qədər olması
B) Papulanın ölçüsü 5 mm və daha artıq
C) İstənilən ölçüdə hiperemiyanın olması
D) Tuberkulinodiaqnostika aparılan nahiyədə heç bir izin olmaması
E) Papulanın olmaması

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

369) Tuberkulindiaqnostikanın aparılması üçün əks göstərişlər hansılardır?

A) Vərəmli xəstə ilə təmasda olmaq
B) Əvəllər vərəm xəstəliyi keçirmək
C) Mantu sınağının əvəllər müsbət olması
D) Yaxından görmə
E) İnfeksion xəstəliklər, sistem xəstəliklər, infeksion xəstə ilə təmasda olmaq

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

370) Vərəm əleyhinə peyvəndin aparılması üçün əks göstərişlər hansılardır?

A) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsinin müsbət olması
B) Bütün sayılanlar
C) Vərəm xəstəliyi keçirilməsi
D) Vərəmli xəstə ilə kontakt
E) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsinin şübhəli olması

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

371) Uşaqlar və yeniyetmələr arasında tuberkulindiaqnostikanın növlərinə hansı aiddir?

A) Fərdi

Sınaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

B) Provakosion
C) Klinik-diaqnostik
D) Bütün sayılanlar
E) Kütləvi

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

372) Ambulator şəraitdə tuberkulindiaqnotikanın hansı növü aparılır?

A) Sadalananların heç biri
B) Kox sınağı ilə
C) 2TV-li standart tuberkulin məhlulu ilə
D) 100 TV ilə
E) Dərəcələnmiş dəri sınağı ilə

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

373) Tuberkulindiaqnostikanın növlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Mantu 2TE
B) Moro sınağı
C) Dərəcələnmiş dəri sınağı
D) Bütün sayılanlar
E) Kox sınağı

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

374) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi müsbət olan uşaqlar müayinə edilərkən hansı faktor nəzərə alınmalıdır?

A) Papulanın ölçüsü
B) VƏP-dən sonra keçən müddət
C) Bütün sayılanlar
D) Papulanın gərginliyi
E) Yanaşı xəstəliklərin olması

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinif.az ödənişsiz üçün

375) Tuberkulindiaqnostika kimlərə ildə 2 dəfə aparılmalıdır?

A) Sadalananların heç biri
B) Vərəm xəstəliyinə görə VƏD-də qeydiyyatda olanlara
C) Risk qrupundan olan uşaq və yeniyetmələrə
D) Kalloid çapığı olanlara
E) Əvəllər Mantu sınağı müsbət olan uşaqlara

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

376) Postvaksinal allergiya ilə infeksion allergiyanın differensasiya etdikdə nə nəzərə alınmalıdır?

A) Mantu sınağının nəticəsi
B) Bütün sayılanlar
C) Çapığın ölçüsü
D) Vərəm əleyhinə peyvəndin aparılmasından sonra keçən müddət
E) Postvaksinal çapığın olub olmaması

Ədəbiyyat: Особенности интерпретации пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л при определении виража туберкулиновых реакций у детей и подростков и методика определения инфицированности туберкулезом. Метод. Рекомендации Москва 1980. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

377) Vərəm əleyhinə peyvəndin ağırlaşmalarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

A) Körpücüküstü və qoltuqaltı limfadenitlər
B) Kelloid çapıq
C) Soyuq abses
D) Bütün sayılanlar
E) Uzun müddət sağalmayan xoralar

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

378) Doğum evində əks göstərişlərə görə VƏP almayan yenidoğulmuşlara peyvənd nə vaxt edilir?

A) 9 aydan sonra

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 7 yaşında
C) Tibbi əks göstəriş aradan qaldırıldıqdan sonra Mantu sınağının nəticəsi nəzərə alınaraq 2 aydan sonra
D) 1 yaşında
E) 3 yaşında

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

379) Fərdi tuberkulinodiaqnostika nə məqsədlə aparılır?

A) Vərəm prosesinin lokalizasiyasını təyin etmək üçün
B) Bütün sayılanlar
C) Vərəmli xəstə ilə təmas zamanı
D) Vərəm prosesinin aktivliyini təyin etmək üçün
E) vərəm əleyhinə aparılan müalicənin effektliliyini qiymətləndirmək üçün

Ədəbiyyat: Особенности интерпретации пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л при определении виража туберкулиновох реакции у детей и подростков и методика апределения инфицировонности туберкулеза. Метод. Рекомендации Москва 1980. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

380) 2TV ilə Mantu sınağının nəticəsi müsbət kimi qiymətləndirilən uşaq və yeniyetmələrin müayinə planına nə daxil deyil?

A) Qanın ümumi müayinəsi
B) Flüoroqrafik müayinə
C) Bəlğəmin müayinəsi
D) Bronxoskopik müayinə
E) Fizikal müayinə

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

381) Əvvəllər Mantu sınağının müsbət olması ilə əlaqədar qeydiyyatda olub, praktiki sağlam kimi qeydiyyatdan çıxmış uşaqlara təkrari profilaktik müalicə kursu hansı halda göstərişdir?

A) Bütün sayılan hallarda
B) Mantu sınağının ölçüsünün hiperergik reaksiya kimi qiymətləndirilməsi
C) Mantu sınağında papulanın ölçüsünün əvvəlki illərə nisbətən 6 mm artması və ağır yanaşı xəstəliklər olduqda

sisk.az Ödənişsiz istifadə üçün

D) Vərəmli xəstə ilə təmas olduqda
E) Mantu sınağında papulanın ölçüsünün 6 mm və daha çox olması

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

382) Mantu sınağının aparılmasına əks göstərişi olan uşaq və yeniyetmələr arasında vərəmə görə müayinə necə aparılır?

A) Kvartalda 1 dəfə flüoroqrafik müayinə
B) İldə 2 dəfə flüoroqrafik müayinə
C) İldə 1 dəfə flüoroqrafik müayinə
D) Kvartalda 1 dəfə flüoroqrafik müayinə və immunoloji müayinələr
E) İmmunoloji müayinələr

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

383) Uşaq və yeniyetmələr arasında vərəmdən sonrakı kiçik qalıq əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Ağciyərlərdə və limfa vəzlərində tək kalsinatlar, bir seqment səviyyəsində olan fibroz
B) Qruplaşmış ocaqlar
C) Massiv fibroz
D) Tuberkuloma
E) Bir neçə qrup limfa vəzində kalsinatrlar

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

384) Uşaq və yeniyetmələr arasında keçirilmiş vərəmdən sonrakı böyük qalıq əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) 1-2 pay həcmində pnevmoskleroz
B) Massiv kalsinasiya (bir neçə qrup limfa vəzində)
C) Bütün sayılanlar
D) Ağciyərlərdə çox saylı bərkimiş və kalsinatlaşmış ocaqlar
E) Bir pay həcmində pnevmoskleroz və bronxoektazlar

sirsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

385) İkincili vərəm zamanı infeksiya orqanizmdə hansı yollarla yayır?

A) Təmas ilə
B) Hematogen
C) Cift vasitəsi ilə
D) Bronxogen
E) Bronxogen, limfogen və hematogen

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

386) Ağciyər vərəminin ikincili formalarına hansılar aiddir?

A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi
B) Mantu sınağının 3 il ardıcıl müsbət olması
C) Vərəm intoksikasiyası
D) Ocaqlı ağciyər vərəmi, infiltrativ, səpələnmiş, fibroz kavernoz, sirrotik vərəm
E) İlkin vərəm kompleksi

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

387) Miliar vərəm zamanı ocaqların ölçüsü nə qədər olur?

A) 2 sm-ə qədər
B) 0.4 sm-ə qədər
C) 1 sm-ə qədər
D) 0.6 sm-dən artıq
E) 1-2 mm-ə diametrə qədər

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

388) Ocaqlı ağciyər vərəmi üçün hansı əlamət xasdır?

A) Xəstəliyin xroniki gedişata malik olması
B) Mantu sınağının mənfi olması
C) Xəstəliyin simptomsuz başlaması
D) Simptomların çoxluğu ilə
E) Xəstəliyin yüksək hərarətlə başlaması

sinaq üçün ödənişsiz istifadə

Ədəbiyyat: Шебанов В.Ф. Туберкулез 2-е издание Медицина 1981. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

389) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?

A) Mantu sınağında əmələ qələn papuların ötən ilə nisbətən 6 mm və daha çox artması
B) Qanhayxırma
C) Tuberkulin sınaqlarının virajı ilə eyni zamanda inkişaf edən və ya ondan sonrakı illərdə ön plana çıxan funksional dəyişikliklər (bədən hərarətinin subfebril olması, iştahasızlıq və poliadenopatiya) və obyektiv intoksikasiya (tez yorulma, qıcıqlanma, halsızlıq, yuxunun pozulması və s.), simptomo kompleksi
D) Yüksək hərarət
E) Tuberkulin sınağının ilk dəfə müsbət olması

Ədəbiyyat: Похитонова М.П. Клиника, лечение и профилактика туберкулеза у детей-М.,1965. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

390) Vərəm intoksikasiyası zamanı böyümüş periferik limfa vəziləri üçün hansı əlamət xarakterikdir?

A) Periferik limfa vəzilərində fistulların olması
B) Periferik limfa vəziləri ölçüsünün böyük olması
C) Periferik limfa vəzilərinin bərk elastik konsistensiyalı olması
D) Yumşaq elastik konsistensiyalı, ağrısız mikropoliadenopatiya
E) Böyümüş limfa vəzilərinin palpasiya zamanı ağrılı olması

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

391) Vərəm intoksikasiyası zamanı müşahidə olunan rentgenoloji dəyişikliklər nədən ibarətdir?

A) Məhdud lokal proseslər izlənilir
B) Məhdud fibroz dəyişikliklər aşkar olunur
C) Yayılmış sirrotik dəyişikliklər aşkar olunur
D) Qon ocağı aşkar olunmur
E) Rentgenoloji dəyişikliklər müşahidə olunmur

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

392) İlkin vərəm kompleksi ilə döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin differensiyası hansı müayinə metoduna əsasən aparılır?

Sınaq üçün istifadə üçün

A) Rentgenoloji əlamətlərə əsasən
B) Tuberkulinə olan həssaslığa əsasən
C) İmmunoloji dəyişikliklərə əsasən
D) Kliniki simptomokomplekslərə əsasən
E) Hemoqrammada olan dəyişikliklərə əsasən

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

393) Ağırlaşmamış ilkin vərəm kompleksinin rentgenoloji reqresiyası necə gedir?

A) Pnevmonik mərhələ, sorulma mərhələsi, bərkimə mərhələsi, fibroz dəyişiklik, Qon ocağının formalaşması
B) Pnevmonik mərhələ, dağılma mərhələsi, kavernanın formalaşması
C) İnfiltrativ mərhələ dağılma mərhələsi, massiv sirrozun formalaşması
D) Pnevmonik mərhələ, sorulma mərhələsi, fibroz dəyişikliklərin formalaşması
E) Pnevmonik mərhələ, bərkimə mərhələsi, infiltrativ fazaya keçid

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

394) Rentgenoloji müayinələr zamanı bipolyarlıq simptomu vərəmin hansı formasında müşahidə olunur?

A) İlkin vərəm kompleksində
B) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmində
C) Ağciyərin tuberkulyomasında
D) Fibroz kaernoz vərəmdə
E) Ocaqlı ağciyər vərəmində

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

395) Rentgenoloji olaraq "Tut meyvəsi" simptomu hansı formalı vərəm üçün xarakterikdir?

A) İnfiltrativ ağciyər vərəmi üçün
B) İlkin vərəm kompleksi üçün
C) Sirrotik vərəm üçün
D) Fibroz kavernoz ağciyər vərəmi üçün
E) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi üçün

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

Sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

396) Xəstədə düyünlü eritema müşahidə olunarsa onu hansı xəstəliklərlə differensiasiya etmək lazımdır?

A) Ürək çatmamazlığı ilə
B) Limfaqranulyomatoz ilə
C) Trombositar purpura ilə
D) Revmatizm, sarkoidoz və vərəm ilə
E) Talassemiya ilə

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

397) Profilaktik flüoroqrafik müayinələr zamanı uşaq və yeniyetmələrdə döş qəfəsi daxili limfa düyünlərində hiperplaziya aşkarlanarsa differensasiya hansı xəstəliklərlə aparılır?

A) Vərəm ilə
B) Sarkoidoz ilə
C) Limfoqranulyomatoz ilə
D) Sadalananların hamısı ilə
E) Sarkoma ilə

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

398) Uşaq və yeniyetmələr arasında "vərəmə yoluxma" göstəricisi nəyi ifadə edir?

A) "Mantu" sınağı "şübhəli" olanların səviyyəsini
B) Qeyri fəal formalı yaşlı vərəmli xəstələrin səviyyəsini
C) Vərəm infeksiyası rezervuarının həcmini və yeni xəstələnmə hallarının yaranma ehtimalını
D) Uşaq və yeniyetmələr arasında tuberkulin sınağının "virajının" səviyyəsini
E) Qeyri fəal formalı vərəmlə xəstə uşaq və yeniyetmərin səviyyəsini

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

399) Mantu reaksiyası allergik reaksiyaların hansı tipinə aiddir?

A) Kvinke ödemi
B) Allerqozlar
C) Ləng tipli allergik reaksiya
D) Yüksək həssaslıqlı allergik reaksiya
E) Allergik dermatitlər

sinif.az-dən icazəsiz istifadə olunur

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

400) Uşaq və yeniyetmələr arasında vərəm xəstəliyinin proqnozuna hansı amillər təsir edir?

A) Xəstəliyin hansı mərhələdə aşkar edilməsi
B) Mikobakteriyaların antibakterial preparatlara həssaslığı
C) Sadalananların hamısı
D) Yanaşı xəstəliklərin olması
E) Müalicənin adekvatlığı

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

401) Genezinə görə hansı kliniki forma ilkin vərəm xəstəliyi sayılır?

A) Ocaqlı vərəm
B) Fibroz kavernoz vərəm
C) Səpələnmiş ağciyər vərəmi
D) İnfiltrativ ağciyər vərəmi
E) İlkin vərəm kompleksi

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

402) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəminin tumoroz forması nə ilə xarakterizə olunur?

A) Güclü kazeoz-nekroz ilə
B) Ağırlaşma ilə nəticələnən gedişata malik olması ilə
C) Hiperergik tuberkulin sınaqları ilə
D) Bütün sayılan əlamətlər ilə
E) Limfa vəzilərinin zədələnmə ölçüsünün böyük olması ilə

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

403) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmi nə ilə fəsadlaşa bilər?

A) Disseminasiya (limfogen və bronxogen) ilə
B) Plevritlə
C) Atelektaz ilə (bronx ağciyər zədəlnməsi ilə)
D) Bronxların vərəmi ilə
E) Bütün sayılanlarla

Sinif otağında istifadə üçün

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

404) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin tumoroz forması infiltrativ formadan aşağıdakı hansı rentgenoloji əlamətə görə fərqlənir?

A) Kökün kölgəsinin xarici konturları aydın deyil
B) Kökün kölgəsi adi qaydada yerləşib
C) Kökün kölgəsi genişlənib, konturları aydın forması girintili çıxıntılı və dairəvidir
D) Kökün kölgəsinin strukturu yayılıb
E) Kökün kölgəsi deformasiya olunur və yayılır

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

405) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi zamanı ağciyərdə baş vermiş atelektazın rentgenoloji xarakteristikası hansıdır?

A) Ağciyərin orta nahiyəsində infiltrat
B) Sadalananların heç biri
C) Üçbucaq formasında kölgəlik
D) Payarası infiltrativ dəyişiklik
E) Destruksiya boşluğu ilə müşahidə olunan infiltrat

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

406) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi zamanı mikobakteriya ifrazı nə ilə izah olunur?

A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin atelektazı ilə
B) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin infiltrasiya mərhələsi ilə
C) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin bronxa fistul verməsi ilə
D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin payarası plevritlə fəsadlaşması ilə
E) Heç biri ilə

Ədəbiyyat: E.H.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

407) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi hansı xəstəliklərlə differensiasiya olunmalıdır?

A) Qeyri spesifik limfadenit ilə
B) Limfoqranulyomatoz ilə
C) Bütün sayılanlarla

Sərbəst ödənişsiz istifadə üçün

D) Sarkoidoz ilə
E) Bəd xassəli şiş ilə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

408) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi və döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin sarkaidozunu differensasiya edərkən hansı ilk əlamət ilk öncə nəzərə alınmalıdır?

A) Döş qəfəsində ağrıların olması
B) İntoksikasiya simptomlarının olması
C) Sarkoidozda proses simmetrik və fazalı gedişə malik olur
D) Döşqəfəsi daxili limfa vəzlərinin zədələnməsi zamanı güclü klinik simptomların olması
E) Limfa vəzlərinin zədələnmə dərəcəsinin aşağı olması

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

409) Yaşlı xəstələrdə döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində kalsinatların olması nə ilə əlaqədardır?

A) Vərəm prosesi fəaldır
B) Vərəm dəyişikliklərinin fəallığını dəqiqləşdirmək lazımdır
C) Vərəm xroniki formaya keçib
D) Keçirilmiş döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin kliniki sağalma nəticəsində böyük və kiçik qalıq əlamətləri ilə
E) Vərəm prosesi fəallığını itirib

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

410) Ağciyərdə payarası plevranın qalınlaşması necə qiymətləndirilməlidir?

A) Paya gedən bronxun vərəmi
B) Keçirilmiş payarası plevritdən sonra böyük qalıq əlaməti
C) Ağciyərdə şiş prosesinin olması
D) Payarası infiltrat
E) Ağciyərin 4-5-ci seqmentinin atelektazı

Ədəbiyyat: Шебанов В.Ф. Туберкулез 2-е издание Медицина 1981. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

411) Kəskin miliar ağciyər vərəmi ən çox harada lokalizə olunur?

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Dalaq və böyrəklər
B) Qara ciyər və dalaq
C) Ağciyər və baş beynin əsasında
D) Böyrək və baş beyin qişaları
E) Ağciyər və dalaq

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

412) Kəskin miliar vərəm zamanı hansı nəticə qənaətbəxş sayıla bilər?

A) Tam sorulma və kalsinatlaşma ilə nəticələnmə
B) Fibroz-sklerotik dəyişikliklərin inkişaf etməsi
C) Yarım sorulma mərhələsi
D) Ekssudasiya mərhələsindən proliferasiya mərhələsinə keçid
E) Bərkimə

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

413) Yarım kəskin gedişatlı ağciyərin hematogen səpələnmiş vərəmi zamanı ağciyərdəki ocaqlar nə böyüklükdə olur?

A) Orta
B) Kiçik
C) İri həcmli –boşluqlu ocaqlar
D) Sayılanların hər biri ola bilər
E) Orta -böyük

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

414) İnfiltrativ vərəmdə bir payın prosesə cəlb olunması necə adlanır?

A) Perissisurit
B) Bronxogen səpələnmə
C) Lobit
D) Asman tipli infiltrat
E) İnfiltrativ vərəm dağılma mərhələsində

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

415) Limfogen səpələnmiş vərəmin kliniki sağalması üçün ən əhəmiyyətli morfoloji əlamətləri hansılardır?

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Kalsinatlar
B) Ekssudasiya
C) Bütün sayılanlar
D) Kazeoz kütlə
E) Produktiv dəyişikliklər

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

416) Xroniki səpələnmiş ağciyər vərəmi zamanı rentgenoqrammada aşkar olunan ocaqlar nəyi xatırladır?

A) Peribronxial dəyişikliklər
B) İri ölçülü ocaqlar qar boranını xatırladır
C) Orta ölçülü ocaqlar
D) Kiçik ölçülü ocaqlar
E) Müxtəlif ölçülü ocaqlar, peribronxial dəyişikliklər

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

417) Hemotogen səpələnmiş vərəm zamanı ağciyərin hansı hissələri ən çox zədələnir?

A) APİKO-kaudal simmetrik zədələnmə
B) Yuxarı paylar
C) Bütün ağciyər
D) Hər iki ağciyər
E) Aşağı və orta pay

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

418) Bronxogen səpələnmiş vərəm zamanı qənaətbəxş dinamika üçün nə xarakterdir?

A) Ocaqların kalsinatlaşması
B) Bronxların divarlarının daralması
C) Ocaqların bərkiməsi
D) Bronx keçiriciliyinin pozulması və hissəvi hipovensilyasiya
E) Ocaqların sorulması və kalsinatlaşması

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

419) "Ocaqlı vərəm" dedikdə rentgenoloji olaraq nə nəzərdə tutulur?

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ağciyərlərin bir payında yerləşən və ölçüsü 2 sm-dən yuxarı iltihabi prosesi əks etdirən kölgəlik
B) Diametri 1 sm-dən yuxarı olan yeni törəmə kölgəsi
C) Diametri 1 sm-ə qədər olan iltihabi törəmə kölgəsi
D) Bütün sayılanlar
E) Ağciyərin iki payında yerləşən iltihabi kölgəlik

Ədəbiyyat: M.C.Greymer, M.İ.Feygin. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

420) Ocaqlı ağciyər vərəmində ocaqların yerləşməsi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Bir, iki ocağın bir seqmentdə yerləşməsi ilə
B) Ocaqların məhdud şəkildə yerləşməsi ilə
C) Simmetrik hər iki ağciyərdə zədələnmə ilə
D) Ocaqların zəncirvari yerləşməsi ilə
E) Ocaqların sıx yerləşməsi ilə

Ədəbiyyat: M.C.Greymer, M.İ.Feygin. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

421) Ocaqlı ağciyər vərəminin fəallığını dəqiq əks etdirən hansı əlamətlər mövcuddur?

A) Sayılanların hamısı
B) Vərəm mikobakteriyalarının aşkar edilməməsi
C) Ümumi zəiflikdən, yorulma, azacıq bəlğəm ifrazı müşayət olunan öskürəkdən şikayət
D) Ex juvantibus spesifik kimyəvi terapiya nəticəsində müsbət rentgenoloji dəyişikliklərin müşahidəsi
E) Mantu, zülal-tuberkulin və immun-tuberkulin sınaqlarının nəticəsinin zəif müsbət olması

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

422) Vərəm residivlərinin əmələ gəlməsi nə ilə bağlıdır?

A) Yanaşı xəstəliklərin olması
B) Vərəm mikobakteriyalarının vərəm əleyhinə pereparatlara davamlığı
C) Xəstələrin kliniki sağalmış kimi vaxtından əvvəl qiymətləndirilməsi
D) Bütün sayılanlarla
E) Ağciyərlərdə olan qalıq əlamətlərinin xarakteri

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 1998. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sask.az öğrənişsiz istifadə üçün

423) İnfiltrativ vərəm Asman forması eozinofil pnevmoniyasından necə fərqləndirilir?

A) İnfiltrativ vərəmdə qeyri-spesifik müalicə nəticəsində infiltrat sorulmur
B) İnfiltrativ vərəmdə qısa müddətli, qeyri spesifik aparılan müalicə rentgenoloji dinamika vermir, lakin xəstənin hərarəti enir
C) İnfiltrativ vərəmdə qısa müddətli, qeyri spesifik müalicə heç bir rentgenoloji dinamika vermir, eozinofil pnevmaniyasında isə infiltrat sorulur
D) Rentgenoloji dinamika olmur və digər ağciyər yoluxur
E) Rentgenoloji dinamika olmamaqla yanaşı xəstənin vəziyyəti yüngülləşir

Ədəbiyyat: M.C.Greймер, M.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

424) Aşağıda göstərilən kontingentlərdən hansı vərəmə görə risk qrupu sayılmır?

A) Normal həyat tərzi keçirənlər
B) Qaçqınlar
C) Miqrantlar
D) Obliqat qruplar
E) Sanitar gigiyenik normalara əməl etməyənlər

Ədəbiyyat: M.C.Greймер, M.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

425) Dairəvi infiltrat rentgenoloji olaraq ilk növbədə hansı xəstəliklərlə differensiasiya olunmalıdır?

A) Sayılanların hamısı
B) Abseslə
C) Ağciyər xərçəngi ilə
D) Pnevmoniya ilə
E) Retension kista və ya xoşxassəli şişlə

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

426) Buludvari bənzər infiltratın ən xarakterik rentgenoloji əlamətləri hansılardır?

A) Ayrı-ayrı seqmentlərdə məhdud infiltratlar
B) Dağılma boşluğu olmayan aydın sərhədlərə malik infiltrat
C) Ortasında dağılma boşluğu olan aydın sərhədlərə malik infiltrat
D) Aydın konturları olmayan daxilində ocaqlar müşahidə olunan az intensiv kölgəlik

sinaq az ödənişsiz istifadə üçün

E) Dairəvi infiltrativ dəyişiklik

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

427) Vərəm lobiti zamanı rentgenoqrammada nə təyin edilir?

A) Hissəvi olaraq payı əhatə edən kölgəlik
B) Bütün sayılan əlamətlər
C) Ağciyərin bütün payını və ya onun böyük hissəsini əhatə edən qeyri homogen kölgəlik sahəsi (ocaqlar və dağılma boşluğunun hesabına)
D) Bronxogen səpələnmiş ocaqları
E) Total şəkildə iki və ya üç seqmentin təşkil etdiyi payı əhatə edən infiltrativ dəyişikliyi

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

428) Lobitin effektiv müalicəsindən sonra hansı rentgenoloji əlamətlər formalaşır?

A) Ocaqlı pnevmoskleroz sahəsi
B) Emfizema
C) İri ocaqlar
D) Atelektaz
E) Pnevmoskleroz sahəsi

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

429) Kazeoz pnevmoniyanın və infiltrativ vərəmi əsas morfoloji fərqi nədir?

A) Kazeoz-nekrozun üstünlük təşkil etməsidir
B) Bronxogen disseminasiyaya meyillilikdir
C) Dağılma boşluğuna daha tez-tez təsadüf edilməsidir
D) Kazeoz nekrozun atelektazla yanaşı getməsi
E) Zədələnmən həcminin böyüklüyü və dağılma ilə müşahidə olunan kazeoz nekrozun ətraf toxumaya siarət etməsi

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

430) Patoloji pnevmotoraksın səbəbini aydınlaşdırmaq üçün hansı metod üstünlük təşkil edir?

A) Zonoqrafiya

Sınaq az olanışsız istifadə üçün

B) Kökdən keçən tomoqrafiya
C) Rentgenoskopiya
D) Flüoroqrafiya
E) Kompüter tomoqrafiyası

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

431) Kazeoz pnevmoniya göstərilənlərdən hansı ilə xarakterizə olunur?

A) VMB ifrazının nadir hallarda olması ilə
B) VMB ifrazının çoxlu miqdarda olması ilə
C) VMB ifrazının azlığı ilə
D) VMB –nin tapılmaması ilə
E) VMB –nin bir dəfə ifrazı ilə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

432) Tuberkulyoma hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur?

A) Ağciyərin xoş xassəli şişləri
B) Sayılanların hamısı
C) Aspergilyoma
D) Exinokok
E) Ağciyər xərçəngi

Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

433) Kazeoz pnevmoniyanın effektiv müalicəsindən sonra adətən hansı kliniki forma əmələ gəlir?

A) Çox saylı tuberkulyomalar
B) Ocaqlı pnevmoskleroz
C) Qrup şəkilli ocaqlar
D) Pnevmosirroz sahəsi
E) Fibroz-kavernoz vərəm

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

434) Sadalanlardan hansı tuberkulyoma zamanı vərəm prosesinin fəallaşmasını göstərir?

A) Tuberkulyomanın ətrafında perifokal reaksiyanın əmələ gəlməsi

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Tuberkulyomanın dağılması
C) İntoksikasiya simptomlarının əmələ gəlməsi
D) Bəlğəmdə vərəm mikobakteriyaların aşkar olunması
E) Bütün sayılanlar

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

435) Tuberkulyoma nəyə deyilir?

A) Kalsinat
B) Dairəvi infiltrat
C) İçərisi jeleyəbənzər maye ilə dolu törəmə
D) Qamartoma
E) 15 mm və daha böyük diametrdə kapsula ilə əhatə olunmuş kazeoz nekrotik fokus

Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

436) Ağciyər tuberkuloması adətən hansı xəstəliklərlə differensasiya edilə bilər?

A) Aspergilyoma ilə
B) Bütün cavablar doğrudur
C) Dolmuş kistalar ilə
D) Periferik xərçəng ilə
E) Qamartoxondroma ilə

Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

437) Subplevral yerləşmiş şarabənzər kölgəlik aşkar olunarkən diaqnozu verifikasiya etmək üçün məqsədəuyğun müayinə nə sayılır?

A) Mediastinoskopiya
B) Bütün sadalananlar
C) Kateter biopsiyası
D) Ağciyərin transtorokal punksion biopsiyası
E) Bronxoskopik biopsiya

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

438) Kavernoz vərəmin formalaşmasında aşağıdakılardan hansı istisnadır?

A) Dağılma mərhələsində olan infiltrativ ağciyər vərəmi
B) Dağılma mərhələsində olan səpələnmiş ağciyər vərəmi

Sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Dağılma mərhələsində olan ocaqlı ağciyər vərəmi
D) Dağılma mərhələsində olan tuberkuloma
E) Fibroz-kavernoz ağciyər vərəmi

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

439) Kavernoz vərəmin müalicəsindən sonra hansı variant progresivləşmə hesab olunur?

A) Kavernanın fibroz kavernoz vərəmə keçməsi
B) Kavernanın çapıqlaşaraq çapıq ocağı əmələ gətirməsi
C) Kavernanın ikincili kistaya keçidi
D) Sadalanların heç biri
E) Kavernanın dolaraq tuberkuloma əmələ gətirməsi

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

440) Kavernoz vərəm hansı xəstəliklərlə diferensasiya olunur?

A) Bronxoektaz ilə
B) Bütün sayılanlarla
C) Havalı kista ilə
D) Xroniki abses ilə
E) Dağılma fazasında olan vərəmin istənilən forması ilə

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

441) Vərəmin kavernoz forması ilə xərçəngin dağılmış formasının differensiasiyası hansı dəqiq metodlarla aparılır?

A) Bakterioloji və sitohistoloji, rentgenoloji
B) "Ex juvantibus" müalicə və dinamik müşahidələr
C) Rentgenoloji
D) Biokimyəvi və immunoloji
E) Bronxoloji

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

442) "Təzə" destruktiv prosesin fibroz-kavernoz vərəmə keçidini təmin edən faktorlar hansılardır?

A) Bütün cavablar doğrudur

ilk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Xəstələrə təyin olunan müalicənin düzgün olmaması
C) Ciddi yanaşı xəstəliklər
D) Xəstələrə təyin olunan dərmanlarının keyfiyyətsizliyi
E) Xəstələrin dərmanlara qarşı dözümsüzlüyü və VMB –nin dərmanlara davamlı olması

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

443) Fibroz-kavernoz vərəmin formalaşmasında hansı kliniki forma istisna təşkil edir?

A) Ocaqlı vərəmin dağılma mərhələsi
B) Kavernoz vərəm
C) Səpələnmiş vərəmin dağılma mərhələsi
D) Ocaqlı vərəmin sorulma mərhələsi
E) İnfiltrativ vərəm

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

444) Fibroz kavernoz vərəm son mərhələdə hansı kliniki formaya keçə bilər?

A) İnfiltrativ vərəm
B) Sadalanların heç biri
C) Ocaqlı vərəm
D) Sirrotik vərəm
E) Kavernoz vərəm

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

445) Fibroz-kavernoz ağciyər vərəminin ən çox təsadüf edilən spesifik ağırlaşmaları hansılardır?

A) Dəri vərəmi
B) Sümük oynaq sisteminin vərəmi
C) Bağırsaq vərəmi
D) Bronxların vərəmi (baş, pay, seqmentar bronxlar)
E) Gözün vərəmi

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

446) Aşağıda göstərilən hansı kliniki formada kütləvi mikobakteriya ifrazı daha çox müşahidə olunur?

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) İnfiltrativ vərəmin dağılma mərhələsində
B) Eksudativ plevrit zamanı
C) İnfiltrativ vərəmdə
D) Ocaqlı vərəmdə
E) Kavernoz vərəmdə

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

447) Fibroz-kavernoz vərəmli xəstələrin kimyəvi terapiyasının nəticəsiz qalmasının əsas səbəbləri hansılardır?

A) Kazeoz nekrozlu kavernanın olması
B) Kavernanın divarında kobud fibroz kapsulun olması
C) Sadalananların hamısı
D) Dərman preparatlarının keyfiyyətsizliyi
E) VMB-nin dərman preparatlarına davamlı olması və xəstələrdə spesifik preparatlara qarşı dözümsüzlük

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

448) Fibroz- kavernoz vərəmli xəstələrin cərrahi müdaxiləsinin effektliliyini artıran səbəblər hansılardır?

A) Ağciyər rezeksiyası (lobektomiya, pulmonektomiya) ilə yanaşı torokoplastika və kavernotomiya əməlliyatlarının aparılması
B) Yanaşı xəstəliklərin müalicəsi
C) Bütün sayılanlar
D) Xroniki ağciyər, ürək və tənəffüs çatmamazlığının müalicəsi
E) Cərrahi əməliyyatdan əvəllki spesifik kimyəvi terapiya

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

449) Fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin ölümünə səbəb nə olur?

A) Sadalananların hamısı
B) Ağciyər vərəminin proqressivləşməsi
C) Ağciyər qanaxması və daxili orqanların amiloidozu
D) Ağciyər-ürək çatışmazlığı və tromboemboliya xəstəliyi
E) Ağciyərdən kənar üzvlərin vərəminin qoşulması (meningit və s.)

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

450) Sirrotik vərəm hansı halda formalaşa bilməz?

A) Bronxların vərəmi ilə fəsadlaşmış ocaqlı və infiltrativ ağciyər vərəmindən sonra
B) Bronxların vərəmi ilə fəsadlaşmış döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmindən sonra
C) Plevranın vərəmindən sonra
D) Metodik təlimata uyğun müalicə olunan ocaqlı və infiltrativ vərəmdən sonra
E) Kazeoz pnevmoniya və fibroz kavernoz ağciyər vərəmindən sonra

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

451) Sirrotik vərəmin formalaşmamasında rolu olan faktorlar hansılardır?

A) Xəstəliyin uzun müddət sürməsi
B) Düzgün metodik təlimata uyğun spesifik müalicənin aparılması
C) Bronx ağacının zədələnməsi
D) Müalicədəki nöqsanlar
E) Ağciyərin müalicəvi kollapsının tətbiqi

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

452) Vərəmdən sonra formalaşan sirrotik qalıqlarla sirrotik vərəmin fərqi hansıdır?

A) Patoloji prosesin strukturunda ocaqlı dəyişikliklərin aktivliyini saxlanması
B) Ağciyərlərdə dağılma boşluqlarının olması
C) Spesifik sirrotik qalığın aktivliyinin sönməsi
D) Sirrozun daha massiv olması və fəallığının saxlanılması
E) Vərəm prosesinin fəallığının saxlanılması

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

453) Kavernoz vərəm üçün cərrahi müdaxiləyə hansı hal əks göstərişdir?

A) Bütün sadalananlar
B) Ürək damar çatmamazlığı
C) Ağciyər ürək çatmamazlığı
D) Mikobakteriya ifrazının davam etməsi
E) Prosesin iki tərəfli və yayılmış olması

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinif.az Şəxsi istifadə üçün

454) Sirrotik vərəm üçün hansı hal fəsad sayılmır?

A) Göbələk infeksiyaları
B) Tənəffüs və ürək çatmamazlığı
C) Parazitar və virus infeksiyaları
D) Qanhayxırma və ağciyər qanaxmaları
E) Daxili orqanların amiloidozu

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

455) Torokoplastika əməliyyatı nə vaxt aparılır?

A) Kaverna orta payda yerləşdikdə
B) Kaverna subplevral yerləşdikdə
C) Miliar vərəmdə
D) Kaverna ağciyərin kökünə yaxın yerləşdikdə
E) Səpələnmiş ağciyərinin çox saylı destruksiyaları olduqda

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

456) Vərəm iltihabı zamanı birləşdirici toxumanın həddən artıq çox inkişaf etməsinin qarşısını nə alır?

A) Xəstəliyin vaxtında aşkar edilməsi
B) Ağciyər vərəmin və döşqəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin erkən diaqnostikası və fəsadlaşmanın qarşısının alınması
C) Vərəmin kompleks müalicəsinin o cümlədən patogenetik müalicənin rasional təşkili
D) Yanaşı xəstəliklərin aşkarı və vaxtında müalicə edilməsi
E) Bütün cavablar doğrudur

Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

457) Sirrotik vərəm zamanı cərrahi əməliyyata hansı halda göstəriş vardır?

A) Ağır tənəffüs və ürək –damar çatmamazlığın olmaması
B) Bir tərəfli sirrotik dəyişikliklər
C) Bütün cavablar düzgündür
D) Birtərəfli və nisbətən məhdud, bronxoektazlı proseslərdə
E) Cavan və orta yaş

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

458) Vərəm infeksiyasının plevraya yayılmasında hansı mexanizm istisna təşkil edir?

A) Ağciyər tamlığının pozulması ilə əlaqədar
B) Limfogen və hematogen
C) Limfogen
D) Hematogen
E) Bronxogen

Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

459) Vərəm plevriti zamanı hansı morfoloji dəyişikliklər müşahidə oluna bilər?

A) Spesifik iltihab
B) Kazeoz nekroz
C) Vərəm qabarcıqları
D) İltihabın ekssudasiya mərhələsi
E) Bütün sayılanlar

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

460) Fibrinoz plevrit üçün hansı klinik simptomlar xarakterdir?

A) Döş qəfəsində tənəffüs zamanı ağrılar
B) Sadalananların hamısı
C) Tənginəfəslik
D) Döş qəfəsində daimi ağrılar
E) Tənəffüsün çətinləşməsi

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

461) Fibrinoz plevrit zamanı hansı fizikal simptomlar aşkar olunur?

A) Yaş xırıltıların eşidilməsi
B) Perkutor səsin timpanit olması
C) Səs titrəməsinin qüvvətlənməsi
D) Tənəffüsün güclənməsi
E) Perkutor səsin qısalması və tənəffüsün zəifləməsi

Sınaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

462) Ekssudativ plevritlərdə bitişmələrin qarşısını almaq üçün hansı qlükokortikoid dərmanın plevraya yeridilməsi məsləhətdir?

A) Deksametazon
B) Prednizalon
C) Heç biri
D) Hidrokortizon
E) Metapril

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

463) Ekssudativ plevrit zamanı rentgenoloji olaraq hansı dəyişikliklər təyin olunur?

A) Ağciyərlərdəki patologiyanın xarakteri və plevraya yayılması
B) Yığılmış ekssudatın miqdarı
C) Bütün sayılanlar
D) Orta divar aralığı orqanlarının əks tərəfə yerini dəyişməsi
E) Plevral birləşmələrin olması və ya olmaması

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

464) Plevranın massiv sirrozu zamanı effektiv müalicə taktikası hansıdır?

A) Plevroektomiya
B) Tək izoniazidlə daimi müalicə
C) Residiv əleyhinə müalicə
D) 4 spesifik dərmanın kombinasiyası ilə uzun müddətli müalicə
E) Müalicə etmək lazım deyil

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

465) Ekssudatın qanlı olması hansı xəstəlik haqqında düşünməyə vadar edir?

A) Xərçəng
B) Diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur
C) Plevritin xroniki və ya uzanmış mərhələyə keçməsi
D) Vərəm etiologiyalı plevrit
E) Plevritin iltihabi mənşəli olması

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

466) 30 yaşınadək xəstələrdə plevritin hansı forması daha çox müşahidə olunur?

A) Metapnevmonik plevrit
B) Bütün sayılanlar
C) Vərəm plevriti
D) Ürək damar patologiyası ilə əlaqədar
E) Şiş mənşəli plevrit

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

467) Ekssudativ plevritlərdə eksudatın evakuasiyasının əhəmiyyəti nədədir?

A) Heç bir əhəmiyyət kəsb etmir
B) Evakuasiya spontan pnevmatoraksın qarşısını alır
C) Yalnız müalicəvi əhəmiyyət kəsb edir
D) Yalnız diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir
E) Diaqnostik və müalicəvi əhəmiyyəti var

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

468) Kisələşmiş plevrit zamanı punksiyanın aparılması üçün hansı müayinə metodu tətbiq olunmalıdır?

A) Ağciyərlərin arxa proyeksiyada rentgenoqramması
B) Sayılanların heç biri
C) Ağciyərlərin ön rentgenoqramması
D) Yan proyeksiyada çəkilmiş rentgenoqrafiya, USM
E) Perkussiya

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

469) Yuxarı tənəffüs yollarının ağız qırtlaq hissəsində vərəm xəstəliyi ən çox hansı hissəni zədələyir?

A) Dilin selikli qişasını
B) Udlağın selikli qişasını
C) Ağız qırtlaq hissəsini
D) Qırtlağın selikli qişasını
E) Badamcıqları

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

470) Qırtlağın vərəmi ən çox hansı kliniki formada müşahidə olunur?

A) İnfiltrativ vərəm
B) Döşdaxili limfa düyünlərinin vərəmi
C) Vərəm intoksikasiyası
D) İlkin vərəm kompleksi
E) Ocaqlı vərəm

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

471) Qırtlağın vərəmi hansı kliniki formanın ağırlaşması kimi müşahidə oluna bilər?

A) Ocaqlı vərəmdə
B) İlkin vərəm kompleksində
C) Hematogen səpələnmiş vərəmdə
D) Vərəm plevriti
E) Döşdaxili limfa düyünlərinin vərəmində

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

472) İri bronxların vərəmə yoluxması hansı yolla baş verir?

A) Hemotogen yolla
B) Təmas yolu ilə
C) Bütün sayılanlarla
D) Limfogen yolla
E) Bəlğəm vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

473) Ağciyərdə rentgenoloji olaraq spesifik dəyişiklik olmadan 2-3 dəfə mikroskopik metodla mikobakteriyanın tapılması hansı halda müşahidə olunur?

A) Belə hal ola bilməz
B) Plevrada kalsinatlaşmış ocaq olanda
C) Bronxun vərəmində
D) Ağız boşluğunun vərəmində
E) Perisissuritdə

Sinaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

474) Divaralığının xəstə tərəfə yerini dəyişməsi “Vintil” simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Ocaqlı vərəmi
B) İnfiltrativ vərəm
C) Abses
D) Eksudativ plevrit
E) Ağciyərin blastoması

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

475) Bronxun vərəmi ilə bronxun qeyri-spesifik dəyişikliyini necə fərqləndirmək olar?

A) Qanın müayinəsi
B) Rentgenoqramma və tomoqramma
C) 2-3 dəfə bronxun möhtəviyyatının sadə mikroskopiyası, flotasiya və kultural müayinəsi
D) Qanın qeyri –spesifik və spesifik floraya görə əkilməsi
E) İmmunoloji olaraq hüceyrə zəncirinin çatışmazlığı

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

476) Yaşlı və qoca adamlarda ağciyər vərəmi ən çox hansı payda müşahidə olunur?

A) Yuxarı payda iki seqmentdə
B) Ağciyərin bir və ya hər ikisində aşağı paylarda
C) Sağda orta payda
D) Döş daxili limfa düyünlərində
E) Yuxarı payda bir seqmentdə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

477) Amiloidozun yaranma səbəbləri hansılardır?

A) Uzun müddət aparılan kimyəvi terapiyanın effektsizliyi
B) Xəstəliyin xroniki gedişə malik olması
C) Çoxsaylı destruksiyaların yaranması

Sinir.az öğrənişsiz istifadə üçün

D) Kazeoz pnevmonik formanın inkişafı
E) Bütün sayılanlar

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

478) Amiloidoz ən çox vərəmin hansı kliniki formalarında inkişaf edir?

A) İnfiltrativ vərəmin dağılma mərhələsində
B) Fibroz kavernoz
C) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmində
D) İlkin vərəm kompleksində
E) Kavenoz vərəmdə

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

479) Amiloidoz hansı orqanı daha az zədələyir?

A) Qaraciyər
B) Ürək
C) Böyrək
D) Bağırsaqlar
E) Böyrək üstü vəzlər

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

480) Qanaxma ilə ağırlaşan təzə kiçik spesifik proseslər hansı metodla daha tez aşkarlanır?

A) Bronxoqrafiya
B) Bronxoskopiya
C) Subyektiv və obyektiv (perkussiya, auskultasiya və s.) metodları ilə
D) İcmal rentgenoqramma
E) Angioqrafiya

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

481) Vərəm xəstəliyi nəticəsində yaranmış xroniki ağciyər ürək çatışmazlığın müalicəsi üçün göstərilən metodlardan hansı istisna təşkil edir?

A) Sidik qovucu
B) Bronxolitiklər, qlükokortikoidlər
C) Oksigen terapiya

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

D) Ümumi qüvvətləndirici və intoksikasiya əleyhinə müalicə
E) Adekvat antibakterial müalicə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

482) Xroniki ağciyər ürək çatışmazlığının qarşısını almaqda nə etmək lazımdır?

A) Bronx ağciyər xəstəliklərinin profilaktikası
B) Xroniki ağciyər xəstələrinin vaxtaşırı müşahidəsi
C) Xəstəyə daim immunostimulyatorların təyini
D) Xroniki ağciyər xəstələrinin dispanser müşahidəsi
E) Məqsədyönlü əmək terapiyası

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

483) Vərəmli xəstələrdə dərmanlara qarşı qazanılmış davamlılığın yaranmasının səbəbi nədir?
A) Spesifik dərmanların keyfiyyətsizliyi
B) İlkin vərəmin yayılmış və destruktiv dəyişikliyə malik olması
C) Spesifik prosesin qeyri adekvat müalicəsi
D) Sadalananların hamısı
E) Xəstənin vaxtaşırı müalicəni dayandırması

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

484) Kliniki sağalma kriteriyalarına aşağıdakilardan hansı aid deyil?

A) Keçirilmiş vərəmdən sonra kiçik qalıq əlamətlərinin əmələ gəlməsi
B) Qalıq əlamətlərinin formalaşması, lakin mikobakteiya ifrazının davam etməsi
C) Keçirilmiş vərəmdən sonra böyük qalıq əlamətlərinin əmələ gəlməsi
D) Plevranın iri həcmli (ölçüsü 1 sm –dən böyük) birişmələrin baş verməsi
E) Uzun müddət və davamlı şəkildə mikobakteriyalar ifrazının kəsilməsi

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

485) Vərəmin kliniki sağalması zamanı əmələ gələn qalıq əlamətləri uzun müddət müşahidə olunarkən hansı dəyişikliklər baş verə bilər?

A) Yanaşı olaraq qeyri iltihabi xəstəliklər qoşula bilər
B) Yenidən fəallaşa bilər

Sinir.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Həcmi arta bilər
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Dəyişiksiz qala bilər

Ədəbiyyat: H.M.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

486) Keçirilmiş vərəm xəstəliyindən sonra formalaşan qalığın aktivləşib yoluxucu forma olduğunu göstərən ən inandırıcı metod hansıdır?

A) Qeyri spesifik müalicə fonunda rentgenoloji dinamika
B) Qanın ümumi müayinəsi
C) Auskultasiya
D) Molekulyar-genetik müayinə və bakteriskopiya
E) Qalıq əlamətlərinin böyüməsi

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

487) Spesifik prosesin aktivliyini təyin etmək üçün daha inandırıcı müayinə metodu hansıdır?

A) Qanın müayinəsi
B) Angioqrafiya
C) Obyektiv müayinə metodları
D) Subyektiv müayinə metodları
E) Sito-histoloji, molekulyar-genetik, bakterioskopik, kultural üsullarla patoloji materialın müayinəsi

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

488) Qanaxması olan xəstə bir dəfəyə 500-600 ml qan itirərsə hansı ağırlaşmalar onun həyatını təhlükə altına qoyur?

A) Asfiksiya törədən qan laxtaları ilə iri bronxların tutulması
B) Huşun itməsi və yaddaşın pozulması
C) Yuxunun pozulması
D) Anemiya
E) İştahın pozulması

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

489) Spontan pnevmotoraks üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?

A) Total ekssudativ plevrit
B) Miokardın infaktı
C) Qabırğaarası nevralgiya
D) Stenokardiya
E) İshal, meteorizm, kəmərləyici ağrı

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

490) Spontan pnevmotoraks ağciyər xəstəliklərinin hansı kliniki formalarında daha çox baş verir?

A) Stafilokkok pnevmoniyası
B) Sadalananların hamısı
C) Exinakokk kistası
D) Kazeoz-pnevmoniya
E) Ağciyərin kistaları

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

491) Spontan pnevmotoraksda ölümün baş verməsinə hansı hal səbəb ola bilməz?

A) Divararalığı üzvlərinin yerini dəyişməsi nəticəsində damar dəstəsinin sıxılması və hemodinamikanın pozulması
B) Trombemboliya
C) Xəstənin spesifik dərmanlardan qeyri adekvat istifadə etməsi
D) Ağciyər-ürək çatışmazlığı və tromboz
E) Ağciyərin kökə sıxılaraq ağciyər arteriyasını sıxması

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

492) Vərəm mikobakteriyalarının massiv artması və ocaqda (ocaqlarda) kəskin ekssudativ reaksiya ilə müşaiyət olunan ağciyər vərəmi formaları necə aşkar oluna bilər?

A) Sadalananların hamısı
B) Ümumi tibb şəbəkəsinə müraciət zamanı aparılan minimum müayinə metodları ilə
C) Vərəm əleyhinə dispanserə müraciət zamanı
D) Flüoroqrafik müayinə ilə
E) Laborator müayinə ilə

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

493) Döş qəfəsinin perkussiyası ilə hansı diaqnozu müəyyənləşdirmək olar?

A) Ocaqlı vərəm
B) Pnevmoniya
C) Bronxoektaziya xəstəliyi
D) Kəskin bronxit
E) Spontan pnevmotoraks

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

494) Plevral boşluqda havanın olmasını hansı müayinə ilə aşkar etmək olar?

A) Döş qəfəsinin perkussiyası ilə
B) Ağciyərlərin auskultasiyası ilə
C) Bütün sadalananlar
D) Rentgen müayinəsi ilə
E) Ağciyərlər üzərində səs titrəməsinin təyini ilə

Ədəbiyyat: A.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

495) Auskultasiya zamanı hansı kliniki formada amforik tənəffüs eşidilir?

A) İnfiltrativ vərəmdə
B) Ocaqlı vərəmdə
C) Səpələnmiş vərəmdə
D) Fibroz kavernoz vərəmdə
E) Plevranın empiemasında

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

496) Vərəmin kliniki əlamətləri olmayan hansı forması rentgenoloji metodla daha çox aşkarlanır?

A) Fibroz kavernoz ağciyər vərəmi
B) Ocaqlı ağciyər vərəmi
C) Sirrotik ağciyər vərəmi
D) Səpələnmiş ağciyər vərəmi
E) İnfiltrativ ağciyər vərəmi

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: М.И.Перельман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

497) Yaşlı insanlarda vərəm necə aşkar olur?

A) Seksion müayinələr zamanı
B) Xəstəliyin kliniki əlamətləri ilə əlaqədar tibbi yardım üçün müraciət zamamı
C) Əhalinin kütləvi flüoroqrafik müayinəsi zamanı
D) Biopsiya materiallarına əsasən (instrumental müayinə, əməliyyatlar)
E) Bütün sayılanların vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

498) Vərəm mikobakteriyalarını aşkar etmək üçün hansı materiallar müainə edilə bilər?

A) Qan, onurğa beyin mayesi
B) Bütün sayılanlar
C) Bəlğəm, bronx möhtəviyyatı
D) Qapalı boşluqlardan götürülən punktatlar, bioptatlar
E) Sidik, fistullardan götürülmüş irinli möhtəviyyat

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

499) PZR vasitəsi ilə vərəm mikobakteriyalarının aşkarı hansı müayinə metodları sırasına aiddir?

A) Genotipik müayinələr
B) Fenotipik müayinələr
C) Mikroskopik müayinələr
D) Sadalanların heç birinə
E) İmmun ferment aktivliyinin təyini müayinəsi

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

500) Xəstədə mikobakteriyanın ifrazının tapılması hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vacibdir?

A) Xəstənin effektiv müalicəsi
B) Ocaqda dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
C) Xəstənin təcili hospitalizasiyası
D) Ocaqların qruplaşdırılması
E) Bütün sayılanlar

sınaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988.
Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün