

## Uşaq və yeniyetmə psixiatriyası

**1) Əqli geriliyi (MR) olan şəxsləri tədqiq edən genişmiqyaslı epidemioloji araşdırmaların nəticələri aşağıdakıların HAMISINI göstərir, İSTİSNA olmaqla,:**

- A) Qızlardan daha çox oğlanlarda MR mövcuddur
- B) MR -nin pik dərəcəsi təxminən 10 - 14 ildir
- C) Yetkinlik dövründə MR dərəcələri sabit qalır
- D) Aşağı sosial-iqtisadi statuslu şəxslər (SES) gözləniləndən yüksək MR nisbətlerini göstərir
- E) İlk illərdə MR dərəcələri ümumiyyətlə aşağı olur

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**2) Hazırda aşağıdakı öyrənmə pozuntularından (LD) hansının LD üçün neyrobioloji bazanı dəstəkləmək üçün müvafiq genlər, beyin strukturu və beyin funksiyası ilə bağlı ən çox araşdırması aparılır?**

- A) Travmatik beyin zədəsindən yaranan LD
- B) Xüsusi riyaziyyat pozuntusu
- C) Xüsusi oxuma pozuntusu
- D) Emosional pozğunluqdan sonra yaranan LD

E) Yazılı ifadənin pozulması

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**3) İlk tibbi yardımda olan pediatrik xəstələrin təxminən neçə faizində psixi sağlamlıq problemləri var?**

A) 30 %

B) 5 %

C) 10 %

D) 50 %

E) 20 %

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**4) Epilepsiya ilə bağlı aşağıdakılardan hansı dəqiqdir?**

A) Epilepsiya uşaqların bir qrupu üçün intellekt əmsalının (IQ) azalması ilə əlaqələndirilə bilər.

B) Epilepsiya xəstəsi olan şagirdlər nəzarət qruplarından daha tez-tez məktəbdə saxlanılır

C) Ailə faktorları epilepsiya faktorlarından psixopatologiyanın daha güclü proqnozlaşdırıcı kimi görünür

D) Epilepsiyalı uşaqlar oxuma, yazma və riyaziyyatda nəzarət qruplarında olduğundan daha çox çətinliklər yaşayırlar

E) Yuxarıda göstərilənlərin hamısı

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**5) Bir kohort tədqiqatında depressiyaya məruz qalan gənc yetkinlərdə aşağıdakılardan hansının olduğu aşkar edilmişdir?**

A) Serotonin daşıyıcı geninin uzun alleli üçün homozigotlu

B) Serotonin daşıyıcı geninin uzun alleli və mənfi həyat hadisələri üçün homozigotluq

C) Yuxarıda göstərilənlərin heç biri

D) Serotonin daşıyıcı geninin qısa alleli üçün homozigotluq

E) Serotonin daşıyıcı geninin qısa alleli və mənfi həyat hadisələri üçün homozigotluq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**6) Aşağıdakılardan hansı selektiv serotoninin geri alınması inhibitorlarının (SSRI) hipotenzləşdirilmiş təsir mexanizmini təsvir edir?**

A) Yeni sintez edilmiş dopaminin sərbəst buraxılmasını seçici şəkildə təşviq edir, eyni zamanda daşıyıcıda dopaminin geri alınmasını bloklayır.

- B) Prefrontal korteksdə serotoninin sərbəst buraxılmasını təşviq edir
- C) Serotoninin postsinaptik neyrona qayıtmasına mane olur
- D) Saxlanmış dopaminin sərbəst buraxılmasını təşviq edir və presinaptik dopamin daşıyıcı sahələrində dopaminin geri qaytarılmasını bloklayır.
- E) Serotoninin presinaptik neyrona qaytarılmasına mane olur

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**7) Aşağıdakı dərmanlardan hansı bipolyar pozğunluğu olan yeniyetmələrdə kəskin depressiya zamanı valproat ilə müqayisədə statistik əhəmiyyətli üstünlük nümayiş etdirmişdir?**

- A) Sertralin
- B) Ketiapin
- C) Mirtazapin
- D) Risperdal
- E) Venlafaksin

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**8) Psixopatoloji pozğunluqların öyrənilməsində tək foton emissiya kompüter tomoqrafiyasından (SPECT) ən çox niyə istifadə olunur?**

- A) Ađ maddə traktlarının xüsusiyyəti
- B) Beynin müxtəlif stimullara elektrik analizi
- C) Yuxarıda göstərilənlərin heç biri
- D) Beyin strukturlarının həcmi analizi
- E) Regional beyin qan axınının ölçülməsi

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**9) Körpələrin əksəriyyətində yad insan təşvişi hansı yaşda yaranmağa başlayır və hansı yaşda maksimum həddə çatır?**

- A) 8 ay, maksimum 18 aylıqda
- B) 6 ay, maksimum 24 aylıqda
- C) Doğulan kimi
- D) 8 ay, maksimum 24 aylıqda
- E) 6 ay, maksimum 18 aylıqda

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**10) Ümumilikdə əhali arasında, sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə gənc qadınlarda anoreksiya nevrozunun təxmin edilən yayılması:**

- A) 0.3 %
- B) 3 %
- C) 40%
- D) 0.03 %
- E) 30 %

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**11) Trisiklik antidepressantlar arasında uşaqlarda enurezi müalicə etmək üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?**

- A) Komipramin
- B) Nortriptilin
- C) Amitriptilin
- D) Dezipramin
- E) İmipramin

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**12) Aşağıdakı ailə terapiyası modellərindən hansı xüsusilə ailə problemlərinə və xroniki davranış pozğunluğu olan uşaqlara aiddir?**

- A) Struktur
- B) Davranış
- C) Strateji
- D) Psixodinamik
- E) Təcrübəli

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**13) “İnkişaf edən ağıl nəzəriyyəsi” aşağıdakılara istinad edir:**

- A) Yuxarıda göstərilənlərin hamısı
- B) Yuxarıda göstərilənlərin heç biri
- C) Başqalarının davranış və sözlərini onların hiss və düşüncələrinin bir hissəsi kimi şərh etmək
- D) Dünyanın həm fiziki, həm də qeyri-fiziki planda tanınması, əsasən düşüncələrin, hisslərin və inancların görünməz və ya xəyali hallarıdır.
- E) Öz düşüncələrinin, inanclarının və hisslərinin özünə məxsus olduğunu və başqalarının fərqli hiss edə və ya inana biləcəyini başa düşmək bacarığı

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**14) Aşağıdakıların HAMISI otosomal dominant xəstəliklərdir, İSTİSNA:**

- A) Parkinson xəstəliyi
- B) Miotonik distrofiya
- C) Fraçile X -xromosom sindromu (əqli gerilik sindromu)
- D) Hantinqton xəstəliyi
- E) Neyrofibromatoz

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**15) Uşaqlarda xlorpromazinin venadaxili yeridilməsi zamanı hansı mənfi hadisənin baş verməsi səbəbindən diqqət etmək lazımdır?**

- A) Tutmalar
- B) Hipotoniya
- C) Kəskin distonik reaksiya
- D) Ekstrapiramidal simptomlar
- E) Neyroleptik bədxassəli sindrom

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası



**16) Aşağıdakılardan hansı neyropsixoloji qiymətləndirmənin geniş məqsədlərini əhatə edir?**

- A) Uşağın proqnozunun tək göstəricisidir
- B) Sadəcə diaqnostik alət kimi xidmət edir
- C) Müdaxilə üçün strategiyaları planlamağa kömək edir
- D) A və C
- E) Uşağın daha dolğun təsvirini və anlayışını təmin edir

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**17) Yeniyetmələrdə fiziki, cinsi, sosial, psixoloji və intellektual müstəqillik üçün sıx bir səy var. Həyatı məhdudlaşdıran hansı faktorlar bu inkişaf prosesini alt-üst edir?**

- A) Təhsilin dayandırılması
- B) Həmyaşdlarından təcrid olunma
- C) Yuxarıdakıların hamısı
- D) Fiziki hərəkətsizlik və asılılıq
- E) Psixi xəstəliklər

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**18) Aşağıdakı ətraf mühit faktorlarının HAMISI dil gecikməsi riski ilə əlaqəli görünür, istisna aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) İntrauterin dövəmdə ana namizədinin stressli həyatı
- B) Təkrarlanan otitis media
- C) Xaotik ev mühiti
- D) Daha kiçik ailə
- E) Aşağı SES

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**19) İnkişaf dövründə bəzi ilkin təzahürlər sonradan sərhədi şəxsiyyət pozğunluğu inkişaf edən uşaqlarda aydın görünür. Bunlara aşağıdakıların HAMISI daxil ola bilər, istisna olmaqla:**

- A) Sakitləşdirmək çətindir
- B) Yüksək aktivlik
- C) Zəif uyğunlaşma qabiliyyəti
- D) Qəribə nitq
- E) Çətin temperament

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**20) On doqquzuncu əsrin sonlarında qabaqcıl psixoloq olan G. Stanley Hall uşaq inkişafı və psixologiyası ilə bağlı müxtəlif araşdırmalarla məşğul olub və məlumat toplamaq üçün hansı üsuldan istifadə etməklə tanınıb?**

- A) Serum nümunələri
- B) Hipnoz
- C) Fokus qrupları
- D) Anketlər
- E) EEG

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**21) Aşağıdakılardan hansı uşaqlıq xərcəngi olan uşaqların valideynləri üçün ən çox rast gəlinən problemdir?**

- A) Somatizasiya pozğunluğu
- B) Posttravmatik stress pozğunluğu (PTSP)
- C) Qısa psixotik pozğunluq
- D) Münhauzen sindromu
- E) Alkoqoldan sui-istifadə

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**22) Rumıniyalı uşaqdar üzərində aparılan tədqiqatlara əsasən, reaktiv bağlanma pozğunluğu olan uşaqdarla inhibə edilmiş davranışların əhəmiyyətli dərəcədə azalması aşağıdakılardan hansına cavab idi?**

- A) Psixofarmakologiya
- B) Övladlığa götürülmə
- C) Rekrasional (recreational) terapiya
- D) Müəssisələrdə işçi-uşaq nisbətinin yüksək olması
- E) Xüsusi təhsilə qəbul

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**23) Aşağıdakı terminlərdən hansı “dərman orqanizmə nə edir” ifadəsini ən yaxşı izah edir?**

- A) Psixofarmakologiya
- B) Farmakologiya
- C) Farmakodinamika
- D) Yuxarıdakıların heç biri
- E) Farmakokinetika

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**24) Aşağıdakılardan hansı yeniyetmələrdə psixoaktiv maddədən istifadənin müalicəsi üçün istifadə olunan yanaşmadır?**

- A) İcma gücləndirici terapiya
- B) Həvəsləndirici müsahibə
- C) KDT, fərdi və qrup
- D) Multisistemik terapiya
- E) Yuxarıdakıların hamısı

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**25) Depressiyaya uğramış yeniyetmələrlə şəxsiyyətlərarası psixoterapiyada (IPT-A) müalicənin əvvəlində yeniyetmə və ailəsi ilə birlikdə müalicənin bitmə tarixi təyin edilir və yeniyetməyə müalicənin sonuna qədər qalan həftələrin sayı xatırladılır. IPT-A-nın effektivliyini qiymətləndirən klinik sınaqlar üçün seçilmiş vaxt çərçivəsi nədir?**

- A) 20 həftə
- B) 1 həftə
- C) 6 həftə
- D) 16 həftə
- E) 12 həftə

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**26) Uşağın kommunikativ fəaliyyətinin ilkin səviyyəsini təyin edərkən, geniş əsaslı batareyalardan daha çox, müəyyən funksiya sahələrinə dar şəkildə diqqət yetirən standartlaşdırılmış testlərdən istifadə olunur. Aşağıdakıların HAMISI, fokuslanmış qiymətləndirmə üçün standartlaşdırılmış testlərin nümunələridir, İSTİSNA:**

- A) Pibodi ,əkil üzrə Lüğət Testi - 3-cü nəşr
- B) Yazılı Dil Testi
- C) Praqmatik Dil Testi
- D) Hekayə dili testi
- E) Şifahi və yazılı dil səviyyələri

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**27) Aşağıdakı ifadəni tamamlayın. Qızlarda yetkinlik...**

- A) orta hesabla 11-13 yaşlarında başlayır
- B) 18 yaşdan sonra başlayır
- C) oğlanlarda yetkinlik dövründən sonra başlayır
- D) oğlanlar üçün orta başlanğıcdan təxminən 2 il əvvəl başlayır
- E) başlanğıcdan sona qədər təxminən 1-2 il çəkir

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**28) Aşağıdakılardan hansı uşaqlıqda başlayan şizofreniya üçün risk faktoru DEYİL?**

- A) Ailəvi neyrokoqnitiv çatışmazlıqlar
- B) Ailədə yayılan inkişaf pozğunluqları
- C) Atanın yaşı
- D) Ailəvi şizofreniya spektri pozğunluqları
- E) Ailənin əhval-ruhiyyəsinin pozulması

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**29) Ədəbiyyat selektiv mutizmin hansı müalicəsini daha çox dəstəkləyir?**

- A) Nitq terapiyası
- B) KDT
- C) Anksiyolitik dərmanlar
- D) Psixodinamik terapiya
- E) Davranışın modifikasiyası

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**30) OKP xəstələrinin ailə hekayəsində hansı problemlər mövcud ola bilər?**

- A) Tourette pozğunluğu
- B) Tiklər
- C) Yuxarıda göstərilənlərin hamısı
- D) Digər narahatlıq pozğunluqları
- E) OCD

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**31) Aşağıdakılardan hansı amfetaminlərin hipotenzləşdirilmiş təsir mexanizmini təsvir edir?**

- A) Saxlanmış dopaminin sərbəst buraxılmasını təşviq edir və presinaptik dopamin daşıyıcı sahələrində dopaminin geri alınmasını bloklayır.
- B) Prefrontal korteksdə serotoninin sərbəst buraxılmasını təşviq edir
- C) Serotonin daşıyıcısı tərəfindən serotoninin geri alınmasının seçici şəkildə qarşısını alır
- D) Striatumdakı norepinefrin reseptorlarını hədəf alır
- E) Yeni sintez edilmiş dopaminin sərbəst buraxılmasını seçici şəkildə təşviq edir, eyni zamanda daşıyıcıda dopaminin geri alınmasını bloklayır.



Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**32) Gey gənclərdə daxili homofobiya bir müdafiə mexanizmi kimi fəaliyyət göstərir və eqonun qaydalar və istəklər arasında mübarizəsindən irəli gəlir. O, bir sıra müdafiə üsullarından ibarətdir. Bunlara aşağıdakıların HAMISI daxildir, İSTİSNA:**

- A) Təcavüzkarla eyniləşdirmə
- B) Rasionallaşdırma
- C) Parçalanma
- D) Proyeksiya
- E) İnkər

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**33) Məlumatlı razılıq prosesində aşağıdakılardan hansı xəstə ilə müzakirə edilməlidir?**

- A) Aşağıdakıların hər birinin riskləri və nəticələri: təklif olunan müalicə, alternativ müalicə və heç bir müalicə
- B) Təklif olunan müalicənin xarakteri, məqsədi və faydaları və onun uğur qazanma ehtimalı
- C) Yuxarıdakıların hamısı

- D) Müalicə tələb edən xüsusiyyət və vəziyyət
- E) Təklif olunan müalicə ilə və müalicə olmadan proqnoz

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**34) Uşaqlıqda kəkələmənin geniş yayılması uşaqlar arasında aşağıdakı şəkildə ən yüksəkdir:**

- A) Doğum günü və ikinci doğum günü
- B) Altıncı doğum günü və səkkizinci ad günü
- C) Səkkizinci doğum günü və onuncu doğum günü
- D) İkinci doğum günü və dördüncü doğum günü
- E) Dördüncü doğum günü və altıncı doğum günü

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**35) Əkizlərdə aparılan anoreksiya tədqiqatlarında aşağıdakılardan hansı aşkar edilmişdir?**

- A) Yuxarıdakılardan hamısı yanlıştır
- B) Monozigotik uyğunluq dərəcələri əkiz olmayan bacı-qardaş uyğunluq dərəcələrinə bərabərdir
- C) Monozigotik uyğunluq dərəcələri dizigotik uyğunluq dərəcələrindən yüksəkdir

- D) Monozigotik uyğunluq dərəcələri dizigotik uyğunluq dərəcələrindən aşağıdır  
E) Monozigotik uyğunluq dərəcələri dizigotik uyğunluq dərəcələrinə bərabərdir

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**36) Aşağıdakılardan hansı Psixi Pozğunluqların Diaqnostik və Statistik Təlimatında (DSM) enkoprezin diaqnostik meyarlarına uyğun gəlir?**

- A) Ən azı 6 ay ərzində həftədə bir dəfə nəcisin uyğun olmayan yerlərə təkrar bulaşması  
B) Yuxarıdakıların heç biri  
C) Ən azı 3 ay ərzində ayda bir dəfə nəcisin uyğun olmayan yerlərə təkrar-təkrar bulaşması  
D) Ən azı 1 ay ərzində həftədə bir dəfə nəcisin uyğun olmayan yerlərə təkrar bulaşması  
E) Ən azı 3 ay ərzində həftədə bir dəfə nəcisin uyğun olmayan yerlərə təkrar-təkrar bulaşması

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**37) 1960-2000-ci illər arasında 6-11 yaşlı uşaqlar arasında artıq çəkiliyin yayılması aşağıdakı şəkildə artıb:**

- A) İyirmi qat

- B) On qat
- C) İkiqat
- D) Dörd qat
- E) Dəyişiklik yoxdur

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**38) Yeni yetmələrdə intihar düşüncəsinin tamamlanmış intihara nisbəti necədir?**

- A) 50:1
- B) 100:1
- C) 500:1
- D) 1,000:1
- E) 2,000:1

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**39) 1950-ci illərdə Money və həmkarlarının fiziki interseks vəziyyəti olan uşaqlar üzərində apardıqları araşdırmalar göstərdi ki, gender şəxsiyyətinin formalaşmasında əsas mərhələ aşağıdakı şəkildədir:**

- A) 24 və 36 aylıq

- B) 36 və 48 aylıq
- C) 18 və 36 aylıq
- D) 9 və 24 aylıq
- E) 9 və 18 aylıq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**40) Uşağın yuxu problemi ilə işləyərkən aşağıdakılardan hansına müraciət etmək daha vacibdir?**

- A) Onun təhlükəsizliyi
- B) Həddindən artıq stimullaşdırmadan qorunma
- C) Yuxarıda göstərilənlərin hamısı
- D) Onun rahatlığı
- E) Onun yuxu vərdislərinin müntəzəmliyi

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**41) Birinci sinfə qədəm qoyan uşaq, aşağıdakıların HAMISINI edə bilər, İSTİSNA :**

- A) Yemək və yatmaq vaxtı ilə bağlı ailə rituallarında və rutinlərində iştirak etmək
- B) Əlifbanı söyləmək

- C) Bədəni, qolları, ayaqları, əlləri və ayaqları olan detallı bir insan çəkmək
- D) Cəza və əzab baxımından doğru və yanlış müəyyənləşdirmək
- E) 20-dən yuxarı saymaq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**42) Tourette pozğunluğunda tikin şiddətinin azalması adətən neçə yaşda başa çatır?**

- A) 10 yaş
- B) Tik şiddəti xroniki olur
- C) 50 yaşdan gec
- D) Orta yaş
- E) 20 yaşdan tez

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**43) Ümumi dövriyyədə olan turşu dərmanlar plazma zülalına bağlandıqda hansı molekulla birləşir?**

- A) Trombositlər

- B) Albumin
- C) Yüksək sıxlıqlı lipoprotein
- D) Alfa-1 turşusu qlipoproteini
- E) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**44) PANDAS abbreviaturası (qısaltması) nə deməkdir?**

- A) Streptokok infeksiyası ilə əlaqəli uşaq autoimmun neyropsixi pozğunluq
- B) Ağ aylar mərkəzi-qərbi və cənub-qərbi Çindən gəlir
- C) Streptokok infeksiyası ilə əlaqəli psixi avtoimmun neyroanatomik pozğunluq
- D) Streptokok infeksiyası ilə əlaqəli psixiatrik anatomiyada pozğunluq
- E) Streptokok infeksiyası ilə əlaqəli uşaq nevroloji anatomiyada pozğunluq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**45) 1950 və 1960-cı illərdə autizmlı uşaqların müalicəsi üçün edilənlərə daxildir:**

- A) Xlorpromazin
- B) Soyuq vərəqli paketlər
- C) Uşaq və valideyn psixoterapiyası.

D) Elektrokonvulziv terapiya

E) İnsulin koması

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**46) Neçə üzvdən ibarət qruplar əksər terapevtik tapşırıqlar üçün idealdır?**

A) Heç bir əhəmiyyətli fərq yaratmır

B) 8-dən 10-a qədər

C) 4-dən 6-a qədər

D) 6-dan 8-ə qədər

E) 2-dən 4-ə qədər

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**47) Psixoanalitik nəzəriyyəçi Heinz Hartmann “muxtar” eqo funksiyalarını intrapsixik münaqişənin səbəb olduğu narahatlıqlara nisbətən davamlı olaraq konseptuallaşdırmışdır. Aşağıdakıların hamısı “muxtar” eqo funksiyalarına misaldır, İSTİSNA:**

A) Niyyyət

B) Hərəkətlilik

C) Məntiqi düşüncə



D) Müdafiə

E) Qavrama

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**48) Vineland Adaptiv Davranış Şkalası aşağıdakı sahələrin HAMISINI qiymətləndirir, İSTİSNA:**

A) Sosiallaşma

B) Gündəlik həyat bacarıqları

C) Ünsiyyət

D) Motor bacarıqları

E) Öyrənmə və yaddaş

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**49) Plazmada preparatın tarazlıq konsentrasiyası hansı nöqtədə əldə edilir?**

A) Qəbul edilən dərman miqdarı ilə xaric edilən dərman miqdarı arasında tarazlıq olduqda

B) Adətən preparatın plazmadan beş və ya altı yarımxaricolma dövründə

C) Adətən preparatın plazmadan iki və ya üç yarımxaricolma dövründə

D) Dərman qəbulundan 1 saat sonra

E) Plazma səviyyəsindən asılı olmayaraq dərmanın müəyyən edilmiş miqdarı vahid vaxtda xaric edildikdə

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**50) Aşağıdakıların hamısı boşanma zamanı uşaqlar üçün qoruyucu faktordur, İSTİSNA:**

A) Valideyn istiliyi

B) Kişi cinsi

C) Həmyaşıdların dəstəyi

D) Ən azı bir valideyn və ya baxıcı ilə yaxşı münasibət

E) Qardaşların dəstəyi

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**51) Uşaqlarda və yeniyetmələrdə yüngül və orta dərəcəli OKP üçün hansı variant ümumiyyətlə ilkin müdaxilə hesab olunur?**

A) Klomipramin

B) Paroksetin

C) Psixanaliz

D) Psixodinamik terapiya

E) KDT(CBT)

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**52) Valproat aşağıdakı dərmanlardan hansının qlükuronidləşməsinə (II faza metabolizmi) inhibə edir?**

A) Lamotrijin

B) Amoksapin

C) Ketiapin

D) Sertralin

E) Lorazepam

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**53) Psixi Bozuklukların Diaqnostik və Statistik Təlimatının (DSM-V) beşinci nəşrinin nəşr tarixi nə vaxtdır?**

A) 2014

B) 2000

C) 2010

D) 2013

E) 2001

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**54) Psixoanalitik düşüncədə aşağıdakı terminlərdən hansı intrapsixi status-kvodan yarışan və dəyişikliyin qarşısını almağa çalışan psixoloji mexanizmlərə aiddir?**

A) İşçi ittifaqı

B) Müqavimət

C) Eqonu müşahidə etmək

D) Əkstransferans

E) Köçürmə

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**55) Uşaqlıqda başlayan şizofreniyada görüntüləmə tədqiqatlarında aşağıdakılardan hansının ən az müşahidə olunma ehtimalı var?**

A) Bazal qanqliyaların həcmnin dəyişməsi

B) Beyincik həcmnin dəyişməsi

C) Yan mədəciyin həcmnin artması

D) Boz maddənin həcmninin dəyişməsi

E) Temporal lob strukturlarının həcmninin dəyişməsi

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**56) İnsanların 46 xromosomunda təxmini neçə gen var?**

A) 15.000

B) 100.000

C) 100

D) 35.000

E) 500

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**57) Deliriumla bağlı tədqiqatların nəzərdən keçirilməsi aşağıdakılardan HANSININ deliriumun əsas simptomu olduğunu göstərir:**

A) Diqqət çatışmazlığı

B) Qavrama pozuntuları

C) Yuxu-oyanma dövrünün pozulması

D) Düşüncə prosesinin anormallıqları

E) Yaddaş çatışmazlığı

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**58) Aşağıdakıların hamısının obsesiv-kompulsiv pozğunluğa (OKP) aidiyyəti vardır. İSTİSNA hansıdır?**

- A) Amiloid
- B) Qlutamat
- C) Noradrenalin
- D) Dofamin
- E) Serotonin

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**59) Amfetamin istifadəsi sidikdə nə qədər müddət sonraya qədər aşkar edilə bilər?**

- A) 3-5 gün
- B) 24 saatdan az
- C) 2 həftə
- D) 1 ay

E) 24-72 saat

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**60) Tədqiqatlar göstərir ki, müəllimlər atası olmayan ailələrdən olan oğlan və qızları sağlam ana-ata ailələrinin uşaqları ilə müqayisədə daha çox \_\_\_\_\_ kimi qiymətləndirirlər.**

A) xoşbəxt

B) diqqətsiz

C) aqressiv

D) səssiz

E) həyəcanlı

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**61) Sərhədi şəxsiyyət pozğunluğu tez-tez aşağıdakıların HANSI ilə müşayiət olunur?**

A) Yemək pozğunluqları

B) Şizotipal şəxsiyyət pozğunluğu

C) Posttravmatik stress pozğunluğu (TSSB)

D) Böyük depressiya

E) Maddə sui istifadəsi

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**62) Neyronun hansı hissəsi demək olar ki, bütün hüceyrə spesifik zülalların, o cümlədən daşıyıcıların, reseptorların və neurotransmitterlərin təsirləşməsinə cavabdehdir?**

- A) Dendritlər
- B) Sinir terminalı
- C) Axon
- D) Hüceyrə bədənini
- E) Sinaps

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**63) Epileptiform və qeyri-epileptiform tutma pozğunluqlarının müqayisəsində hansı doğrudur?**

- A) Qeyri-epileptik tutması olan uşaqlar epilepsiya şöbəsində yatırılıbsa, 50%-ə qədərində epileptik tutmalar da olacaq.
- B) Qeyri – epileptik tutmalar antikonvulsantlarla müalicə olunur
- C) Uşaqlarda qeyri-epileptik tutmaları əsl epilepsiyadan ayırmaq çətin ola bilər



D) Müalicəsi mümkün olmayan epilepsiyalı uşaqların heç birində qeyri-epileptik qıcolmalar olmaz.

E) Uşaq epilepsiya şöbəsində olan uşaqların hamısında qeyri-epileptik qıcolmalar olur.

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**64) Aşağıdakılardan hansı uşaq və yeniyetmə psixiatrik xəstəliklərinin müalicəsində əsas yanaşma prinsiplərinə aid deyil?**

A) Müalicəyə aşağı doza ilə başlayın.

B) Əsas simptomları deyil, diaqnozları hədəfləyin.

C) Dərmanın müalicəsi və əks təsirlərini izləyin.

D) Uşaq və yeniyetmələrin ciddi psixiatrik xəstəlikləri zamanı polifarmasi ehtiyacı ola bilər.

E) Dərman dozasını ehtiyatla və yavaş-yavaş artırın.

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**65) Aşağıdakılardan hansı uşaq və yeniyetmə psixiatrik xəstəliklərinin müalicəsində əsas yanaşma prinsiplərinə aid deyil?**

A) Müalicə effektivliyinin təyini üçün kifayət qədər vaxt verin.

- B) Xəstəni dərman və müalicə ilə bağlı maarifləndirin.
- C) Mümkün olan kimi müalicəni tək dərman ilə davam etdirin.
- D) Ailəni dərman və müalicə ilə bağlı maarifləndirin.
- E) Müalicənin effektivliyinin bir mühitdə təsdiq olunması kifayət edir.

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**66) Depresiya diaqnozu ilə stasionar müalicəyə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmə üçün uyğun müalicə müddəti təxmini nə qədərdir?**

- A) 2 həftə
- B) 1 ay
- C) 3 həftə (21 gün)
- D) 1 həftə
- E) 2 ay

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**67) Şizofreniya diaqnozu ilə stasionar müalicəyə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmə üçün uyğun müalicə müddəti təxmini nə qədərdir?**

- A) 2 həftə

B) 3 həftə (21 gün)

C) 1 ay

D) 2 ay

E) 1 həftə

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**68) Kofarmasi nədir?**

A) Eyni dozada iki və ya daha çox dərmanın istifadəsi

B) Simptomdan asılı olmayaraq, fərqli qrupdan iki dərmanın istifadəsi

C) Fərqli simptomlar üçün fərqli dərmanların istifadəsi

D) Simptomdan asılı olmayaraq, eyni qrupdan iki dərmanın istifadəsi

E) Eyni simptomun korreksiyası üçün fərqli dərmanları istifadəsi

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**69) Polifarmasi nədir?**

A) Eyni dozada iki və ya daha çox dərmanın istifadəsi

B) Simptomdan asılı olmayaraq, eyni qrupdan iki dərmanın istifadəsi

C) Fərqli simptomlar üçün fərqli dərmanların istifadəsi

D) Simptomdan asılı olmayaraq, fərqli qrupdan iki dərmanın istifadəsi

E) Eyni simptomun korreksiyası üçün fərqli dərmanları istifadəsi

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

Tarix: 07.04.2023 17:28:39

**70) NİCE protokollarına görə uşaq və yeniyetmələrdə yüngül depressiyanın müalicəsində aşağıdakılardan hansı tövsiyə olunur?**

A) Yalnız dərman müdaxilələri

B) Yalnız psixoloji müdaxilələr

C) Erkən dövəmdə psixoloji müdaxilə olmaqla dərmanla psixoloji müdaxilə kombinasiyası

D) Erkən dövəmdə dərman olmaqla dərmanla psixoloji müdaxilə kombinasiyası

E) Spontan sağalma gözlənilir

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**71) NİCE protokollarına görə uşaq və yeniyetmələrdə ağır depressiyanın müalicəsində aşağıdakılardan hansı tövsiyə olunur?**

A) Erkən dövəmdə psixoloji müdaxilə olmaqla dərmanla psixoloji müdaxilə kombinasiyası

- B) Erkən dövəmdə dərman olmaqla dərmanla psixoloji müdaxilə kombinasiyası
- C) Spontan sağıalma gözlənilir
- D) Yalnız psixoloji müdaxilələr
- E) Yalnız dərman müdaxilələri

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**72) Aşağıdakı SiUSi molekullarından hansı və ya hansıları yeniyetmələrdə depresiya xəstəliyinin müalicəsində FDA tərəfindən təsdiqlənib?**

1. Essitalopram
2. Sitalopram
3. Sertralin
4. Flüksetin
5. Paroksetin

- A) yalnız 3
- B) 1 və 4
- C) 2 və 5
- D) yalnız 4
- E) yalnız 1

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**73) Aşağıdakı SiUSİ molekullarından hansı və ya hansıları yeniyetməönü dövründə olan uşaqlarda (8 yaşdan yuxarı) depresiya xəstəliyinin müalicəsində FDA tərəfindən təsdiqlənib?**

**1. Essitalopram**

**2. Sitalopram**

**3. Sertralin**

**4. Flüksetin**

**5. Paroksetin**

A) yalnız 4

B) 2 və 5

C) yalnız 3

D) yalnız 1

E) 1 və 4

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**74) Aşağıdakı SiUSİ molekullarından hansının istifadəsi zamanı geri çəkilmə əlamətlərinin daha az meydana çıxması həmi molekulun yeniyetmələrdə istifadəsini asanlaşdırır?**

A) sitalopram

- B) paroksetin
- C) essitalopram
- D) flüksetin
- E) sertralin

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**75) Aşağıdakı müddələrdən hansı flüksetin molekulu üçün doğru deyil?**

- A) Depresiyanın müalicəsində yeniyetmələr üçün FDA tərəfindən təsdiqlənmiş yeganə antidepresandır.
- B) FDA tərəfindən 8 yaşından yuxarı şəxslərin depressiya müalicəsində tövsiyə olunur.
- C) Depresiyanın müalicəsində yeniyetmələri dövründə olan uşaqlarda (8 yaşdan yuxarı) FDA tərəfindən təsdiqlənmiş yeganə antidepresandır.
- D) Meta-analizlərə görə KDT və digər farmakoloji maddələrə nisbətən daha effektivdir.
- E) Uşaq və yeniyetmələrdə depressiyanın müalicəsində ilk sırada tövsiyə olunan dərmandır.

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**76) Uşaq və yeniyetmələrdə depressiyanın müalicəsində flüksetinin tövsiyə olunan başlanğıc dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 5 mq
- B) 7,5 mq
- C) 15 mq
- D) 20 mq
- E) 10 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**77) Uşaq və yeniyetmələrdə depresiyanın müalicəsində flüksetinin tövsiyə olunan minimal müalicə dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 10 mq
- B) 7,5 mq
- C) 20 mq
- D) 15 mq
- E) 5 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**78) Uşaq və yeniyetmələrdə depresiyanın müalicəsində essitalopram molekulun tövsiyə olunan minimal müalicə dozası aşağıdakılardan hansıdır?**



- A) 7,5 mq
- B) 20 mq
- C) 10 mq
- D) 15 mq
- E) 5 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**79) Uşaq və yeniyetmələrdə depressiyanın müalicəsində sitalpram molekulunun tövsiyə olunan minimal müalicə dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 10 mq
- B) 5 mq
- C) 15 mq
- D) 20 mq
- E) 7,5 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**80) Uşaq və yeniyetmələrdə depressiyanın müalicəsində sertralin molekulunun tövsiyə olunan minimal müalicə dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 10 mq
- B) 50 mq
- C) 25 mq
- D) 5 mq
- E) 15 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**81) Uşaq və yeniyetmələrdə depressiya xəstəliyinin müalicəsində tövsiyə olunmayan SiUSi molekulu aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) sertralin
- B) flüoksetin
- C) essitalopram
- D) paroksetin
- E) sitalopram

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**82) Aşağıdakı müddələrdən hansı essitalopram molekulu üçün doğru deyil?**

- A) Müalicəyə aşağı dozada başlanmalıdır.
- B) Yeniyetmələrdə depresiyanın müalicəsi üçün FDA tərəfindən təsdiqlənməyib.
- C) Essitalopram molekulunun minimal müalicəvi dozası 10 mq-dır.
- D) 12 yaşdan yuxarı uşaqların müalicəsində istifadəsi tövsiyə olunur.
- E) Müalicə dozası gün daxilində ikiye bölünməlidir.

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**83) Aşağıdakı müddələrdən hansı sitalopram molekulu üçün doğru deyil?**

- A) Kongenital uzun QT sindromu sitalopram təyini üçün əks göstərişdir.
- B) Sitalopram molekulunun minimal müalicəvi dozası 10 mq-dır.
- C) Yeniyetmələrdə depresiyanın müalicəsi üçün FDA tərəfindən təsdiqlənməyib.
- D) Yüksək dozada toksikdir.
- E) Müalicəyə aşağı dozada başlanmalıdır.

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**84) Tiklərlə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?**

- A) Tik pozuntusu olan uşaqların əksəriyyətinin tikləri ömür boyu davam edir.
- B) Tiklər zaman keçdikcə artıb-azalır, bəzən bir tik digərinə də keçə bilir.

- C) Tourette sindromu yalnız vokal tiklərlə xarakterizə olunur.
- D) Tiklər daha çox qız uşaqları üçün xarakterikdir.
- E) Tourette sindromu yalnız motor tiklərlə xarakterizə olunur.

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**85) Uşaqlıq insomniyasının müalicəsində ilk seçim aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) risperidon
- B) ketiapin
- C) melatonin
- D) klonazepam
- E) aripiprazol

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**86) Melatonin ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?**

- A) Melatonin pineal vəz tərəfindən sekresiya olunan hormondur.
- B) Melatonin hormonunun yuxunun başlanması ilə əlaqəli olması təsdiqlənib.
- C) Melatonin ifrazatı axşam yuxusundan 2 saat sonra yüksəlməyə başlayır.
- D) Melatonin sirkadien ritmin sinxronizasiyasında iştirak edir.

E) Melatonin ifrazatı fasiləsiz şəkildə davam etmir.

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**87) Uşaqlıq insomniyası olan uşaq üçün ilk düşünülmən müdaxilə aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) Yuxu gigiyenası və davranışçı müdaxilələr
- B) Risperidon 0,5 mq
- C) Klonazepam 0,5 mq
- D) Mirtazapin 15 mq
- E) Melatonin 2-5 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**88) Uşaqlıq insomniyası olan uşağa tətbiq olan davranışçı müdaxilələr və yuxu gigiyenası qaydalarından sonra heç bir dəyişiklik əldə olunmadı. Bu zaman ilk düşünülmən müdaxilə aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) Melatonin 2-5 mq
- B) Risperidon 0,5 mq
- C) Aripirazol 2,5 mq
- D) EEG müayinəsi

E) MRT müayinəsi

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**89) Uşaqlıq insomniyası olan uşağa əvvəlcə yuxu gigiyenası qaydaları və davranışçı müdaxilələr tətbiq edildi. Bu zaman heç bir nəticə əldə olunmadığına görə Melatonin 1,5 mq/gün təyin edildi. Müalicə gedişi boyunca təyin olunan doza 4,5 mq/gün-ə qədər artırıldı. Nəticədə uşağın yuxuya getmə müddəti əvvəlkinə nisbətən daha qısa olub, yuxu müddəti bir qədər artdı. Amma dərmana verilən cavab uşağın normalda ehtiyacı olan yuxu müddətindən daha azdır. Dərmanın heç bir əlavə və əks təsirinin olmadığını nəzərə alaraq, növbəti mərhələdə ediləcək müdaxilə aşağıdakılardan hansı olmalıdır?**

- A) EEG və MRT müayinələri edilməlidir.
- B) Müalicəyə Klonazepam əlavə olunmalıdır
- C) Melatonin dayandırılmalı və Ketiapin əlavə olunmalıdır
- D) Melatonin dozası artırılmalıdır
- E) Müalicəyə Risperidon əlavə olunmalıdır

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**90) NICE protokollarına əsasən, uşaqlarda sürətli trankvilizasiya üçün tövsiyə olunan ilk müdaxilə aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) Aripiprazol İM 9,75 mq
- B) Haloperidol İM 2 mq
- C) Olanzapin İM 2,5 mq
- D) Lorazepam İM 1 mq
- E) Midazolam buccal 5 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**91) Uşaq və yeniyetmələrdə təcili trankvilizasiya üçün tövsiyə olunan intramuskulyar olanzapin dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 0,1mq/kq-dan başlayaraq maksimum 40 mq
- B) 0,5-2 mq
- C) 1-5 mq
- D) 2,5-10 mq
- E) 5-25 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**92) Uşaq və 12 yaşdan kiçik yeniyetmələrdə təcili trankvilizasiya üçün tövsiyə olunan intramuskulyar haloperidol dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 5-25 mq
- B) 0,1mq/kq-dan başlayaraq maksimum 40 mq
- C) 0,025-0,075 mq/kq-dan başlayaraq maksimum 2,5 mq
- D) 0,5-2 mq
- E) 2,5-10 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**93) Təcili trankvilizasiya məqsədilə uşağa 5 mq olanzapin əzələdaxili inyeksiya olunduğundan sonra hansı vital göstərici nəzarətdə saxlanılmalıdır?**

- A) ürək döyüntülərinin sayı
- B) arterial qan təzyiqi
- C) tənəffüs sayı
- D) bədən temperaturu
- E) qandakı oksigen saturasiyası

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**94) Uşaq və yeniyetmələrdə təcili trankvilizasiya məqsədilə hansı molekulun əzələdaxili inyeksiyası zamanı EKQ müayinəsi tövsiyə olunur?**



- A) haloperidol
- B) diazepam
- C) olanzapin
- D) aripiprazol
- E) lorazepam

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**95) Uşaq və 12 yaşdan kiçik yeniyetmələrdə təcili trankvilizasiya üçün tövsiyə olunan intramuskulyar lorazepam dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 0,1mq/kq-dan başlayaraq maksimum 40 mq
- B) 2,5-10 mq
- C) 5-25 mq
- D) 0,025-0,075 mq/kq-dan başlayaraq maksimum 2,5 mq
- E) 0,5-1 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**96) 12 yaşdan böyük yeniyetmələrdə təcili trankvilizasiya üçün tövsiyə olunan intramuskulyar lorazepam dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 0,5-2 mq
- B) 0,025-0,075 mq/kq-dan başlayaraq maksimum 2,5 mq
- C) 5-25 mq
- D) 0,1mq/kq-dan başlayaraq maksimum 40 mq
- E) 2,5-10 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**97) Uşaq və 12 yaşdan kiçik yeniyetmələrdə təcili trankvilizasiya üçün tövsiyə olunan diazepam dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 2,5-10 mq
- B) 0,5-2 mq
- C) 0,1mq/kq-dan başlayaraq maksimum 40 mq
- D) 5-25 mq
- E) 0,025-0,075 mq/kq-dan başlayaraq maksimum 2,5 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**98) Uşaq və yeniyetmələrdə təcili trankvilizasiya məqsədilə hansı molekulun əzələdaxili inyeksiyası zamanı EKQ müayinəsi tövsiyə olunur?**

- A) diazepam
- B) olanzapin
- C) lorazepam
- D) aripiprazol
- E) ziprasidon

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**99) Yeni yetmələrdə təcili trankvilizasiya üçün tövsiyə olunan intramuskulyar aripiprazol dozası aşağıdakılardan hansıdır?**

- A) 5-25 mq
- B) 0,025-0,075 mq/kq-dan başlayaraq maksimum 2,5 mq
- C) 0,5-2 mq
- D) 2,5-10 mq
- E) 9,75 mq

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

**100) Həyəcan pozuntusu diaqnozlu məktəbəqədər yaş dövründə olan oğlan uşağının müalicəsində ilk müdaxilə aşağıdakılardan hansı olmalıdır?**

A) aripiprazol

B) psixoterapiya (KDT)

C) essitalopram

D) venlafaksin

E) flüksetin

Ədəbiyyat: ATU, Psixiatriya kafedrası

SNSK.az